

АЦЕТЕР СУПЕР, КЕ

ACETER SUPER, EC

Препаративна форма: концентрат емульсії (КЕ)

Діюча речовина: ацетохлор, 900 г/л

Призначення препарату: Ґрунтовий гербіцид системної дії проти злакових та дводольних бур'янів.

Механізм дії Ацетохлор діє на паростки бур'янів. Діюча речовина препарату проникає у тканини шилець і коренів, активно гальмує розвиток і поділ клітин через порушення в них білкового обміну, в результаті чого паростки бур'янів гинуть.

Застосування препарату

Культура	Шкідливі об'єкти	Норми витрати препарату	Спосіб, час обробки	Максимальна кратність обробок
Кукурудза, сояшник	Однорічні злакові та дводольні бур'яни	1,5-3,0 л/га	Обприскування ґрунту до сівби, під час сівби, після сівби, але до сходів культури (в зонах недостатнього зволоження із загортанням)	1

Норма витрати робочого розчину 200 – 400 л/га

Строки виходу на оброблені площі для проведення механізованих робіт – 3 доби, ручних робіт – 7 діб.

Термін очікування до збирання врожаю – не регламентується.

Швидкість вітру під час роботи з препаратом не повинна перевищувати 3 – 4 м/с.

Обприскування слід проводити зранку (до 10 год.) чи ввечері (18-22 год.)

При застосуванні препарату запобігати його потраплянню у водоймища.



Швидкість дії:

Дія препарату починається після внесення

Період захисної дії:

При правильному застосуванні до 8-10 тижнів.

Сумісність з іншими препаратами

Сумісний з більшістю пестицидів та рідких добрив за умови застосування у рекомендованих дозах, але у кожному конкретному випадку необхідне перевірити препарати на сумісність. Рекомендується додавати багатофункціональний ад'ювант МультиМастр 0,5 л/га для запобігання промиванню гербіциду від рясних дощів, покращенню контролю бур'янів та подовженню періоду захисної дії Ацетер Супер.

Приготування робочого розчину

Робочий розчин готують на спеціальному майданчику, який у подальшому підлягає знешкодженню.

Бак обприскувача заповнюють на 1/3 водою, додають необхідну кількість препарату і при постійному перемішуванні доливають воду. Багатофункціональний ад'ювант МультиМастр у дозі 0,5 л/га додавати у бак наприкінці приготування робочого розчину. Під час обприскування необхідно продовжувати перемішування. Робочий розчин зберігання не підлягає і повинен бути використаний протягом декількох годин.

Можливість виникнення резистентності

Маловірогідне при дотриманні регламентів застосування препарату. Але для запобігання резистентності рекомендується чергувати внесення Ацетер Супер, КЕ з препаратами з інших хімічних груп. Робочий розчин зберігання не підлягає і повинен бути використаний протягом декількох годин.

Класифікація ВООЗ, токсикологічна характеристика: 2 клас небезпечності

Гарантійний строк зберігання: 2 роки при температурі від 0°C до +30°C в непошкодженій заводській упаковці.

Україна 08132

Києво-Святошинський р-н, Київська обл.,
вул. Чорновола, 30, с.Софіївська Борщагівка



ЕРІДОН
СПІВПРАЦЯ, ЯКА ГАРАНТУЄ УСПІХ

www.eridon.ua

E-mail: office@eridon.ua

тел./факс (044) 536 92 00, 501 88 30