

ГОЛДЕР СУПЕР 500 КС

GOLDER SUPER 500 SC

Діюча речовина: карбендазим, 500 г/л
Хімічна група: Похідні дитіокарбамінової кислоти
Препаративна форма: концентрат суспензії (КС)

Призначення препарату: Фунгіцид та протруювач насіння. Може використовуватись як протруювач і як фунгіцид для внесення по вегетуючих культурах.

Механізм дії карбендазим поглинається через коріння та зелені тканини рослини і рухається знизу вгору, пригнічуючи синтез бетабуліну, що викликає порушення обміну речовин патогенних грибів. Ефективний проти збудників хвороб родів *Puccinia*, *Erysiphe*, *Septoria*, *Helminthosporium*, *Alternaria*, *Cercospora* та інші

Застосування препарату

Фунгіцид в вегетативний період

Культура	Норма, л/га	Шкідливий об'єкт	Час і спосіб використання
Цукровий буряк	0,3-0,4	Церкоспороз, борошниста роса	Обприскування в період вегетації
Пшениця озима	0,5	Борошниста роса, септоріоз, гельмінтоспоріоз	Обприскування від початку фази куціння до фази другого вузла у зернових
Ячмінь ярий	0,5	Борошниста роса, плямистість листя	Обприскування від початку фази куціння до фази другого вузла у зернових
Соняшник	0,5	Біла та сіра гнилі, фомоз, несправжня борошниста роса	Обприскування у фазі формування кошиків/початок цвітіння і другий раз через 2 тижні

Протруювач насіння

Культура	Норма, л/га	Шкідливий об'єкт
Пшениця озима	1,5	Септоріоз паростків, снігова пліснява, сажкові хвороби, кореневі гнилі
Ячмінь ярий	1,5	Септоріоз паростків, сажкові хвороби, кореневі гнилі
Соняшник	1,5	Біла та сіра гнилі, фомоз, несправжня борошниста роса

Норма витрати робочого розчину 200 – 300 л/га

Особливості застосування:

- Протруєння препаратом **Голдер Супер** проводити перед висівом суспензією препарату у співвідношенні 10 л робочого розчину на 1 тону насіння;
- Для протруєння використовувати добре очищене і не травмоване насіння;
- Обов'язковою умовою є забезпечення рівномірного покриття насіння плівкою робочого розчину;
- Норма витрати робочої рідини при проведенні наземного обприскування становить 200-300 л/га. Обов'язковою вимогою є забезпечення суцільного покриття площі і рясного змочування рослин під час внесення препарату.
- Рекомендовано вносити препарат профілактично або за появи перших ознак хвороби. Тривалість захисної дії: 2-4 тижні в залежності від погодних умов і ступеня захворюваності.
- Двох обробок за вегетацію достатньо для забезпечення високої ефективності.

Сумісність з іншими препаратами:

Сумісний з більшістю післясходових гербіцидів та інсектицидів, проте слід уникати бакових сумішей з препаратами, що мають лужну реакцію. Перед обробкою рекомендується провести перевірку на сумісність.

Переваги:

- широкий спектр біологічної ефективності проти інфекції, яка передається через ґрунт та насіння;
- тривалий захист насіння та сходів завдяки системній активності;
- завдяки відсутності фітотоксичності можна використовувати для захисту багатьох культур;
- зручна у використанні та повністю готова до застосування формуляція;
- безпечний для довкілля та для споживача;
- оптимальне поєднання ціни та ефективності.

Класифікація ВООЗ, токсикологічна характеристика: 3 клас небезпечності

Гарантійний строк зберігання: 2 роки при температурі від -5°C до +40°C в непошкодженій заводській упаковці.

Україна 08132

Києво-Святошинський р-н, Київська обл.,
вул. Чорновола, 30, с.Софіївська Борщагівка



ЕРІДОН
СПІВПРАЦЯ, ЯКА ГАРАНТУЄ УСПІХ

www.eridon.ua

E-mail: office@eridon.ua

тел./факс (044) 536 92 00, 501 88 30