


РАНЬОСТИГЛИЙ




- Вміст олії, високий більше 50%
- Вміст олеїнової кис-ти в олії до 93% (при дотриманні просторової ізоляції 300м та за сприятливих погодних умов)
- Цвітіння: раннє
- Дозрівання: раннє
- Маса тис.нас. - 57 - 60 гр

- Толерантність до головних хвороб (фомопсис та біла гниль)
- Відмінне співвідношення: врожайність/ранньостиглість/якість олії
- Високий вміст олеїнової кислоти
- Висока стійкість до осипання та вилягання
- Стійкий до несправжньої борошністої роси
- Потенціал врожайності – 48 ц/га

Рекомендована зона вирощування:
Центральний і Північний Лісостеп, Полісся та зони вільні від вовчка.
Рекомендується збалансоване NPK живлення.



Рекомендована густина рослин/га на момент збирання:



Центральний і
Північний Лісостеп **50-53 000**
Полісся **50-55 000**

ЮЛЛНА



150-170



17-20




45°

Не рекомендовано висівати в непрогрітий ґрунт.

2016 - **36 ц/га**
ТОВ "Генетик"
Хмельницька обл.

2015 - **32 ц/га**
ТОВ "Біо Агро"
Тернопільська обл.

2016 - **37 ц/га**
ТДВ "Синявське" - Київська обл.



2016 - **32 ц/га**
ФГ "ЛІМ" - Львівська обл.

2017 - **30 ц/га**
ТОВ "Фармко" - Полтавська обл.

Енергія початкового розвитку	8
Стійкість до стресових умов	7,5
Стійкість до вилягання	8,5
Толерантність до фомопсису	7,5
Толерантність до сірої гнилі	8
Толерантність до фомозу	7,5
Толерантність до білої гнилі	8,5
Стійкість до несправжньої борошністої роси	9
Толерантність до іржі	8