



Субаро HTS



ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВМІСТ ОЛІЇ  **до 50 %**

ВИСОТА РОСЛИН  **Вища за середню***

СТІЙКІСТЬ ДО ВОВЧКА  **A-E**

- ✓ Помірно-інтенсивний гібрид лінолевого типу
- ✓ Висока стабільна врожайність та олійність
- ✓ Високі темпи росту на перших етапах розвитку
- ✓ Висока посухостійкість та добре запилення кошика

НОВИЙ СТАНДАРТ УРОЖАЙНОСТІ В HTS-СЕГМЕНТІ

Оптимізовано для гербіциду Експрес® компанії FMC

Група стиглості
СЕРЕДНЬОПІЗНІЙ

Використання
ЛІНОЛЕВИЙ

Напрямок вирощування
HTS

Тип адаптивності
ПОМІРНО-ІНТЕНСИВНИЙ

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА РОСЛИН НА ПЕРІОД ЗБИРАННЯ

Достатнє зволоження — 55–60 тис./га

Нестійке зволоження — 45–55 тис./га

Недостатнє зволоження — 40–45 тис./га

РЕКОМЕНДОВАНА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ




Ліcостеп



**Степ
(Північний)**

* Залежно від вологозабезпечення



ОЦІНКА ОЗНАК

📊 Потенціал урожайності				9
📏 Початкові темпи росту			8	
📈 Стабільність урожаю				9
☀️ Посухостійкість			8	
🛡️ Адаптивність до термінів посіву	Середні (оптимальні)			

ТОЛЕРАНТНІСТЬ

🛡️ Комплексна толерантність до хвороб			8	
🛡️ Толерантність до фомопсису			8	
🛡️ Толерантність до склеротиніозу			8	

1 — дуже низька

9 — дуже висока

