



Суміко HTS

ВИСОКА ВРОЖАЙНІСТЬ
І НАЙВИЩИЙ ВМІСТ ОЛІЇ

Оптимізовано для гербіциду Експрес® компанії FMC

Група стиглості
СЕРЕДНЬОРАННІЙ

Використання
ЛІНОЛЕВИЙ

Напрямок вирощування
HTS

Тип адаптивності
ІНТЕНСИВНИЙ

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА РОСЛИН НА ПЕРІОД ЗБИРАННЯ

Достатнє зволоження — 55–60 тис./га
Нестійке зволоження — 45–55 тис./га
Недостатнє зволоження — 40–45 тис./га

РЕКОМЕНДОВАНА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ



Полісся



Лісостеп



Степ
(Північний)



ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ


ВМІСТ ОЛІЇ до 55 %

ВИСОТА РОСЛИН Низька/середня*

СТІЙКІСТЬ ДО ВОВЧКА А-Е

- ✓ Висока врожайність і найвищий вміст олії
- ✓ Середні темпи росту на перших етапах розвитку
- ✓ Потенціал урожаю — як у гібрида НК Бріо

* Залежно від вологозабезпечення



УРОЖАЙНІСТЬ ГІБРИДА В ҐРУНТОВО-КЛІМАТИЧНИХ УМОВАХ, 2020 РІК

- Волога, помірно тепла зона
- Передгірний вологий, теплий район
- Недостатньо волога, тепла зона
- Посушлива, дуже тепла зона
- Посушлива, помірно жарка зона
- Дуже посушлива, помірно жарка зона
- Район вертикальної кліматичної поясності
- 🌾 Урожайність (у перерахунку на вологість сім'янок 7 %), ц/га

ОЦІНКА ОЗНАК

📊	Потенціал урожайності			9
📏	Початкові темпи росту		8	
📈	Стабільність урожаю		8	
☀️	Посухостійкість	7		
🛡️	Адаптивність до термінів посіву			Ранні — пізні

ТОЛЕРАНТНІСТЬ

🛡️	Комплексна толерантність до хвороб		8	
🛡️	Толерантність до фомопсису		8	
🛡️	Толерантність до склеротиніозу		8	

1 — дуже низька

9 — дуже висока

