

КАТАЛОГ 2018



euralis.ua

EURALIS



EURALIS

Creating seeds and trust

Кооперативна Група Євраліс створена французькими фермерами у 1936 році, і нині налічує 7 000 акціонерів та 4 740 співробітників. Сільськогосподарський підрозділ Групи Євраліс обслуговує 12 000 фермерів на південному заході Франції, які задіяні в різних секторах сільськогосподарського виробництва: від польових культур, насіння, овочів та виноробства до виробників великої рогатої худоби, свинини та фуа-гри. Харчовий підрозділ Групи Євраліс виробляє продукцію для споживання у Франції та на експорт у всьому світі. У 2016 році обіг Групи Євраліс склав 1,43 млрд євро.

Євраліс Семенс, насіннєвий підрозділ французької кооперативної Групи Євраліс, створено у 1950 році. У 1951 році Євраліс Семенс, вперше серед приватних компаній Франції, створила гібрид кукурудзи, що став інноваційним проривом у країні. Щорічно компанія інвестує 13% свого обігу у дослідження, а виробництво насіння здійснюється на площі 21 000 га та дороблюється на 3 насіннєвих заводах: у Лескарі (Франція), Севільї (Іспанія) та Черкасах (Україна). Для створення інноваційних гібридів Євраліс Семенс використовує найсучасніші лабораторні технології та більш ніж 20-річний досвід у

молекулярному маркуванні і біотехнологіях для прискорення генетичного прогресу. Гібриди Євраліс, створені у лабораторії в Тулузі (Франція), у подальшому тестуються на 500 000 ділянках по всій Європі, що дає можливість запропонувати гібриди, які відповідають новітнім технологіям та агрокліматичним умовам саме вашого регіону, і допомагають фермерам з усього світу збільшувати прибутки від інноваційної генетики Євраліс.

Євраліс Семенс в Україні налічує 350 співробітників та повністю контролює вертикально-інтегрований виробничий цикл насіння: польове виробництво, доробка і кондиціонування насіння на заводі Євраліс на Черкащині, операційний маркетинг та комерціалізація в межах України. Компанія щорічно закладає широкую мережу демонстраційних та технологічних випробувань своєї продукції по всій території України, а відділ наукових розробок і досліджень тестує новостворені гібриди та досліджує їхню адаптивність до нашого клімату. Компанія Євраліс Семенс в Україні пропонує фермерам гібридне насіння кукурудзи від раннього до середньопізнього ФАО, насіння соняшника, що відповідає потребам фермерів в усіх сегментах ринку, а також насіння сої, сорго та озимого ріпаку.


GROWING YOUR TRUST
80 POKIV EURALIS У СВІТІ


EURALIS В УКРАЇНІ

ІННОВАЦІЙНІ РІШЕННЯ СУЧАСНОЇ ГЕНЕТИКИ ЄВРАЛІС



ЗОЛОТА ЛІНІЯ КУКУРУДЗИ ЄВРАЛІС — з метою поєднання світових інновацій для збільшення Вашого прибутку були створені гібриди кукурудзи з високим потенціалом урожайності та фунгіцидно-інсектицидною обробкою насіння і додаванням біостимулятора росту

ПРЕМІУМ-СЕГМЕНТ КУКУРУДЗИ ЄВРАЛІС — інноваційна генетика у поєднанні з комплексною заводською обробкою насіння

РІВЕНЬ ТЕХНОЛОГІЇ — система оцінювання рівня технологій (від екстенсивного до інтенсивного типу) конкретного гібрида, що базується на п'ятирічних дослідженнях у різних ґрунтово-кліматичних зонах України

Забезпечення вологою



- Гібрид максимально розкриває свій потенціал
- Гібрид показує конкурентоздатний результат

Потенціал поля



- Гібрид показує середній результат на полі
- Гібрид показує результат нижче середнього



Tropical Dent[®] Corn Hybrid
Ексклюзивно від Євраліс Селекція
Урожайність +++
Стабільність +++
Вологоздатність +++



Потужне коріння — високий врожай



Європейська селекційна програма



Європейська асоціація виробників сої без ГМО



Ексклюзивна технологія для ефективного контролю вовчка



Продукт для виробничої системи Clearfield[®]



Продукт для виробничої системи Clearfield[®]Plus

Скористайтеся нашими рекомендаціями для вибору оптимального продукту, використовуючи наступні піктограми:



Лідер серед гібридів Євраліс



Новий продукт



Для виробництва круп



Для виробництва біогазу



Для виробництва силосу



Для використання за технологією No-Till



Технологія Сульфо



Високоолеїновий гібрид



Високий вміст жиру



Адаптований до холодних умов



Висока стійкість до посухи



Висока стійкість до хвороб



Висока енергія початкового розвитку



Швидка віддача волого



ГІБРИДИ КУКУРУДЗИ ЄВРАЛІС СЕМЕНС ПРЕМІУМ-СЕГМЕНТ

		ЕС СІРІУС	NEW ЕС КРОССМАН	ЕС КОНКОРД	ЕС АСТЕРОІД	NEW ЕС КРЕАТИВ
Стор.		6	7	8	9	10
ФАО		200	240	250	290	300
Напрям використання		зерно	зерно силос	зерно	зерно	зерно
$\sum t^{\circ}\text{C}$ (від 6 $^{\circ}\text{C}$ від сівби до цвітіння)		870	860	900	910	870
$\sum t^{\circ}\text{C}$ на силос (від 6 $^{\circ}\text{C}$ до збирання 32% сухої речовини)		1460	1440	1530	1580	1590
$\sum t^{\circ}\text{C}$ на зерно (від 6 $^{\circ}\text{C}$ до збирання 32% вологості зерна)		1650	1670	1670	1720	1730
Тип гібрида		тлг	пг	пг	пг	пг
Тип зерна		кз	кз	кз	кз	кз
Колір стрижня качана		червоний	рожевий	червоний	рожевий	рожево-червоний
Висота рослин, см		290	295	285	290	275
Висота кріплення качана, см		125	120	125	130	120
Кількість рядів зерен		14-16	14-16	14-16	14-16	14-16
Зерен у ряду		26	26	32	29	30
Маса 1000 насінин, г		290	304	320	320	340
Енергія початкового розвитку		8	8	8	7	8
Стійкість до вилягання		8	7	8	8	9
Толерантність до фузаріозу стебла		8	9	8	9	8
Толерантність до фузаріозу качана		8	7	9	9	8
Толерантність до гельмінтоспоріозу		8	8	8	8	8
Толерантність до пухирчастої сажки		7	8	8	9	9
Толерантність до летючої сажки		7	8	8	8	9
Густота перед збиранням, тис./га*	Для зони недостатнього зволоження	65-70	65-70	65-70	60-70	55-65
	Для зони достатнього зволоження	75-90	75-80	75-80	75-80	70-75

*За умов дотримання технології і рівномірності розташування рослин в ряду.

ЕС ГАРАНТ	ЕС КУБУС	ЕС ГЕЛЛЕРІ	ЕС БРІЛІАНТ	ЕС МОСКІТО	ЕС СЕНСОР	ЕС МІЛОРД	ЕС МЕТОД	NEW ГАРМОНІУМ
11	12	13	14	15	16	17	18	19
300	310	340	350	350	370	380	380	380
зерно	зерно силос	зерно	зерно	зерно силос	зерно	зерно	зерно силос	зерно
900	920	910	910	950	960	940	920	950
1600	1630	1630	1630	1640	1640	1610	1610	1620
1770	1800	1800	1800	1790	1800	1820	1820	1820
ТЛГ	ПГ	ПГ	ТЛГ	ТЛГ	ТЛГ	ТЛГ	ПГ	ПГ
КЗ	КЗ	КЗ	КЗ	З	З	КЗ	КЗ	З
рожевий	рожевий	червоний	рожевий	червоний	червоний	червоний	червоний	рожевий
310	290	280	285	310	260	295	290	256
125	130	120	130	135	120	125	125	107
16-18	16-18	16-18	16-18	16-18	16-18	16-18	16-18	16-18
30	33	33	32	35	36	33	33	32
320	340	340	340	345	345	350	355	360
8	8	9	8	9	9	8	9	8
9	8	8	8	8	9	9	8	9
8	8	7	8	9	8	9	8	8
8	7	7	8	9	8	8	9	9
8	9	8	9	9	9	9	9	9
7	8	9	9	9	8	9	8	9
7	8	8	8	9	8	8	8	8
55-65	55-65	55-60	55-60	55-60	55-60	55-60	55-60	55-60
70-75	70-75	70-75	65-70	65-70	60-70	60-70	60-70	60-70

ЕС СІРІУС

ФАО 200

КУКУРУДЗА НА ЗЕРНО

Адаптація гібрида до кількості вологи у вегетаційний період



Адаптація гібрида до рівня технології



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип гібриду: **тріохлінійний**
- Тип зерна: **кременисто-зубоподібний**
- Колір стрижня качана: **червоний**
- Необхідна сума температур (від 6 °C):
 - до цвітіння: **870**
 - силос (32% сухої речовини): **1460**
 - зерно (при вологості 32%): **1650**




ГОЛОВНІ ОСОБЛИВОСТІ

- Високий потенціал урожайності
- Швидка віддача вологи
- Добра толерантність до пухирчастої сажки
- Добра холодостійкість
- Високий рівень толерантності до кореневого вилягання
- Високий рівень толерантності до фузаріозу



СТРУКТУРА ВРОЖАЮ

- Висота рослин: **290 см**
- Висота кріплення качана: **125 см**



АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	більша чутливість			більша стійкість	
	5	6	7	8	9
Енергія початкового розвитку					
Стійкість до вилягання					
Толерантність:					
- до фузаріозу стебла					
- до фузаріозу качана					
- до гельмінтоспориозу					
- до пухирчастої сажки					
- до летючої сажки					



ГУСТОТА ПЕРЕД ЗБИРАННЯМ

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА, ТИС. РОСЛ./ГА

Недостатнє зволоження	65-70
Достатнє зволоження	75-90



РЕКОМЕНДОВАНІ ЗОНИ ВИРОЩУВАННЯ

- Полісся, Лісостеп



ЕС КРОССМАН

ФАО 240



КУКУРУДЗА НА ЗЕРНО



КУКУРУДЗА НА СИЛОС



Адаптація гібрида до кількості вологи у вегетаційний період



Адаптація гібрида до рівня технології



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип гібриду: простий
- Тип зерна: кременисто-зубоподібний
- Колір стрижня качана: рожевий
- Необхідна сума температур (від 6 °C):
 - до цвітіння: 860
 - силос (32% сухої речовини): 1440
 - зерно (при вологості 32%): 1670




ГОЛОВНІ ОСОБЛИВОСТІ

- Висока стабільність урожаю за різних умов вирощування
- Висока стійкість до вилягання
- Високотолерантний до пухирчастої сажки
- Гібрид типу Stay Green



СТРУКТУРА ВРОЖАЮ

- Висота рослин: 295 см
- Висота кріплення качана: 120 см



АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	більша чутливість			більша стійкість	
	5	6	7	8	9
Енергія початкового розвитку					
Стійкість до вилягання					
Толерантність:					
- до фузаріозу стебла					
- до фузаріозу качана					
- до гельмінтоспориозу					
- до пухирчастої сажки					
- до летючої сажки					



ГУСТОТА ПЕРЕД ЗБИРАННЯМ

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА, ТИС. РОСЛ./ГА	
Недостатнє зволоження	65-70
Достатнє зволоження	75-80



РЕКОМЕНДОВАНІ ЗОНИ ВИРОЩУВАННЯ

- Полісся, Лісостеп



Фунгіцидно-інсектицидна обробка насіння

ЕС КОНКОРД

ФАО 250



КУКУРУДЗА НА ЗЕРНО

Адаптація гібрида
до кількості вологи
у вегетаційний період



Адаптація гібрида
до рівня технології



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип гібриду: **простий**
- Тип зерна: **кременисто-зубоподібний**
- Колір стрижня качана: **насичений червоний**
- Необхідна сума температур (від 6 °C):
 - до цвітіння: **900**
 - сілос (32% сухої речовини): **1530**
 - зерно (при вологості 32%): **1670**




ГОЛОВНІ ОСОБЛИВОСТІ

- Стабільний врожай в стресових умовах
- Високий потенціал урожайності
- Стабільний. Швидка віддача вологи
- Стійкий до посухи
- Стійкий до фузаріозу качана
- Добра компенсаторна здатність



СТРУКТУРА ВРОЖАЮ

- Висота рослин: **285 см**
- Висота кріплення качана: **125 см**



ГУСТОТА ПЕРЕД ЗБИРАННЯМ

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА, ТИС. РОСЛ./ГА

Недостатнє зволоження **65-70**

Достатнє зволоження **75-80**



АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	більша чутливість			більша стійкість	
	5	6	7	8	9
Енергія початкового розвитку					
Стійкість до вилягання					
Толерантність:					
- до фузаріозу стебла					
- до фузаріозу качана					
- до гельмінтоспориозу					
- до пухирчастої сажки					
- до летючої сажки					



РЕКОМЕНДОВАНІ ЗОНИ ВИРОЩУВАННЯ

- Полісся, Лісостеп



Фунгіцидно-інсектицидна
обробка насіння з додаванням
регулятора росту

ЕС АСТЕРОІД

ФАО 290



КУКУРУДЗА НА ЗЕРНО



Адаптація гібрида
до кількості вологи
у вегетаційний період



Адаптація гібрида
до рівня технології



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип гібриду: **простий**
- Тип зерна: **кременисто-зубоподібний**
- Колір стрижня качана: **рожевий**
- Необхідна сума температур (від 6 °C):
 - до цвітіння: **910**
 - силос (32% сухої речовини): **1580**
 - зерно (при вологості 32%): **1720**




ГОЛОВНІ ОСОБЛИВОСТІ

- Високий та стабільний врожай в посушливих умовах
- Висока стійкість до хвороб
- Добра компенсаційна здатність
- Стійкий до вилягання
- Стійкість до стресових умов



СТРУКТУРА ВРОЖАЮ

- Висота рослин: **290 см**
- Висота кріплення качана: **130 см**



АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	більша чутливість			більша стійкість	
	5	6	7	8	9
Енергія початкового розвитку					
Стійкість до вилягання					
Толерантність:					
- до фузаріозу стебла					
- до фузаріозу качана					
- до гельмінтоспориозу					
- до пухирчастої сажки					
- до летючої сажки					



ГУСТОТА ПЕРЕД ЗБИРАННЯМ

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА, ТИС. РОСЛ./ГА

Недостатнє зволоження **60-70**

Достатнє зволоження **75-80**



РЕКОМЕНДОВАНІ ЗОНИ ВИРОЩУВАННЯ

- Полісся, Лісостеп,
Північний Степ



Фунгіцидно-інсектицидна
обробка насіння з додаванням
регулятора росту

ЕС КРЕАТИВ

ФАО 300



КУКУРУДЗА НА ЗЕРНО

Адаптація гібрида
до кількості вологи
у вегетаційний період



Адаптація гібрида
до рівня технології



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип гібриду: **простий**
- Тип зерна: **кременисто-зубоподібний**
- Колір стрижня качана: **рожево-червоний**
- Необхідна сума температур (від 6 °C):
 - до цвітіння: **870**
 - силос (32% сухої речовини): **1590**
 - зерно (при вологості 32%): **1730**




ГОЛОВНІ ОСОБЛИВОСТІ

- Високий та стабільний урожай
- Висока стійкість до вилягання (стеблове вилягання, ламкість стебла)
- Висока толерантність до пухирчастої сажки



СТРУКТУРА ВРОЖАЮ

- Висота рослин: **275 см**
- Висота кріплення качана: **120 см**



АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	більша чутливість			більша стійкість	
	5	6	7	8	9
Енергія початкового розвитку					
Стійкість до вилягання					
Толерантність:					
- до фузаріозу стебла					
- до фузаріозу качана					
- до гельмінтоспориозу					
- до пухирчастої сажки					
- до летючої сажки					



ГУСТОТА ПЕРЕД ЗБИРАННЯМ

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА, ТИС. РОСЛ./ГА

Недостатнє зволоження	55-65
Достатнє зволоження	70-75



РЕКОМЕНДОВАНІ ЗОНИ ВИРОЩУВАННЯ

- Полісся, Лісостеп,
Північний Степ



Фунгіцидно-інсектицидна
обробка насіння з додаванням
регулятора росту

ЕС ГАРАНТ

ФАО 300



Адаптація гібрида
до кількості вологи
у вегетаційний період



Адаптація гібрида
до рівня технології



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип гібриду: **трьохлінійний**
- Тип зерна: **кременисто-зубоподібний**
- Колір стрижня качана: **рожевий**
- Необхідна сума температур (від 6 °C):
 - до цвітіння: **900**
 - сілос (32% сухої речовини): **1600**
 - зерно (при вологості 32%): **1770**




ГОЛОВНІ ОСОБЛИВОСТІ

- Високостійкий до стресових умов середовища
- Надзвичайно висока врожайність
- Швидка віддача вологи перед збиранням
- Резистентний до фузаріозу
- Стойкий до вилягання



СТРУКТУРА ВРОЖАЮ

- Висота рослин: **310 см**
- Висота кріплення качана: **125 см**



АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	більша чутливість			більша стійкість	
	5	6	7	8	9
Енергія початкового розвитку					
Стойкість до вилягання					
Толерантність:					
- до фузаріозу стебла					
- до фузаріозу качана					
- до гельмінтоспориозу					
- до пухирчастої сажки					
- до летючої сажки					



ГУСТОТА ПЕРЕД ЗБИРАННЯМ

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА, ТИС. РОСЛ./ГА	
Недостатнє зволоження	55-65
Достатнє зволоження	70-75



РЕКОМЕНДОВАНІ ЗОНИ ВИРОЩУВАННЯ

- Полісся, Лісостеп,
Північний Степ



Фунгіцидно-інсектицидна
обробка насіння

ЕС КУБУС

ФАО 310



КУКУРУДЗА НА ЗЕРНО



КУКУРУДЗА НА СИЛОС



Адаптація гібрида
до кількості вологи
у вегетаційний період



Адаптація гібрида
до рівня технології




ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип гібриду: **простий**
- Тип зерна: **кременисто-зубоподібний**
- Колір стрижня качана: **рожевий**
- Необхідна сума температур (від 6 °C):
 - до цвітіння: **920**
 - силос (32% сухої речовини): **1630**
 - зерно (при вологості 32%): **1800**



СТРУКТУРА ВРОЖАЮ

- Висота рослин: **290 см**
- Висота кріплення качана: **130 см**



ГУСТОТА ПЕРЕД ЗБИРАННЯМ

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА, ТИС. РОСЛ./ГА

Недостатнє зволоження **55-65**

Достатнє зволоження **70-75**



ГОЛОВНІ ОСОБЛИВОСТІ

- Пластичний при вирощуванні в різних ґрунтово-кліматичних умовах
- Висока посухостійкість
- Толерантний до гельмінтоспоріозу
- Добра резистентність до вилягання та фузаріозу
- Можливість використання на силос, висока перетравність



АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	більша чутливість			більша стійкість	
	5	6	7	8	9
Енергія початкового розвитку					
Стойкість до вилягання					
Толерантність:					
- до фузаріозу стебла					
- до фузаріозу качана					
- до гельмінтоспоріозу					
- до пухирчастої сажки					
- до летючої сажки					



РЕКОМЕНДОВАНІ ЗОНИ ВИРОЩУВАННЯ

- Полісся, Лісостеп, Степ



Фунгіцидно-інсектицидна обробка насіння

ЕС ГЕЛЛЕРІ

ФАО 340



Адаптація гібрида до кількості вологи у вегетаційний період



Адаптація гібрида до рівня технології



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип гібриду: **простий**
- Тип зерна: **кременисто-зубоподібний**
- Колір стрижня качана: **червоний**
- Необхідна сума температур (від 6 °C):
 - до цвітіння: **910**
 - сілос (32% сухої речовини): **1630**
 - зерно (при вологості 32%): **1800**




ГОЛОВНІ ОСОБЛИВОСТІ

- Високий потенціал урожайності
- Швидка віддача вологи
- Стабільний при вирощуванні в різних ґрунтово-кліматичних умовах
- Висока толерантність до хвороб
- Висока стійкість до пухирчастої сажки



СТРУКТУРА ВРОЖАЮ

- Висота рослин: **280 см**
- Висота кріплення качана: **120 см**



АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	більша чутливість			більша стійкість	
	5	6	7	8	9
Енергія початкового розвитку					
Стійкість до вилягання					
Толерантність:					
- до фузаріозу стебла					
- до фузаріозу качана					
- до гельмінтоспориозу					
- до пухирчастої сажки					
- до летючої сажки					



ГУСТОТА ПЕРЕД ЗБИРАННЯМ

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА, ТИС. РОСЛ./ГА	
Недостатнє зволоження	55-60
Достатнє зволоження	70-75



РЕКОМЕНДОВАНІ ЗОНИ ВИРОЩУВАННЯ

- Полісся, Лісостеп



Фунгіцидно-інсектицидна обробка насіння

ЕС БРІЛЛІАНТ

ФАО 350



КУКУРУДЗА НА ЗЕРНО

Адаптація гібрида
до кількості вологи
у вегетаційний період



Адаптація гібрида
до рівня технології



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип гібриду: **трьохлінійний**
- Тип зерна: **кременисто-зубоподібний**
- Колір стрижня качана: **рожевий**
- Необхідна сума температур (від 6 °C):
 - до цвітіння: **910**
 - сілос (32% сухої речовини): **1630**
 - зерно (при вологості 32%): **1800**




ГОЛОВНІ ОСОБЛИВОСТІ

- Високроврожайний гібрид
- Швидка віддача вологи
- Стабільний при вирощуванні в різних ґрунтово-кліматичних умовах
- Велика кількість рядів зерен і маса насіння
- Висока компенсаторна здатність



СТРУКТУРА ВРОЖАЮ

- Висота рослин: **285 см**
- Висота кріплення качана: **130 см**



АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	більша чутливість			більша стійкість	
	5	6	7	8	9
Енергія початкового розвитку					
Стійкість до вилягання					
Толерантність:					
- до фузаріозу стебла					
- до фузаріозу качана					
- до гельмінтоспориозу					
- до пухирчастої сажки					
- до летючої сажки					



ГУСТОТА ПЕРЕД ЗБИРАННЯМ


РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА, ТИС. РОСЛ./ГА

Недостатнє зволоження	55-60
Достатнє зволоження	65-70



РЕКОМЕНДОВАНІ ЗОНИ ВИРОЩУВАННЯ

- Полісся, Лісостеп, Степ



ЕС МОСКІТО

ФАО 350



КУКУРУДЗА НА ЗЕРНО 

КУКУРУДЗА НА СИЛОС 

Адаптація гібрида до кількості вологи у вегетаційний період



Адаптація гібрида до рівня технології



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип гібриду: **трьохлінійний**
- Тип зерна: **зубоподібний**
- Колір стрижня качана: **червоний**
- Необхідна сума температур (від 6 °C):
 - до цвітіння: **950**
 - силос (32% сухої речовини): **1640**
 - зерно (при вологості 32%): **1790**




ГОЛОВНІ ОСОБЛИВОСТІ

- Високий потенціал урожайності та швидка віддача вологи
- Толерантний до фузаріозу качана та летючої сажки
- Дуже добра компенсаційна здатність
- Ремонтантний
- Добра холодостійкість



СТРУКТУРА ВРОЖАЮ

- Висота рослин: **310 см**
- Висота кріплення качана: **135 см**



АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	більша чутливість			більша стійкість	
	5	6	7	8	9
Енергія початкового розвитку					
Стійкість до вилягання					
Толерантність:					
- до фузаріозу стебла					
- до фузаріозу качана					
- до гельмінтоспориозу					
- до пухирчастої сажки					
- до летючої сажки					



ГУСТОТА ПЕРЕД ЗБИРАННЯМ

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА, ТИС. РОСЛ./ГА

Недостатнє зволоження	55-60
Достатнє зволоження	65-70



РЕКОМЕНДОВАНІ ЗОНИ ВИРОЩУВАННЯ

- Лісостеп, Степ



Фунгіцидно-інсектицидна обробка насіння

ЕС СЕНСОР

ФАО 370



КУКУРУДЗА НА ЗЕРНО

Адаптація гібрида
до кількості вологи
у вегетаційний період



Адаптація гібрида
до рівня технології




ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип гібриду: **трьохлінійний**
- Тип зерна: **зубоподібний**
- Колір стрижня качана: **червоний**
- Необхідна сума температур (від 6 °C):
 - до цвітіння: **960**
 - сілос (32% сухої речовини): **1640**
 - зерно (при вологості 32%): **1800**



СТРУКТУРА ВРОЖАЮ

- Висота рослин: **260 см**
- Висота кріплення качана: **120 см**



ГУСТОТА ПЕРЕД ЗБИРАННЯМ

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА, ТИС. РОСЛ./ГА

Недостатнє зволоження	55-60
Достатнє зволоження	60-70



ГОЛОВНІ ОСОБЛИВОСТІ

- Високий потенціал урожайності в різних умовах вирощування
- Стійкий до посухи
- Дуже добра компенсаційна здатність. Формує великі качани
- Швидка віддача вологи. Стійкий до вилягання
- Високий вміст крохмалю



АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	більша чутливість			більша стійкість	
	5	6	7	8	9
Енергія початкового розвитку					
Стійкість до вилягання					
Толерантність:					
- до фузаріозу стебла					
- до фузаріозу качана					
- до гельмінтоспориозу					
- до пухирчастої сажки					
- до летючої сажки					



РЕКОМЕНДОВАНІ ЗОНИ ВИРОЩУВАННЯ

- Лісостеп, Степ



Фунгіцидно-інсектицидна обробка насіння

ЕС МІЛОРД

ФАО 380



Адаптація гібрида до кількості вологи у вегетаційний період



Адаптація гібрида до рівня технології



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип гібриду: **трьохлінійний**
- Тип зерна: **кременисто-зубоподібний**
- Колір стрижня качана: **червоний**
- Необхідна сума температур (від 6 °C):
 - до цвітіння: **940**
 - сілос (32% сухої речовини): **1610**
 - зерно (при вологості 32%): **1820**




ГОЛОВНІ ОСОБЛИВОСТІ

- Високий врожай за посушливих умов
- Стойкий до вилягання
- Відмінна стійкість до хвороб
- Можливе використання на сілос
- Стабільність врожаю



СТРУКТУРА ВРОЖАЮ

- Висота рослин: **295 см**
- Висота кріплення качана: **125 см**



АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	більша чутливість			більша стійкість	
	5	6	7	8	9
Енергія початкового розвитку					
Стойкість до вилягання					
Толерантність:					
- до фузаріозу стебла					
- до фузаріозу качана					
- до гельмінтоспоріозу					
- до пухирчастої сажки					
- до летючої сажки					



ГУСТОТА ПЕРЕД ЗБИРАННЯМ

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА, ТИС. РОСЛ./ГА

Недостатнє зволоження	55-60
Достатнє зволоження	60-70



РЕКОМЕНДОВАНІ ЗОНИ ВИРОЩУВАННЯ

- Лісостеп, Степ

ЕС МЕТОД

ФАО 380



КУКУРУДЗА НА ЗЕРНО



КУКУРУДЗА НА СИЛОС



Адаптація гібрида
до кількості вологи
у вегетаційний період



Адаптація гібрида
до рівня технології



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип гібриду: **простий**
- Тип зерна: **кременисто-зубоподібний
ближче до зубоподібного**
- Колір стрижня качана: **червоний**
- Необхідна сума температур (від 6 °C):
 - до цвітіння: **920**
 - силос (32% сухої речовини): **1610**
 - зерно (при вологості 32%): **1820**




ГОЛОВНІ ОСОБЛИВОСТІ

- Один із лідерів за врожайністю
- Дуже швидка вологовіддача, особливо наприкінці вегетаційного періоду
- Дуже висока толерантність до фузаріозу стебла та качана
- Пластичний до різних ґрунтово-кліматичних умов
- Швидкий стартовий ріст



СТРУКТУРА ВРОЖАЮ

- Висота рослин: **290 см**
- Висота кріплення качана: **125 см**



АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	більша чутливість			більша стійкість	
	5	6	7	8	9
Енергія початкового розвитку					
Стойкість до вилягання					
Толерантність:					
- до фузаріозу стебла					
- до фузаріозу качана					
- до гельмінтоспориозу					
- до пухирчастої сажки					
- до летючої сажки					



ГУСТОТА ПЕРЕД ЗБИРАННЯМ

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА, ТИС. РОСЛ./ГА

Недостатнє зволоження	55-60
Достатнє зволоження	60-70



РЕКОМЕНДОВАНІ ЗОНИ ВИРОЩУВАННЯ

- Лісостеп, Степ



Фунгіцидно-інсектицидна
обробка насіння з додаванням
регулятора росту

ГАРМОНІУМ

ФАО 380



КУКУРУДЗА НА ЗЕРНО



Адаптація гібрида
до кількості вологи
у вегетаційний період



Адаптація гібрида
до рівня технології




ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип гібриду: простий
- Тип зерна: зубоподібний
- Колір стрижня качана: рожевий
- Необхідна сума температур (від 6 °C):
 - до цвітіння: 950
 - сілос (32% сухої речовини): 1620
 - зерно (при вологості 32%): 1820



СТРУКТУРА ВРОЖАЮ

- Висота рослин: 256 см
- Висота кріплення качана: 107 см



ГУСТОТА ПЕРЕД ЗБИРАННЯМ

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА, ТИС. РОСЛ./ГА

Недостатнє зволоження 55-60

Достатнє зволоження 60-70



ГОЛОВНІ ОСОБЛИВОСТІ

- Високий та стабільний урожай в будь-яких ґрунтово-кліматичних умовах
- Високий компенсаційний потенціал. Стабільний за умов зріджених посівів
- Унікальна стійкість до стеблового і прикореневого вилягання (висока стійкість до фузаріозу стебла)



АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	більша чутливість			більша стійкість	
	5	6	7	8	9
Енергія початкового розвитку					
Стійкість до вилягання					
Толерантність:					
- до фузаріозу стебла					
- до фузаріозу качана					
- до гельмінтоспоріозу					
- до пухирчастої сажки					
- до летючої сажки					



РЕКОМЕНДОВАНІ ЗОНИ ВИРОЩУВАННЯ

- Лісостеп, Степ



Фунгіцидно-інсектицидна обробка насіння з додаванням інноваційного біостимулятора росту

ГІБРИДИ СОНЯШНИКА ЄВРАЛІС СЕМЕНС

Показники

		ЕС БЕЛЛА	ЕС НІАГАРА	ЕС САВАНА	ЕС НІРВАНА 	ЕС ПЕТУНІЯ	ЕС АНДРОМЕДА	ЕС ВЕРОНІКА
Стор.		23	24	25	26	27	28	29
Днів до цвітіння		66	71	67	68	69	71	70
Днів до збирання		104	104	104	107	109	109	112
Тип гібрида		пг	пг	пг	пг	пг	пг	пг
Стійкість до вовчка (раси)								
Висота рослин, см		150	185	157	177	170	165	160
Розмір кошика, см		22	23	23	24	23	23	23
Маса 1000 насінин, г		60	64	62	62	63	60	62
Нахил кошика		напів-нахилений донизу	нахилений донизу	напів-повернутий	напів-нахилений донизу	напів-нахилений донизу	напів-нахилений донизу	напів-нахилений донизу
Олійність, %		49-51	48-49	49	50-51	50	49-50	53-54
Вміст олеїнової кислоти, %								
Енергія початкового розвитку		8	8	9	9	9	8	9
Посухостійкість		8	8	9	8	8	9	8
Стійкість до вилягання		8	8	8	9	9	9	9
Толерантність до фомопсису		8	9	8	8	9	9	9
Толерантність до склеротиніозу кошика		8	8	8	8	8	7	9
Толерантність до склеротиніозу стебла		8	8	9	8	8	8	9
Толерантність до вертициліозу		8	8	8	9	8	8	9
Густота перед збиранням, тис./га*	Для зони недостатнього зволоження	50-55	50-55	50-55	50-55	50-55	50-55	50-55
	Для зони достатнього зволоження	60-65	60-65	60-65	60-65	60-65	60-65	60-65

*За умов дотримання технології і рівномірності розташування рослин в рядку.

ЕС АРТИК	ЕС РОМАНТИК	Гібриди, придатні до вирощування за системою Clearfield®						Clearfield® Plus			Sulfo	Класичний гібрид	
		ЕС БАЛІСТИК СЛ	ЕС АМІС СЛ	ЕС НОВАМІС СЛ	ЕС ТЕРРАМІС СЛ	ЕС ГЕНЕРАЛІС СЛ	ЕС ФЛОРІМІС	ЕС ГЕНЕЗІС	ЕС ЯНІС	ЕС ЛОРІС СЛП	ЕС АРКАДІЯ	ЕС МОНАЛІЗА	
													NEW
Високоолеїнові													
30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	
69	72	71	67	67	70	66	73	65	68	70	65	70	
107	109	109	105	105	108	108	111	102	107	109	104	100	
пг	пг	пг	пг	пг	пг	пг	пг	пг	пг	пг	пг	пг	
													
180	185	180	160	165	165	180	180	162	165	175	170	150	
20	23	21	22	23	22	24	23	22	24	24	22	23	
60	62	65	62	62	62	62	60	64	62	60	63	63	
напів-нахилений донизу	напів-припіднятий	напів-нахилений донизу	напів-нахилений донизу	напів-нахилений донизу	напів-нахилений донизу	донизу	напів-нахилений донизу	напів-припіднятий	напів-нахилений донизу	донизу	донизу	напів-припіднятий	нахилений донизу
51-52	49-50	47-48	49	47-48	46-47	50-51	49	48	46-47	50-51	46-47	50-51	
91-92	86	91											
8	7	7	9	9	7	8	9	9	9	8	9	9	
8	8	7	9	8	9	9	7	9	9	8	8	8	
7	8	8	9	9	8	7	8	9	8	7	8	8	
9	9	8	8	8	9	9	8	8	9	9	8	9	
7	8	8	7	8	8	8	9	8	8	9	8	8	
7	9	9	8	8	8	8	8	9	8	8	9	8	
9	8	8	7	8	8	8	8	8	7	8	8	8	
50-55	50-55	50-55	50-55	50-55	50-55	50-55	50-55	50-55	50-55	50-55	50-55	50-55	
60-65	60-65	55-60	60-65	60-65	60-65	60-65	60-65	60-65	60-65	60-65	60-65	60-65	

ЕС БЕЛЛА



ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ЛІДЕР ПРОДАЖІВ
СЕРЕД ГІБРИДІВ ЄВРАЛІС

СОНЯШНИК

- ✓ Стабільна врожайність
- ✓ Генетична стійкість до вовчка сьомої і вище рас
- ✓ Підтверджена репутація серед виробників соняшника



ЕС БЕЛЛА



СОНЯШНИК 

Продуктивність,
доведена практичним досвідом!



Лідер продажів серед гібридів Євраліс
в країнах Чорноморського басейну та СНД

ХАРАКТЕРИСТИКИ

-  Тип: простий гібрид
-  Ранній. Орієнтовна кількість днів:
 - сходи-цвітіння: 66
 - сходи-збирання: 104
-  Висота рослин: 150 см
-  Діаметр кошика: 22 см
-  Нахил кошика: напівнахилений донизу
-  Олійність: 49-51%

ГОЛОВНІ ОСОБЛИВОСТІ

-  Стабільно висока урожайність
-  Пластичність до різних умов вирощування
-  Стійкість до вовчка (раси >G), фітосанітарний ефект
-  Добра толерантність до хвороб
-  Стійкість до вилягання

ГУСТОТА ПЕРЕД ЗБИРАННЯМ


РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА, ТИС. РОСЛ./ГА

Недостатнє зволоження 50-55

Достатнє зволоження 60-65

РЕКОМЕНДОВАНІ ЗОНИ ВИРОЩУВАННЯ

 Степ, Лісостеп, Полісся



АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	більша чутливість			більша стійкість	
	5	6	7	8	9
Енергія початкового розвитку					
Посухостійкість					
Стійкість до вилягання					
Толерантність до фомопсису					
- до склеротиніозу кошика					
- до склеротиніозу стебла					
- до фомозу					
- до вертициліозу					

ЕС НІАГАРА



СОНЯШНИК



Універсальний
високопродуктивний гібрид!



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип: простий гібрид
- Раній. Орієнтовна кількість днів:
 - сходи-цвітіння: 71
 - сходи-збирання: 104
- Висота рослин: 185 см
- Діаметр кошика: 23 см
- Нахил кошика: нахилений донизу
- Олійність: 48-49%



ГОЛОВНІ ОСОБЛИВОСТІ

- Найвищий потенціал урожайності в ранній групі стиглості
- Висока стійкість до агресивних рас вовчка (>G)
- Стійкий до вилягання
- Посухостійкість
- Висока толерантність до хвороб



ГУСТОТА ПЕРЕД ЗБИРАННЯМ

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА, ТИС. РОСЛ./ГА

Недостатнє зволоження 50-55

Достатнє зволоження 60-65



РЕКОМЕНДОВАНІ ЗОНИ ВИРОЩУВАННЯ

- Степ, Лісостеп, Полісся



Фунгіцидно-інсектицидна обробка насіння



АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	більша чутливість			більша стійкість		
	5	6	7	8	9	
Енергія початкового розвитку						
Посухостійкість						
Стійкість до вилягання						
Толерантність до фомопсису						
- до склеротиніозу кошика						
- до склеротиніозу стебла						
- іржі						
- до вертициліозу						

ЕС САВАНА



СОНЯШНИК



Високий та стабільний урожай в умовах посухи, хвороб та вовчку!



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип: простий гібрид
- Ранній. Орієнтовна кількість днів:
 - сходи-цвітіння: 67
 - сходи-збирання: 104
- Висота рослин: 157
- Діаметр кошика: 23 см
- Нахил кошика: напівповернутий
- Олійність: 49%



ГОЛОВНІ ОСОБЛИВОСТІ

- Висока стійкість до посухи
- Пластичний гібрид помірно-інтенсивного типу
- Тolerантність до основних хвороб в умовах насиченої сівозміни



ГУСТОТА ПЕРЕД ЗБИРАННЯМ

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА, ТИС. РОСЛ./ГА

Недостатнє зволоження	50-55
Достатнє зволоження	60-65



РЕКОМЕНДОВАНІ ЗОНИ ВИРОЩУВАННЯ

- Північний Степ, Лісостеп, Полісся



Фунгіцидно-інсектицидна обробка насіння



АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	більша чутливість			більша стійкість		
	5	6	7	8	9	
Енергія початкового розвитку						
Посухостійкість						
Стойкість до вилягання						
Толерантність до фомопсису						
- до склеротиніозу кошика						
- до склеротиніозу стебла						
- іржі						
- до вертициліозу						

ЕС НІРВАНА



СОНЯШНИК 

НОВИНКА!

Створений для інтенсивної технології



ХАРАКТЕРИСТИКИ

-  Тип: **простий гібрид**
-  Середньоранній. Орієнтовна кількість днів:
 - сходи-цвітіння **68**
 - сходи-збирання: **107**
-  Висота рослин: **177 см**
-  Діаметр кошика: **24 см**
-  Нахил кошика: **напівнахилений донизу**
-  Олійність: **50-51%**



ГОЛОВНІ ОСОБЛИВОСТІ

-  Гібрид інтенсивного типу
-  Висока толерантність до основних хвороб, в тому числі нових рас несправжньої борошнистої роси
-  Високий вміст олії >50%



ГУСТОТА ПЕРЕД ЗБИРАННЯМ

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА, ТИС. РОСЛ./ГА

Недостатнє зволоження	50-55
Достатнє зволоження	60-65



РЕКОМЕНДОВАНІ ЗОНИ ВИРОЩУВАННЯ

-  Північний Степ, Лісостеп, Полісся



Фунгіцидно-інсектицидна обробка насіння



АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	більша чутливість			більша стійкість		
	5	6	7	8	9	
Енергія початкового розвитку						
Посухостійкість						
Стійкість до вилягання						
Толерантність до фомопсису						
- до склеротиніозу кошика						
- до склеротиніозу стебла						
- іржі						
- до вертициліозу						
- до несправжньої борошнистої роси						

ЕС ПЕТУНІЯ



СОНЯШНИК 

Якість визнана агровиробниками



ХАРАКТЕРИСТИКИ

-  Тип: простий гібрид
-  Середньоранній. Орієнтовна кількість днів:
 - сходи-цвітіння: 69
 - сходи-збирання: 109
-  Висота рослин: 170 см
-  Діаметр кошика: 23 см
-  Нахил кошика: напівнахилений донизу
-  Олійність: 50%

ГОЛОВНІ ОСОБЛИВОСТІ


-  Висока врожайність та вміст олії
-  Толерантний до хвороб, в тому числі до несправжньої борошнистої роси
-  Стійкий до вовчка (раси A-F, толерантний до G)

ГУСТОТА ПЕРЕД ЗБИРАННЯМ

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА, ТИС. РОСЛ./ГА	
Недостатнє зволоження	50-55
Достатнє зволоження	60-65

РЕКОМЕНДОВАНІ ЗОНИ ВИРОЩУВАННЯ

-  Північний Степ, Лісостеп, Полісся



Фунгіцидно-інсектицидна обробка насіння

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	більша чутливість			більша стійкість	
	5	6	7	8	9
Енергія початкового розвитку					
Посухостійкість					
Стійкість до вилягання					
Толерантність до фомопсису					
- до склеротиніозу кошика					
- до склеротиніозу стебла					
- до фомозу					
- до нових рас несправжньої борошнистої роси					

ЕС АНДРОМЕДА



СОНЯШНИК 

**Високопластичний
до будь-яких умов вирощування**



ХАРАКТЕРИСТИКИ

-  Тип: **простий гібрид**
-  Середньоранній. Орієнтовна кількість днів:
 - сходи-цвітіння: **71**
 - сходи-збирання: **109**
-  Висота рослин: **165 см**
-  Діаметр кошика: **23 см**
-  Нахил кошика: **напівнахилений донизу**
-  Олійність: **49-50%**



ГОЛОВНІ ОСОБЛИВОСТІ

-  Гібрид помірно-інтенсивного типу
-  Тolerантність до агресивних рас вовчка >G
-  Стейкий до вилягання
-  Висока посухостійкість
-  Тolerантність до хвороб



ГУСТОТА ПЕРЕД ЗБИРАННЯМ

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА, ТИС. РОСЛ./ГА

Недостатнє зволоження **50-55**

Достатнє зволоження **60-65**



РЕКОМЕНДОВАНІ ЗОНИ ВИРОЩУВАННЯ

-  Степ, Лісостеп, Полісся



Фунгіцидно-інсектицидна обробка насіння



АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	більша чутливість			більша стейкість		
	5	6	7	8	9	
Енергія початкового розвитку						
Посухостійкість						
Стейкість до вилягання						
Тolerантність до фомопсису						
- до склеротиніозу кошика						
- до склеротиніозу стебла						
- іржі						
- до вертициліозу						

ЕС ВЕРОНІКА



СОНЯШНИК



Генетична толерантність до хвороб забезпечує високу врожайність та вміст олії



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип: простий гібрид
- Середньоранній. Орієнтовна кількість днів:
 - сходи-цвітіння: 70
 - сходи-збирання: 112
- Висота рослин: 160 см
- Діаметр кошика: 23 см
- Нахил кошика: напівнахилений донизу
- Олійність: 53-54%



ГОЛОВНІ ОСОБЛИВОСТІ

- Гібрид інтенсивного типу
- Високий вміст олії
- Висока толерантність до хвороб, в тому числі до нових рас несправжньої борошністої роси



ГУСТОТА ПЕРЕД ЗБИРАННЯМ

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА, ТИС. РОСЛ./ГА

Недостатнє зволоження	50-55
Достатнє зволоження	60-65



РЕКОМЕНДОВАНІ ЗОНИ ВИРОЩУВАННЯ

- Північний Степ, Лісостеп, Полісся



Фунгіцидно-інсектицидна обробка насіння



АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	більша чутливість			більша стійкість		
	5	6	7	8	9	
Енергія початкового розвитку						
Посухостійкість						
Стойкість до вилягання						
Толерантність до фомопсису						
- до склеротиніозу кошика						
- до склеротиніозу стебла						
- іржі						
- до вертициліозу						
- до нових рас несправжньої борошністої роси						

ЕС АРТІК



СОНЯШНИК 

Гібрид із надзвичайно високим вмістом
олеїнової кислоти — 92%!



ХАРАКТЕРИСТИКИ

-  Тип: **простий гібрид**
-  Середньоранній. Орієнтовна кількість днів:
 - сходи-цвітіння **69**
 - сходи-збирання: **107**
-  Висота рослин: **180 см**
-  Діаметр кошика: **20 см**
-  Нахил кошика: **напівнахилений донизу**
-  Олійність: **51-52%**
-  Вміст олеїнової кислоти: **91-92%**



ГОЛОВНІ ОСОБЛИВОСТІ

-  Високий вміст олії та олеїнової кислоти
-  Висока стійкість до хвороб
-  Стійкість до вовчка (раси А-6)



ГУСТОТА ПЕРЕД ЗБИРАННЯМ

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА, ТИС. РОСЛ./ГА

Недостатнє зволоження **50-55**

Достатнє зволоження **60-65**



РЕКОМЕНДОВАНІ ЗОНИ ВИРОЩУВАННЯ

-  Лісостеп, Полісся, Північний Степ



Фунгіцидно-інсектицидна обробка насіння



АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	більша чутливість			більша стійкість	
	5	6	7	8	9
Енергія початкового розвитку					
Посухостійкість					
Стійкість до вилягання					
Толерантність до фомопсису					
- до склеротиніозу кошика					
- до склеротиніозу стебла					
- до фомозу					
- до вертициліозу					

ЕС РОМАНТІК



СОНЯШНИК



Досягнення високого рівня
врожайності при високому вмісті
олії та олеїнової кислоти (A-G)



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип: простий гібрид
- Середньоранній. Орієнтовна кількість днів:
 - сходи-цвітіння 72
 - сходи-збирання 109
- Висота рослин: 185 см
- Діаметр кошика: 23 см
- Нахил кошика: напівприпіднятий
- Олійність: 49-50%
- Вміст олеїнової кислоти: 86%



ГОЛОВНІ ОСОБЛИВОСТІ

- Високоолеїновий гібрид інтенсивного типу
- Високий потенціал урожайності
- Стійкий до вовчка раси A-G
- Толерантний до хвороб
- Високий вміст олеїнової кислоти



ГУСТОТА ПЕРЕД ЗБИРАННЯМ

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА, ТИС. РОСЛ./ГА

Недостатнє зволоження 50-55

Достатнє зволоження 60-65



РЕКОМЕНДОВАНІ ЗОНИ ВИРОЩУВАННЯ

- Степ, Лісостеп, Полісся



Фунгіцидно-інсектицидна
обробка насіння



АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	більша чутливість			більша стійкість	
	5	6	7	8	9
Енергія початкового розвитку					
Посухостійкість					
Стійкість до вилягання					
Толерантність до фомопсису					
- до склеротиніозу кошика					
- до склеротиніозу стебла					
- іржі					
- до вертициліозу					
- до нових рас несправжньої борошнистої роси					

ЕС БАЛІСТІК СЛ



СОНЯШНИК 

Поєднання високого вмісту
олеїнової кислоти
зі стабільним рівнем врожайності



ХАРАКТЕРИСТИКИ

-  Тип: **простий гібрид**
-  Середньоранній. Орієнтовна кількість днів:
 - сходи-цвітіння **71**
 - сходи-збирання: **109**
-  Висота рослин: **180 см**
-  Діаметр кошика: **21 см**
-  Нахил кошика: **напівнахилений донизу**
-  Олійність: **47-48%**
-  Вміст олеїнової кислоти: **91%**

ГОЛОВНІ ОСОБЛИВОСТІ

-  Високоолеїновий гібрид, адаптований до технології Clearfield®
-  Гібрид помірно-інтенсивного типу
-  Високий вміст олії та олеїнової кислоти
-  Толерантність до основних хвороб


ГУСТОТА ПЕРЕД ЗБИРАННЯМ

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА, ТИС. РОСЛ./ГА

Недостатнє зволоження	50-55
Достатнє зволоження	60-65

РЕКОМЕНДОВАНІ ЗОНИ ВИРОЩУВАННЯ

-  Степ, Лісостеп



АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	більша чутливість			більша стійкість	
	5	6	7	8	9
Енергія початкового розвитку					
Посухостійкість					
Стойкість до вилягання					
Толерантність до фомопсису					
- до склеротиніозу кошика					
- до склеротиніозу стебла					
- до вертициліозу					

ЕС АМІС СЛ



СОНЯШНИК 

Стабільний результат
за будь-яких умов



Clearfield®

Виробнича система для соняшнику



ХАРАКТЕРИСТИКИ

-  Тип: простий гібрид
-  Ранній. Орієнтовна кількість днів:
 - сходи-цвітіння 67
 - сходи-збирання 105
-  Висота рослин: 160 см
-  Діаметр кошика: 22 см
-  Нахил кошика: напівнахилений донизу
-  Олійність: 49%



ГОЛОВНІ ОСОБЛИВОСТІ

-  Гібрид помірно-інтенсивного типу
-  Пластичність до різних ґрунтово-кліматичних умов вирощування
-  Висока посухостійкість
-  Швидкий стартовий ріст
-  Стьйкість до вилягання
-  Толерантність до основних хвороб



ГУСТОТА ПЕРЕД ЗБИРАННЯМ

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА, ТИС. РОСЛ./ГА

Недостатнє зволоження	50-55
Достатнє зволоження	60-65



РЕКОМЕНДОВАНІ ЗОНИ ВИРОЩУВАННЯ

-  Степ, Лісостеп



Фунгіцидно-інсектицидна обробка насіння



АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	більша чутливість			більша стійкість		
	5	6	7	8	9	
Енергія початкового розвитку						
Посухостійкість						
Стьйкість до вилягання						
Толерантність до фомопсису						
- до склеротиніозу кошика						
- до склеротиніозу стебла						
- до фомозу						
- до вертициліозу						

ЕС НОВАМІС СЛ



СОНЯШНИК 

Ідеально поєднує генетичну
резистентність до вовчка та придатність
до вирощування за системою Clearfield®



Clearfield®

Виробнича система для соняшнику



MASTER®
by Euralis



ХАРАКТЕРИСТИКИ

-  Тип: простий гібрид
-  Ранній. Орієнтовна кількість днів:
 - сходи-цвітіння 67
 - сходи-збирання 105
-  Висота рослин: 165 см
-  Діаметр кошика: 23 см
-  Нахил кошика: напівнахилений донизу
-  Олійність: 47-48%



ГОЛОВНІ ОСОБЛИВОСТІ

-  Гібрид помірно-інтенсивного типу
-  Пластичність до різних ґрунтово-кліматичних умов вирощування
-  Висока посухостійкість
-  Швидкий стартовий ріст
-  Стійкість до рас вовчка A-F
-  Придатний до вирощування за технологією Clearfield®



ГУСТОТА ПЕРЕД ЗБИРАННЯМ

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА, ТИС. РОСЛ./ГА

Недостатнє зволоження 50-55

Достатнє зволоження 60-65



РЕКОМЕНДОВАНІ ЗОНИ ВИРОЩУВАННЯ

 Степ, Лісостеп, Полісся



Фунгіцидно-інсектицидна обробка насіння



АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	більша чутливість			більша стійкість		
	5	6	7	8	9	
Енергія початкового розвитку						
Посухостійкість						
Стійкість до вилягання						
Толерантність до фомопсису						
- до склеротиніозу кошика						
- до склеротиніозу стебла						
- до фомозу						
- до вертициліозу						
- до несправжньої борошністої роси						

ЕС ТЕРРАМІС СЛ



СОНЯШНИК 

Середньоранній Clearfield® гібрид,
толерантний до фомопсису,
стійкий до вовчка (A-F)!



Clearfield®

Виробнича система для соняшнику



MASTER®
by Euralis



ХАРАКТЕРИСТИКИ

-  Тип: простий гібрид
-  Середньоранній. Орієнтовна кількість днів:
 - сходи-цвітіння 70
 - сходи-збирання 108
-  Висота рослин: 165 см
-  Діаметр кошика: 22см
-  Нахил кошика: донизу
-  Олійність: 46-47%



ГОЛОВНІ ОСОБЛИВОСТІ

-  Гібрид інтенсивного типу
-  Стійкий до посухи
-  Стійкість до агресивних рас вовчка A-F, адаптований до технології Clearfield®
-  Толерантність до хвороб



ГУСТОТА ПЕРЕД ЗБИРАННЯМ

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА, ТИС. РОСЛ./ГА

Недостатнє зволоження	50-55
Достатнє зволоження	60-65



РЕКОМЕНДОВАНІ ЗОНИ ВИРОЩУВАННЯ

-  Степ, Лісостеп, Полісся



АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	більша чутливість			більша стійкість	
	5	6	7	8	9
Енергія початкового розвитку					
Посухостійкість					
Стійкість до вилягання					
Толерантність до фомопсису					
- до склеротиніозу кошика					
- до склеротиніозу стебла					
- до вертициліозу					



Фунгіцидно-інсектицидна обробка насіння

ЕС ГЕНЕРАЛІС СЛ



СОНЯШНИК

НОВИНКА!

Максимальний потенціал в кожній рослині



Clearfield®

Виробнича система для соняшнику



MASTER®
by Euralis



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип: **простий гібрид**
- Ранній. Орієнтовна кількість днів:
 - сходи-цвітіння **66**
 - сходи-збирання: **108**
- Висота рослин: **180 см**
- Діаметр кошика: **24 см**
- Нахил кошика: **напівнахилений донизу**
- Олійність: **50-51%**



ГОЛОВНІ ОСОБЛИВОСТІ

- Гібрид інтенсивного типу з високим потенціалом урожаю
- Резистентність до вовчку A-G та відмінна адаптація до Євро-Лайтнінг® гербіциду
- Висока адаптивність до ґрунтово-кліматичних умов вирощування
- Толерантність до основних хвороб, в тому числі які важко контролюються фунгіцидами.
- Високий вміст олії



ГУСТОТА ПЕРЕД ЗБИРАННЯМ

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА, ТИС. РОСЛ./ГА

Недостатнє зволоження	50-55
Достатнє зволоження	60-65



РЕКОМЕНДОВАНІ ЗОНИ ВИРОЩУВАННЯ

- Степ, Лісостеп, Полісся



Фунгіцидно-інсектицидна обробка насіння



АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	більша чутливість			більша стійкість	
	5	6	7	8	9
Енергія початкового розвитку					
Посухостійкість					
Стійкість до вилягання					
Толерантність до фомопсису					
- до склеротиніозу кошика					
- до склеротиніозу стебла					
- іржі					
- до вертициліозу					
- до несправжньої борошністої роси					

ЕС ФЛОРИМІС



СОНЯШНИК 

Стабільність врожаю
доведена роками



Clearfield®

Виробнича система для соняшнику



ХАРАКТЕРИСТИКИ

-  Тип: простий гібрид
-  Середньостиглий. Орієнтовна кількість днів:
 - сходи-цвітіння 73
 - сходи-збирання 111
-  Висота рослин: 180 см
-  Діаметр кошика: 23 см
-  Нахил кошика: напівприпіднятий
-  Олійність: 49%



ГОЛОВНІ ОСОБЛИВОСТІ

-  Гібрид інтенсивного типу
-  Швидкий стартовий ріст. Добре використання осінньо-зимових запасів вологи
-  Тolerантність до основних хвороб



ГУСТОТА ПЕРЕД ЗБИРАННЯМ

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА, ТИС. РОСЛ./ГА

Недостатнє зволоження 50-55

Достатнє зволоження 60-65



РЕКОМЕНДОВАНІ ЗОНИ ВИРОЩУВАННЯ

-  Північний Степ, Лісостеп



Фунгіцидно-інсектицидна обробка насіння



АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	більша чутливість			більша стійкість		
	5	6	7	8	9	
Енергія початкового розвитку						
Посухостійкість						
Стойкість до вилягання						
Тolerантність до фомопсису						
- до склеротиніозу кошика						
- до склеротиніозу стебла						
- до фомозу						
- до вертициліозу						
- до несправжньої борошністої роси						

ЕС ГЕНЕЗІС



СОНЯШНИК 

Генератор врожаю!



Clearfield[®] Plus

Виробнича система для соняшнику



MASTER[™]
by Euralis



ХАРАКТЕРИСТИКИ

-  Тип: **простий гібрид**
-  Середньоранній. Орієнтовна кількість днів:
 - сходи-цвітіння **65**
 - сходи-збирання: **102**
-  Висота рослин: **162 см**
-  Діаметр кошика: **22 см**
-  Нахил кошика: **напівнахилений донизу**
-  Олійність: **48%**



ГОЛОВНІ ОСОБЛИВОСТІ

-  Гібрид інтенсивного типу
-  Пластичний до вирощування в різних ґрунтово-кліматичних умовах
-  Висока стійкість до посухи
-  Висока енергія початкового розвитку
-  Толерантність до хвороб



ГУСТОТА ПЕРЕД ЗБИРАННЯМ

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА, ТИС. РОСЛ./ГА

Недостатнє зволоження **50-55**

Достатнє зволоження **60-65**



РЕКОМЕНДОВАНІ ЗОНИ ВИРОЩУВАННЯ

-  Степ, Лісостеп, Полісся



Фунгіцидно-інсектицидна обробка насіння



АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	більша чутливість			більша стійкість		
	5	6	7	8	9	
Енергія початкового розвитку						
Посухостійкість						
Стійкість до вилягання						
Толерантність до фомопсису						
- до склеротиніозу кошика						
- до склеротиніозу стебла						
- іржі						
- до вертициліозу						
- до несправжньої борошністої роси						

ЕС ЯНІС



СОНЯШНИК 

Вищий потенціал врожайності
в сегменті Clearfield Plus®

 **Clearfield® Plus**
Виробнича система для соняшнику



ХАРАКТЕРИСТИКИ

-  Тип: простий гібрид
-  Середньоранній. Орієнтовна кількість днів:
 - сходи-цвітіння 68
 - сходи-збирання 107
-  Висота рослин: 165 см
-  Діаметр кошика: 24 см
-  Нахил кошика: донизу
-  Олійність: 46-47%

ГОЛОВНІ ОСОБЛИВОСТІ

-  Гібрид інтенсивного типу.
-  Резистентність до рас вовчка A-G
-  Висока адаптивність до посухи та надмірного зволоження
-  Толерантність до хвороб

ГУСТОТА ПЕРЕД ЗБИРАННЯМ

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА, ТИС. РОСЛ./ГА


Недостатнє зволоження	50-55
Достатнє зволоження	60-65

РЕКОМЕНДОВАНІ ЗОНИ ВИРОЩУВАННЯ

-  Степ, Лісостеп, Полісся

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	більша чутливість			більша стійкість	
	5	6	7	8	9
Енергія початкового розвитку					
Посухостійкість					
Стойкість до вилягання					
Толерантність до фомопсису					
- до склеротиніозу кошика					
- до склеротиніозу стебла					
- іржі					



ЕС ЛОРІС СЛП



СОНЯШНИК 

НОВИНКА!

Час вишуканих гібридів з
досконалою генетикою



Clearfield[®] Plus

Виробнича система для соняшнику



MASTER[®]
by Euralis



ХАРАКТЕРИСТИКИ

-  Тип: **простий гібрид**
-  Середньоранній. Орієнтовна кількість днів:
 - сходи-цвітіння **70**
 - сходи-збирання: **109**
-  Висота рослин: **175 см**
-  Діаметр кошика: **24 см**
-  Нахил кошика: **донизу**
-  Олійність: **50-51%**



ГОЛОВНІ ОСОБЛИВОСТІ

-  Гібрид інтенсивного типу
-  Широка кліматична адаптація. Висока посухо- та жаростійкість.
-  Поеднує високу стійкості до вовчку рас А-6 та стійкості до гербіциду Євро-Лайтнінг[®] Плюс
-  Толерантність до основних хвороб
-  Високий вміст олії



ГУСТОТА ПЕРЕД ЗБИРАННЯМ

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА, ТИС. РОСЛ./ГА

Недостатнє зволоження **50-55**

Достатнє зволоження **60-65**



РЕКОМЕНДОВАНІ ЗОНИ ВИРОЩУВАННЯ

-  Північний Степ, Лісостеп



Фунгіцидно-інсектицидна обробка насіння



АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	більша чутливість			більша стійкість	
	5	6	7	8	9
Енергія початкового розвитку					
Посуhostійкість					
Стійкість до вилягання					
Толерантність до фомопсису					
- до склеротиніозу кошика					
- до склеротиніозу стебла					
- іржі					
- до вертициліозу					
- до несправжньої борошністої роси					

ЕС АРКАДІЯ



СОНЯШНИК



Ранній гібрид СУЛЬФО,
стійкий до вовчка



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип: простий гібрид
- Ранній. Орієнтовна кількість днів:
 - сходи-цвітіння 65
 - сходи-збирання 104
- Висота рослин: 170 см
- Діаметр кошика: 22 см
- Нахил кошика: напівприпіднятий
- Олійність: 46-47%



ГОЛОВНІ ОСОБЛИВОСТІ

- Ранній гібрид Сульфo
- Гомозиготний тип стійкості до гербіциду трибенурон-метил
- Стійкість до вовчка рас А-6
- Високий генетичний імунітет до основних захворювань
- Успішний досвід вирощування в Болгарії, Румунії та Молдові



ГУСТОТА ПЕРЕД ЗБИРАННЯМ

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА, ТИС. РОСЛ./ГА

Недостатнє зволоження	50-55
Достатнє зволоження	60-65



РЕКОМЕНДОВАНІ ЗОНИ ВИРОЩУВАННЯ

- Степ, Лісостеп



Фунгіцидно-інсектицидна обробка насіння



АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	більша чутливість			більша стійкість		
	5	6	7	8	9	
Енергія початкового розвитку						
Посухостійкість						
Стійкість до вилягання						
Толерантність до фомопсису						
- до склеротиніозу кошика						
- до склеротиніозу стебла						
- до іржі						
- до несправжньої борошнистої роси						

ЕС МОНАЛІЗА



СОНЯШНИК



Назвичайно раннє отримання високого врожаю



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип: простий гібрид
- Ранній. Орієнтовна кількість днів:
 - сходи-цвітіння 70
 - сходи-збирання 100
- Висота рослин: 150 см
- Діаметр кошика: 23 см
- Нахил кошика: нахилений донизу
- Олійність: 50-51%



ГОЛОВНІ ОСОБЛИВОСТІ

- Гібрид інтенсивного типу
- Висока толерантність до основних хвороб
- Високий вміст олії



ГУСТОТА ПЕРЕД ЗБИРАННЯМ

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА, ТИС. РОСЛ./ГА

Недостатнє зволоження 50-55

Достатнє зволоження 60-65



РЕКОМЕНДОВАНІ ЗОНИ ВИРОЩУВАННЯ

- Лісостеп, Полісся



Фунгіцидно-інсектицидна обробка насіння



АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	більша чутливість			більша стійкість	
	5	6	7	8	9
Енергія початкового розвитку					
Посухостійкість					
Стойкість до вилягання					
Толерантність до фомопсису					
- до склеротиніозу кошика					
- до склеротиніозу стебла					
- іржі					
- до вертициліозу					

СОРТИ СОЇ ЄВРАЛІС СЕМЕНС	АЛІГАТОР	ЕС СЕНАТОР	ЕС НАВІГАТОР	ЕС ТЕНОР	ЕС МЕНТОР	ЕС ГЛАДІАТОР
Показники						
Стор.	44	45	46	47	48	49
Група стиглості	дуже ранній, 000	дуже ранній, 000	дуже ранній, 000	ранній, 00	ранній, 00	середньо- ранній, 0
Сума ефективних температур (від 6°C до 27°C)	1400	1400	1400	1400	1440	1480
Висота рослин, см	74	81	78	77	77	88
Висота кріплення нижнього боба, см	12	12	12	12	13,3	13
Маса 1000 насінин, г	180	186	210	188	197	229
Вміст білка, %	40,5	41,0	42,0	43,0	42,8	42,9
Вміст жиру, %	21,0	20,0	20,0	20,5	20,5	20,5
Енергія початкового розвитку	9	8	8	8	8	8
Стійкість до стресів	8	8	8	8	8	7
Стійкість до вилягання	9	8	8	9	9	9
Толерантність до склеротиніозу	8	8	8	8	8	8
Рекомендована густина сівби, тис./га	700	700	600	650	550	500

*За умов дотримання технології і рівномірності розташування рослин в рядку.

АЛІГАТОР




СОЯ 

ДУЖЕ РАННІЙ, 000
Високопродуктивний ультраранній сорт



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Сума ефективних температур (від 6°C до 27°C) **1400° C**
- Вміст білка **40,5%**
- Вміст жиру **21,0%**
- Висота рослини **74 см**
- Висота кріплення нижнього боба **12 см**
- Колір боба **жовтий**



ГОЛОВНІ ОСОБЛИВОСТІ

- Дуже ранній
- Прекрасна врожайність
- Стійкість до вилягання
- Швидке досягання врожаю
- Максимальна реалізація генетичного потенціалу за звичайного рядкового способу сівби



РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА ВИСІВУ

- 700 тис. насінин/га



РЕКОМЕНДОВАНІ ЗОНИ ВИРОЩУВАННЯ

- Лісостеп, Полісся



АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	більша чутливість			більша стійкість	
	5	6	7	8	9
Енергія початкового розвитку					
Стійкість до стресів					
Стійкість до вилягання					
Стійкість до склеротиніозу					

ЕС СЕНАТОР



СОЯ 


ДУЖЕ РАННІЙ, 000

Дуже пластичний сорт, із високим вмістом протеїну,
стійкий до стресових умов!



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Сума ефективних температур (від 6°C до 27°C) **1400° C**
- Вміст білка **41,0%**
- Вміст жиру **20,0%**
- Висота рослини **81 см**
- Висота кріплення нижнього боба **12 см**
- Колір боба **коричневий**



ГОЛОВНІ ОСОБЛИВОСТІ

- Поєднання ранньостиглості та врожайності
- Толерантний до стресів
- Толерантний до хвороб
- Стійкий до вилягання
- Здатність до гілкування
- Адаптований до різних способів сівби



РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА ВИСІВУ

- 700 тис. насінин/га



РЕКОМЕНДОВАНІ ЗОНИ ВИРОЩУВАННЯ

- Степ, Лісостеп, Полісся



АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	більша чутливість			більша стійкість	
	5	6	7	8	9
Енергія початкового розвитку					
Стійкість до стресів					
Стійкість до вилягання					
Стійкість до склеротиніозу					



СОЯ 


РАННІЙ, 000

Високоврожайний сорт з високою комплексною стійкістю до хвороб



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Сума ефективних температур (від 6°C до 27°C) **1400° C**
- Вміст білка **42%**
- Вміст жиру **20%**
- Висота рослини **78 см**
- Висота кріплення нижнього боба **12 см**
- Колір боба **червоно-коричневий**



ГОЛОВНІ ОСОБЛИВОСТІ

- Добра посухостійкість
- Стійкий до розтріскування бобів
- Пластичний та стабільний за врожайністю
- Стійкий до вилягання



РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА ВИСІВУ

- 600 тис. насінин/га



РЕКОМЕНДОВАНІ ЗОНИ ВИРОЩУВАННЯ

- Степ, Лісостеп, Полісся



АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	більша чутливість			більша стійкість		
	5	6	7	8	9	
Енергія початкового розвитку						
Стійкість до стресів						
Стійкість до вилягання						
Стійкість до склеротиніозу						

ЕС ТЕНОР



СОЯ


НОВИНКА! РАННІЙ, 00

Ранній, стабільний сорт, із високим вмістом білка, стійкий до вилягання



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Сума ефективних температур (від 6°C до 27°C) **1400° C**
- Вміст білка **43,0%**
- Вміст жиру **20,5%**
- Висота рослини **77 см**
- Висота кріплення нижнього боба **12 см**
- Колір боба **коричневий**



ГОЛОВНІ ОСОБЛИВОСТІ

- Ранньостиглий
- Стійкий до вилягання
- Високий вміст білку
- Високий потенціал врожайності
- Стійкий до осипання



РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА ВИСІВУ

- 650 тис. насінин/га



РЕКОМЕНДОВАНІ ЗОНИ ВИРОЩУВАННЯ

- Степ, Лісостеп



АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	більша чутливість			більша стійкість	
	5	6	7	8	9
Енергія початкового розвитку					
Стійкість до стресів					
Стійкість до вилягання					
Стійкість до склеротиніозу					



СОЯ 


РАННІЙ, 00

Прекрасне поєднання високої стабільної врожайності та вмісту протеїну



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Сума ефективних температур (від 6°C до 27°C) **1440° C**
- Вміст білка **42,8%**
- Вміст жиру **20,5%**
- Висота рослини **77 см**
- Висота кріплення нижнього боба **13,3 см**
- Колір боба **коричневий**



ГОЛОВНІ ОСОБЛИВОСТІ

- Стабільна врожайність
- Пластичний та імунний до шкідливих організмів сорт
- Інтенсивне гілкування — прекрасна реакція на широкорядний спосіб сівби
- Генетична особливість — 70-80% бобів формуються у середньому і верхньому ярусах
- Високий вміст протеїну



РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА ВИСІВУ

- 550 тис. насінин/га



РЕКОМЕНДОВАНІ ЗОНИ ВИРОЩУВАННЯ

- Степ, Лісостеп



АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	більша чутливість			більша стійкість	
	5	6	7	8	9
Енергія початкового розвитку					
Стійкість до стресів					
Стійкість до вилягання					
Стійкість до склеротиніозу					

ЕС ГЛАДІАТОР



СОЯ 


СЕРЕДНЬОРАННІЙ, 0

Стабільно високоврожайний сорт в своїй групі



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Сума ефективних температур (від 6°C до 27°C) 1480° C
- Вміст білка 42,9%
- Вміст жиру 20,5%
- Висота рослини 88 см
- Висота кріплення нижнього боба 13 см
- Колір боба сірий



ГОЛОВНІ ОСОБЛИВОСТІ

- Високий потенціал врожайності
- Стійкий до вилягання
- Високий вміст протеїну



РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА ВИСІВУ

- 550 тис. насінин/га



РЕКОМЕНДОВАНІ ЗОНИ ВИРОЩУВАННЯ

- Степ, Лісостеп



АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	більша чутливість			більша стійкість	
	5	6	7	8	9
Енергія початкового розвитку					
Стійкість до стресів					
Стійкість до вилягання					
Стійкість до склеротиніозу					

ГІБРИДИ СОРГО ЄВРАЛІС СЕМЕНС		NEW АРСКІ	АЛБАНУС	NEW ЕС МУССОН	NEW КАЛАТУР	ЕС АЛІЗЕ	ЕС ФОЕН	ЕС АРМАТАН
Показники								
Стор.		51	52	53	54	55	56	57
Напрям використання		зернове	зернове	зернове	зернове	зернове	зернове	силос
Тип гібрида		пг	пг	пг	пг	пг	пг	пг
Вміст крохмалю		76,5	65,3	66,0	64,6	74,0	65,6	25-30
Еквівалент ФАО кукурудзи		280-320	300-350	320-400	400-450	400-480	380-450	480-550
Колір зерна		помаранчевий	білий	білий	білий	помаранчевий	червоно-кремовий	білий
$\sum t \text{ }^{\circ}\text{C (6 }^{\circ}\text{C)}$ від сівби до появи волоті		875	910	920	940	950	920	Вегетаційний період 115 днів або 1750 $^{\circ}\text{C}$ до 30% сухої речовини
$\sum t \text{ }^{\circ}\text{C (6 }^{\circ}\text{C)}$ до вологості зерна в 25%		1700	1830	1840	1860	1880	1860	
Висота рослини, см		110	115	120	120	116	125	180
Форма волоті		щільна	щільна	напів-щільна	щільна	напів-щільна	напів-щільна	напівщільна
Довжина волоті, см		26	30	28	27	27	28	
Маса 1000 насінин, г		30	30	30	31	33	34	
Енергія початкового росту		8	9	8	8	7	9	9
Стійкість до вилягання		9	8	9	8	9	9	9
Стійкість до посухи		8	8	9	8	9	9	8
Стійкість до осипання		9	8	8	8	9	9	
Толерантність до фузаріозу		9	8	9	8	9	9	8
Перетравність, %								60-65%
Розчинні цукри, %								28,8
Рекомендована норма висіву, тис. насінин/га	для зони недостатнього зволоження	220-240	200-240	180-220	180-220	160-200	160-200	180-220
	для зони достатнього зволоження	250-270	240-280	220-240	220-260	200-240	200-240	220-260
	на поливі	270-330	280-320	250-280	260-300	240-280	240-280	260-300

*За умов дотримання технології і рівномірності розташування рослин в рядку.



СОРГО

НОВИНКА!

Поєднання ранньостиглості з врожайністю та стійкістю до посухи



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Напрямок використання: зернове
- Тип гібриду: простий
- Вміст білка: 10,8%
- Вміст крохмалю: 76,5%
- Еквівалент ФАО кукурудзи: 280-320
- Колір зерна: помаранчевий
- Сума температур (6°C)
 - від сівби до появи волоті: 875 °C
 - до вологості зерна 25%: 1700 °C
- Висота рослини: 110 см
- Довжина волоті: 26 см
- Форма волоті: щільна
- Маса 1000 насінин: 30 г



ГОЛОВНІ ОСОБЛИВОСТІ

- Дуже ранній гібрид сорго
- Характеризується швидким стартовим ростом на перших етапах розвитку
- Добра стійкість до вилягання
- Швидка віддача вологи під час дозрівання



АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	більша чутливість			більша стійкість	
	5	6	7	8	9
Енергія початкового розвитку					
Стійкість до вилягання					
Стійкість до посухи					
Стійкість до осипання					
Толерантність до фузаріозу					



РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА ВИСІВУ

Недостатнє зволоження, тис. нас./га	220-240
Достатнє зволоження, тис. нас./га	250-270
На поливі, тис. нас./га	270-330



РЕКОМЕНДОВАНІ ЗОНИ ВИРОЩУВАННЯ

- Степ, Лісостеп, Полісся

АЛБАНУС



СОРГО



РАННІЙ

Стабільний, адаптований до стресових умов, стійкий до фузаріозу!



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напрям використання:	зернове
Тип гібриду:	простий
Вміст білка:	9,1%
Вміст крохмалю:	65,3%
Еквівалент ФАО кукурудзи:	300-350
Колір зерна:	білий
Сума температур (6°C)	
• від сівби до появи волоті:	910 °C
• до вологості зерна 25%:	1830 °C
Висота рослини:	115 см
Довжина волоті:	30 см
Форма волоті:	щільна
Маса 1000 насінин:	30 г



ГОЛОВНІ ОСОБЛИВОСТІ

- Стабільний при вирощуванні в стресових умовах
- Висока енергія початкового розвитку
- Стійкий до посухи
- Стійкий до фузаріозу та вилягання



АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	більша чутливість			більша стійкість		
	5	6	7	8	9	
Енергія початкового розвитку						
Стійкість до вилягання						
Стійкість до посухи						
Стійкість до осипання						
Толерантність до фузаріозу						



РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА ВИСІВУ

Недостатнє зволоження, тис. нас./га	200-240
Достатнє зволоження, тис. нас./га	240-280
На поливі, тис. нас./га	280-320



РЕКОМЕНДОВАНІ ЗОНИ ВИРОЩУВАННЯ

- Степ, Лісостеп, Полісся



Насіння оброблене протруйником

СОРГО

ЕС МУССОН



СОРГО

НОВИНКА!

Середньоранній гібрид сорго із доброю стійкістю до фузаріозу та вилягання



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Напрямок використання: зернове
- Тип гібриду: простий
- Вміст крохмалю: 12%
- Вміст білка: 66,0%
- Еквівалент ФАО кукурудзи: 320-400
- Колір зерна: білий
- Сума температур (6°C)
 - від сівби до появи волоті: 920 °C
 - до вологості зерна 25%: 1840 °C
- Висота рослини: 120 см
- Довжина волоті: 28 см
- Форма волоті: напівщільна
- Маса 1000 насінин: 30 г



ГОЛОВНІ ОСОБЛИВОСТІ

- Середньоранній гібрид сорго
- Низькоросла рослина з високою стійкістю до полягання
- Характеризується стабільністю та високою урожайністю в посушливих умовах
- Висока толерантність до фузаріозу



АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	більша чутливість			більша стійкість	
	5	6	7	8	9
Енергія початкового розвитку					
Стійкість до вилягання					
Стійкість до посухи					
Стійкість до осипання					
Толерантність до фузаріозу					



РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА ВИСІВУ

Недостатнє зволоження, тис. нас./га	180-220
Достатнє зволоження, тис. нас./га	220-240
На поливі, тис. нас./га	250-280



РЕКОМЕНДОВАНІ ЗОНИ ВИРОЩУВАННЯ

- Степ, Лісостеп

КАЛАТУР



СОРГО

НОВИНКА!

Високоврожайний білозерний гібрид сорго зі стійкістю до осипання



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напрямок використання:	зернове
Тип гібриду:	простий
Вміст білка:	8,9%
Вміст крохмалю:	64,6%
Еквівалент ФАО кукурудзи:	400-450
Колір зерна:	білий
Сума температур (6°C)	
• від сівби до появи волоті:	940 °C
• до вологості зерна 25%:	1860 °C
Висота рослини:	120 см
Довжина волоті:	28 см
Форма волоті:	щільна
Маса 1000 насінин:	31 г



ГОЛОВНІ ОСОБЛИВОСТІ

- Середньоранній гібрид сорго
- Характеризується високою урожайністю в посушливих умовах
- Зерно високої якості завдяки високій толерантності до основних хвороб
- Стабільний



АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	більша чутливість			більша стійкість		
	5	6	7	8	9	
Енергія початкового розвитку						
Стійкість до вилягання						
Стійкість до посухи						
Стійкість до осипання						
Толерантність до фузаріозу						



РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА ВИСІВУ

Недостатнє зволоження, тис. нас./га	180-220
Достатнє зволоження, тис. нас./га	220-260
На поливі, тис. нас./га	260-300



РЕКОМЕНДОВАНІ ЗОНИ ВИРОЩУВАННЯ

- Степ, Лісостеп

Насіння оброблене протруйником

ЕС АЛІЗЕ



СОРГО 

СЕРЕДНЬОРАННІЙ

Чемпіон по врожайності та продажам в Європі,
дуже добра стійкість до вилягання



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Напрямок використання: зернове
- Тип гібриду: простий
- Вміст крохмалю: 74%
- Еквівалент ФАО кукурудзи: 400-480
- Колір зерна: помаранчевий
- Сума температур (6°C)
 - від сівби до появи волоті: 950 °C
 - до вологості зерна 25%: 1880 °C
- Висота рослини: 120 см
- Довжина волоті: 28 см
- Форма волоті: напівщільна напівщільна
- Маса 1000 насінин: 33 г



ГОЛОВНІ ОСОБЛИВОСТІ

- Висока посухостійкість
- Відмінна толерантність до фузаріозу
- Дуже швидка вологовіддача
- Низькоросла рослина: полегшує збирання врожаю



РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА ВИСІВУ

Недостатнє зволоження, тис. нас./га	160-200
Достатнє зволоження, тис. нас./га	200-240
На поливі, тис. нас./га	240-280



АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	більша чутливість			більша стійкість	
	5	6	7	8	9
Енергія початкового розвитку					
Стійкість до вилягання					
Стійкість до посухи					
Стійкість до осипання					
Толерантність до фузаріозу					



РЕКОМЕНДОВАНІ ЗОНИ ВИРОЩУВАННЯ

- Степ, Лісостеп



Насіння оброблене протруйником

ЕС ФОЕН



СОРГО



СЕРЕДНЬОРАННІЙ

Високий потенціал врожайності — навіть в посушливих умовах!



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Напрямок використання: зернове
- Тип гібриду: простий
- Вміст білка: 9,2%
- Вміст крохмалю: 65,6%
- Еквівалент ФАО кукурудзи: 380-450
- Колір зерна: червоно-кремовий
- Сума температур (6°C)
 - від сівби до появи волоті: 920 °C
 - до вологості зерна 25%: 1860 °C
- Висота рослини: 125 см
- Довжина волоті: 28 см
- Форма волоті: напівщільна
- Маса 1000 насінин: 34 г



ГОЛОВНІ ОСОБЛИВОСТІ

- Високий потенціал урожайності
- Висока енергія початкового розвитку
- Висока посухостійкість
- Стійкий до фузаріозу та вилягання



РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА ВИСІВУ

Недостатнє зволоження, тис. нас./га	160-200
Достатнє зволоження, тис. нас./га	200-240
На поливі, тис. нас./га	240-280



АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	більша чутливість			більша стійкість		
	5	6	7	8	9	
Енергія початкового розвитку						
Стійкість до вилягання						
Стійкість до посухи						
Стійкість до осипання						
Толерантність до фузаріозу						



РЕКОМЕНДОВАНІ ЗОНИ ВИРОЩУВАННЯ

- Степ, Лісостеп



Насіння оброблене протруйником

ЕС АРМАТАН



СОРГО 

СЕРЕДНЬОПІЗНІЙ

Альтернатива для кукурудзи на силос
в посушливих умовах



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Напрям використання: **силосне**
- Тип гібриду: **простий**
- Еквівалент ФАО кукурудзи: **480-550**
- Колір зерна: **білий**
- Сума температур (6°C)
до вологості зерна 25%: **Вегетаційний період
115 днів або 1750°C до
30% сухої речовини**
- Висота рослини: **180 см**
- Форма волоті: **напівщільна**
- Перетравність: **60-65%**
- Розчинні цукри: **28,8%**



ГОЛОВНІ ОСОБЛИВОСТІ

- Більша врожайність силосної маси у порівнянні з кукурудзою при вирощуванні в посушливих умовах. Стійкий до вирощування у стресових умовах
- Висока врожайність силосної маси (17-20 т/га сухої речовини)
- Прекрасна перетравлюваність — 60-65%. Високий рівень розчинних цукрів (25-28%), які обумовлюють процес бродіння силосу та роблять його цінним та енергетичним для тварин
- Прекрасна стійкість до вилягання, ремонтантний



РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА ВИСІВУ

Недостатнє зволоження, тис. нас./га	180-220
Достатнє зволоження, тис. нас./га	220-260
На поливі, тис. нас./га	260-300



АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	більша чутливість			більша стійкість	
	5	6	7	8	9
Енергія початкового розвитку					
Стійкість до вилягання					
Стійкість до посухи					
Толерантність до фузаріозу					



РЕКОМЕНДОВАНІ ЗОНИ ВИРОЩУВАННЯ

- Степ, Лісостеп



Насіння оброблене
протруйником

ГІБРИДИ ОЗИМОГО РІПАКА ЄВРАЛІС СЕМЕНС Показники	ЕС ДАРКО	ЕС ГІДРОМЕЛЬ	ЕС АЛОНСО	ЕС ДАНУБ	ЕС НЕПТУН	ЕС МЕРКУРІЙ	ЕС ОДІС	Clearfield [®]
								ЕС АНГЕЛ
Стор.	59	60	61	62	63	64	65	66
Тип гібрида	пг	пг	пг	пг	пг	пг	пг	пг
Відновлення вегетації	пізнє	раннє	середнє	раннє-середньоранній	середньоранній	середньоранній	пізнє	середньоранній
Кількість днів до цвітіння	121	120	120	122	122	123	124	123
Період цвітіння	дуже довгий	довгий	середній	тривалий	тривалий	середній	середній	середній
Висота рослини, см	160	160	154-175	165	160	155	165	155
Гілкування	високе	дуже високе	дуже високе	високе	дуже високе	дуже високе	високе	дуже високе
Вміст жиру, %	50	46	48	47-48	45,5	47-48	48	47-48
Вміст глюकोзинолатів, мМоль	< 14	< 15	< 15	< 22	< 22	< 22	< 17	< 14
Вміст ерукової кислоти, %	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2
Енергія початкового розвитку	8	8	8	8	9	10	9	8
Зимостійкість	9	8	7	8	9	9	9	8
Стійкість до вилягання	7	8	8	7	7	10	7	8
Толерантність до циліндрспоріозу	7	9	8	8	8	8	7	8
Толерантність до склеротиніозу	7	7	8	9	8	9	9	8
Толерантність до фомозу	7	7	9	10	8	8	7	7
Рекомендована густина висіву, тис. насінин/га	500	500	500	500	500	430-450	500	550

*За умов дотримання технології і рівномірності розташування рослин в рядку.

ЕС ДАРКО



РІПАК 

РІПАК ОЗИМИЙ, РАННІЙ, 00

Ранній гібрид озимого ріпаку з доброю зимостійкістю, високим вмістом жиру



ХАРАКТЕРИСТИКИ

● Тип гібриду	простий
● Відновлення вегетації	пізні
● Кількість днів до цвітіння	121 днів
● Період цвітіння	дуже довгий
● Висота рослини	160
● Гілкування	високе
● Вміст жиру	50%
● Вміст глюкозинолатів	< 14 мМоль
● Вміст ерукової кислоти	< 0,2%



ГОЛОВНІ ОСОБЛИВОСТІ

- Висока маса тисячі насінин
- Толерантний до несприятливих умов перезимівлі
- Добра зимостійкість
- Стійкість до осипання насіння



РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА ВИСІВУ

- 500 тис. насінин/га



РЕКОМЕНДОВАНІ ЗОНИ ВИРОЩУВАННЯ

- Степ, Лісостеп



АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	більша чутливість			більша стійкість	
	5	6	7	8	9
Енергія початкового розвитку					
Зимостійкість					
Стійкість до вилягання					
- до циліндроспоріозу					
- до склеротиніозу					
- до фомозу					
- до осипання					

РІПАК

ЕС ГІДРОМЕЛЬ



РІПАК

РІПАК ОЗИМИЙ, РАННІЙ, 00

Ранній стабільний гібрид ріпаку з високою врожайністю



ХАРАКТЕРИСТИКИ

● Тип гібриду	простий
● Відновлення вегетації	раннє
● Кількість днів до цвітіння	120 днів
● Період цвітіння	довгий
● Висота рослини	160
● Гілкування	дуже високе
● Вміст жиру	46%
● Вміст глюкозинолатів	< 15 мМоль
● Вміст ерукової кислоти	< 0,2%



ГОЛОВНІ ОСОБЛИВОСТІ

- Відмінна реалізація генетичного потенціалу
- Високий вміст жиру
- Добра енергія початкового росту
- Стійкий до вилягання



РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА ВИСІВУ

- 500 тис. насінин/га



РЕКОМЕНДОВАНІ ЗОНИ ВИРОЩУВАННЯ

- Степ, Лісостеп



АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	більша чутливість			більша стійкість	
	5	6	7	8	9
Енергія початкового розвитку					
Зимостійкість					
Стійкість до вилягання					
- до ціліндроспоріозу					
- до склеротиніозу					
- до фомозу					
- до осипання					

ЕС АЛОНСО



РІПАК 

РІПАК ОЗИМИЙ, РАННІЙ, 00

Ранній гібрид із високою стійкістю до вилягання та подовженою толерантністю до хвороб



ХАРАКТЕРИСТИКИ

● Тип гібриду	простий
● Відновлення вегетації	середнє
● Кількість днів до цвітіння	120 днів
● Період цвітіння	середній
● Висота рослини	154-157 см
● Гілкування	дуже високе
● Вміст жиру	48%
● Вміст глюкозинолатів	< 15 мМоль
● Вміст ерукової кислоти	< 0,2%



ГОЛОВНІ ОСОБЛИВОСТІ

- Швидкий стартовий розвиток
- Стійкий до вилягання. Добра здатність до гілкування
- Швидке відновлення весняної вегетації
- Добра толерантність до хвороб (склеротинії, фомозу, циліндроспоріозу)



РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА ВИСІВУ

- 500 тис. насінин/га



РЕКОМЕНДОВАНІ ЗОНИ ВИРОЩУВАННЯ

- Степ, Лісостеп, Полісся



АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	більша чутливість			більша стійкість	
	5	6	7	8	9
Енергія початкового розвитку					
Зимостійкість					
Стійкість до вилягання					
- до циліндроспоріозу					
- до склеротиніозу					
- до фомозу					
- до осипання					

ЕС ДАНУБ



РІПАК



РІПАК ОЗИМИЙ, СЕРЕДНЬОРАННІЙ, 00

Висока врожайність та чудова толерантність до фомозу



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип гібриду **простий**
- Відновлення вегетації **від раннього до середнього**
- Кількість днів до цвітіння **122 дні**
- Період цвітіння **тривалий**
- Висота рослини **165 см**
- Гілкування **високе**
- Вміст жиру **47-48%**
- Вміст глюкозинолатів **< 22 мМоль**
- Вміст ерукової кислоти **< 0,2%**



ГОЛОВНІ ОСОБЛИВОСТІ

- Високий потенціал врожайності
- Швидкий стартовий ріст
- Хороша зимостійкість
- Дуже висока толерантність до фомозу



РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА ВИСІВУ

- 500 тис. насінин/га



РЕКОМЕНДОВАНІ ЗОНИ ВИРОЩУВАННЯ

- Степ, Лісостеп



АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	більша чутливість			більша стійкість			
	5	6	7	8	9	10	
Енергія початкового розвитку							
Зимостійкість							
Стойкість до вилягання							
- до циліндроспориозу							
- до склеротиніозу							
- до фомозу							
- до осипання							

ЕС НЕПТУН



РІПАК 

РІПАК ОЗИМИЙ, РАННІЙ, 00

Високий потенціал врожайності із прекрасною стійкістю до осипання та розтріскування стручка!



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип гібриду **простий**
- Відновлення вегетації **середньораннє**
- Кількість днів до цвітіння **122 дні**
- Період цвітіння **тривалий**
- Висота рослини **160 см**
- Гілкування **дуже високе**
- Вміст жиру **45,5%**
- Вміст глюкозинолатів **< 22 мМоль**
- Вміст ерукової кислоти **< 0,2%**



ГОЛОВНІ ОСОБЛИВОСТІ

- Високий потенціал врожайності
- Стійкий до осипання та розтріскування стручків
- Пластичний до строків сівби
- Толерантний до несприятливих умов перезимівлі



РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА ВИСІВУ

- 500 тис. насінин/га



РЕКОМЕНДОВАНІ ЗОНИ ВИРОЩУВАННЯ

- Степ, Лісостеп, Полісся



АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	більша чутливість			більша стійкість	
	5	6	7	8	9
Енергія початкового розвитку					
Зимостійкість					
Стійкість до вилягання					
- до циліндроспориозу					
- до склеротиніозу					
- до фомозу					
- до осипання					

ЕС МЕРКУРІЙ



РІПАК 

РІПАК ОЗИМИЙ, СЕРЕДНЬОПІЗНІЙ, 0

Високоврожайний, зимостійкий, дуже добре гілкування



ХАРАКТЕРИСТИКИ

● Тип гібриду	простий
● Відновлення вегетації	середньоранній
● Кількість днів до цвітіння	123 дні
● Період цвітіння	середній
● Висота рослини	155 см
● Гілкування	дуже високе
● Вміст жиру	47-48%
● Вміст глюкозинолатів	< 22 мМоль
● Вміст ерукової кислоти	< 0,2%



ГОЛОВНІ ОСОБЛИВОСТІ

- Висока врожайність. Стабільний
- Дуже добра здатність до гілкування та зимостійкість
- Дуже швидкий початковий розвиток
- Добра стійкість до вилягання



РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА ВИСІВУ

- 430-450 тис. насінин/га



РЕКОМЕНДОВАНІ ЗОНИ ВИРОЩУВАННЯ

- Степ, Лісостеп, Полісся



АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	більша чутливість			більша стійкість			
	5	6	7	8	9	10	
Енергія початкового розвитку							
Зимостійкість							
Стійкість до вилягання							
- до циліндроспоріозу							
- до склеротиніозу							
- до фомозу							
- до осипання							



РІПАК ОЗИМИЙ, СЕРЕДНЬОПІЗНІЙ, 0 Високоврожайний, зимостійкий гібрид із відмінною стійкістю до розтріскування стручків



ХАРАКТЕРИСТИКИ

● Тип гібриду	простий
● Відновлення вегетації	пізні
● Кількість днів до цвітіння	124 дні
● Період цвітіння	середній
● Висота рослини	165 см
● Гілкування	високе
● Вміст жиру	48%
● Вміст глюкозинолатів	< 17 мМоль
● Вміст ерукової кислоти	< 0,2%



ГОЛОВНІ ОСОБЛИВОСТІ

- Прекрасна стійкість до розтріскування стручків
- Висока зимостійкість
- Висока урожайність
- Добра толерантність до склеротиніозу



РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА ВИСІВУ

- 500 тис. насінин/га



РЕКОМЕНДОВАНІ ЗОНИ ВИРОЩУВАННЯ

- Степ, Лісостеп, Полісся



АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	більша чутливість			більша стійкість			
	5	6	7	8	9	10	
Енергія початкового розвитку							
Зимостійкість							
Стійкість до вилягання							
- до циліндроспоріозу							
- до склеротиніозу							
- до фомозу							
- до осипання							

ЕС АНГЕЛ



РІПАК



РІПАК ОЗИМИЙ, СЕРЕДНЬОСТИГЛИЙ, 00
Clearfield гібрид із високою
стійкістю до вилягання



Clearfield®

Production System for Oil Seed Rape



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип гібриду **простий**
- Відновлення вегетації **середньоранній**
- Кількість днів до цвітіння **123 дні**
- Період цвітіння **середній**
- Висота рослини **155 см**
- Гілкування **дуже високе**
- Вміст жиру **47-48%**
- Вміст глюкозинолатів **< 14 мМоль**
- Вміст ерукової кислоти **< 0,2%**



ГОЛОВНІ ОСОБЛИВОСТІ

- Високий потенціал урожайності
- Добра зимостійкість
- Стійкість до розтріскування
- Добра енергія початкового розвитку



РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА ВИСІВУ

- 550 тис. насінин/га



РЕКОМЕНДОВАНІ ЗОНИ ВИРОЩУВАННЯ

- Полісся, Лісостеп



АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	більша чутливість			більша стійкість	
	5	6	7	8	9
Енергія початкового розвитку					
Зимостійкість					
Стійкість до вилягання					
- до циліндропоріозу					
- до склеротиніозу					
- до фомозу					
- до осипання					

СІЧЕНЬ

пн	вт	ср	чт	пт	сб	нд
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

ЛЮТИЙ

пн	вт	ср	чт	пт	сб	нд
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28				

БЕРЕЗЕНЬ

пн	вт	ср	чт	пт	сб	нд
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

КВІТЕНЬ

пн	вт	ср	чт	пт	сб	нд
2	3	4	5	6	7	1/8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						

ТРАВЕНЬ

пн	вт	ср	чт	пт	сб	нд
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

ЧЕРВЕНЬ

пн	вт	ср	чт	пт	сб	нд
					1	2
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

ЛИПЕНЬ

пн	вт	ср	чт	пт	сб	нд
2	3	4	5	6	7	1/8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

СЕРПЕНЬ

пн	вт	ср	чт	пт	сб	нд
			1	2	3	4
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

ВЕРЕСЕНЬ

пн	вт	ср	чт	пт	сб	нд
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

ЖОВТЕНЬ

пн	вт	ср	чт	пт	сб	нд
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

ЛИСТОПАД

пн	вт	ср	чт	пт	сб	нд
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

ГРУДЕНЬ

пн	вт	ср	чт	пт	сб	нд
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24/31	25	26	27	28	29	30

ДОСЯГНІТЬ
НАЙВИЩОГО ВРОЖАЮ
З ЄВРАЛІС СЕМЕНС

2018

EURALIS

КОМЕРЦІЙНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ТОВ «ЄВРАЛІС СЕМЕНС УКРАЇНА»

ОЛЕКСІЙ МЕЛЬНИК

Керівник
комерційного відділу
тел. +38 067 325 10 96

ЮРІЙ МЕЛЬНИК

Керівник відділу по роботі
з ключовими клієнтами
тел. +38 067 469 14 00

ВОЛОДИМИР МОКРІЄНКО

Менеджер відділу по роботі
з ключовими клієнтами
тел. +38 067 214 79 95

ВІТАЛІЙ ГОЄНКО

Продукт-менеджер
по олійним
тел. +38 067 503 21 95

ВІТАЛІЙ СТРУМІНСЬКИЙ

Продукт-менеджер
по зерновим
тел. +38 067 407 10 72

РОМАН КОЛЕСНІЧЕНКО

Керівник
центрального регіону
Вінницька обл.
тел. +38 067 656 90 76

МИКОЛА КОТЛЯР

Київська та Житомирська обл.
тел. +38 067 447 69 20

ЯКІВ БУТЕНКО

Черкаська обл.
тел. +38 067 239 83 61

АНДРІЙ ПАРХОМЧУК

Кіровоградська обл.
тел. +38 067 232 27 97

ЮРІЙ САВА

Керівник західного регіону
Івано-Франківська, Львівська,
Тернопільська, Закарпатська
та Чернівецька обл.
тел. +38 067 509 95 25

ВОЛОДИМИР ОВЧАРУК

Рівненська, Волинська,
Хмельницька обл.
тел. +38 067 247 18 90

ЄВГЕН КРИВОШЕЯ

Керівник
північно-східного регіону
тел. +38 067 238 80 14

ВАСИЛЬ ПАСТУХ

Дніпропетровська обл.
тел. +38 067 006 49 30

ВАСИЛЬ ЛУК'ЯНЕНКО

Сумська обл.
тел. +38 067 656 90 23
+38 095 190 72 22

ЮРІЙ ОЛІЙНИК

Харківська обл.
тел. +38 067 656 90 37

ГЕННАДІЙ МИХАЙЛИК

Полтавська обл.
(південь, південний схід,
південний захід)
тел. +38 067 463 67 07

ЄВГЕН КЛИМЕНКО

Полтавська обл.
(північ, північний схід,
північний захід)
тел. +38 067 483 40 82

РОМАН ГОВЕНЬКО

Чернігівська обл.
тел. +38 067 483 40 81

СЕРГІЙ ТИЩЕНКО

Керівник
південно-східного регіону
тел. +38 067 470 67 87

МИКОЛА СКОКОВ

Луганська обл.
тел. +38 067 333 96 41

РУСЛАН АНАСТАСЕНКО

Миколаївська та
Херсонська обл.
тел. +38 067 470 79 89

ОЛЕГ ШЕВЧЕНКО

Одеська обл.
тел. +38 067 235 90 98

ОЛЕКСАНДР ХОНАХБЄЄВ

Донецька обл.
тел. +38 067 247 18 55

АРТЕМ КОРОВНІЧЕНКО

Запорізька обл.
тел. +38 067 249 25 06



ТОВ «ЄВРАЛІС СЕМЕНС УКРАЇНА»

03040, Київ, вул. Васильківська, 14, оф. 513

Тел.: +38 (044) 353-45-73

e-mail: kiev.seeds@euralis.com

euralis.ua

EURALIS
Creating seeds and trust