



ЕС РОЗАЛІЯ



ВИСОКИЙ УРОЖАЙ
В ІНТЕНСИВНИХ УМОВАХ

ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ

- Високий потенціал урожаю
- Добра толерантність до хвороб та нових рас НБР
- Низькорослий з підвищеною стійкістю до вилягання
- Інтенсивний тип

ГУСТОТА ПЕРЕД ЗБИРАННЯМ

Для зони недостатнього зволоження 50–55 тис. рослин/га

Для зони достатнього зволоження 60–65 тис. рослин/га

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Більша чутливість	Більша стійкість
Енергія початкового росту	6	
Посухостійкість	7	
Стійкість до вилягання	8	
ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО:		
- Фомопсису	7	
- Склеротиніозу кошика	8	
- Склеротиніозу стебла	8	
- Іржі	8	
- Вертицильозу	8	
- Несправжньої борошністої роси	9	
- Альтернаріозу	8	

ІДЕНТИФІКАЦІЯ

Група стиглості	Середньоранній
Тип	Інтенсивний
Висота рослини	160–165 см
Діаметр кошика	21–25 см
Нахил кошика	Напівнахилений
Олійність	48–49 %

ОРІЄНТОВНА КІЛЬКІСТЬ ДНІВ

Сходи – цвітіння	67–71
Сходи – збирання	104–110
Рекомендовані зони вирощування	Степ, Лісостеп, Полісся

РЕЗУЛЬТАТИ ВРОЖАЙНОСТІ В 2020 р., ц/га (в перерахунку на 7%)

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ	Менський район
КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ	Білоцерківський район
ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ	Вінницький район
ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ	Гадяцький район
СУМСЬКА ОБЛАСТЬ	Сумський район

