



Рекомендаційне повідомлення від технологічних експертів компанії «ЕРІДОН»

Позакореневе живлення яблуні під час та після диференціації плодових бруньок

В період диференціації плодової бруньки, а також після цього процесу, важливо провести декілька обробок із листовим підживленням. Велика кількість макро- та мікроелементів витрачається рослиною яблуні на формування вегетативної маси, плодових бруньок та врожаю. Головними елементами, яких потребує яблуня на період до збирання врожаю являються кальцій, калій та бор. Для компенсації потреби в живленні рекомендуємо використати препарати з лінійки **ROSASOL** і **ROSALIQ** бельгійської компанії **ROSIER S.A.** Доцільними до використання будуть препарати:

- **Розалік Ca, Mg, N** – рідкий препарат з оптимальною пропорцією Ca / Mg
- **Розасоль 8-17-41** – кристалічне добриво з нахилом на калійне живлення
- **Розалік B, Ca** – рідке кальцієве добриво, що не містить азоту

Особливо звертаємо увагу на те, що використовуючи препарат **Розалік B, Ca** в передзбиральний період на яблуні, відпадає потреба в підживленні бором після збирання врожаю.



Також, враховуючи погодні стреси, необхідно додати до найближчих обприскувань і антистресові препарати лінійки **Аміноквелант** та **Терра-Сорб**, з амінокислотами та мікроелементами широкого спектру. Ці препарати виробляються на заводі фармацевтичної компанії **Bioiberica** в Іспанії.

Особливо хочемо відмітити препарат **Аміноквелант Майнорс**, що окрім амінокислот містить в своєму складі додатково бор, мідь, залізо, магній, марганець, цинк та молібден. Внесення цих мікроелементів позитивно відображається як на візуальному стані дерев, так і на врожайності.

Підсумовуючи вищесказане та потребу яблуні, рекомендуємо **використати наступну схему підживлень**:

- Фаза диференціації плодової бруньки (ВВСН 75) – **Розалік Ca, Mg, N = 3 л/га + Аміноквелант Майнорс = 2 л/га**
- Фаза диференціації плодової бруньки (ВВСН 76) – **Розасоль 8-17-41 = 4 кг/га + Аміноквелант Майнорс = 2 л/га**
- Плід сформований на 70% (ВВСН 77) – **Розалік В, Са = 3 л/га + Терра-Сорб Фоліар = 1 л/га**
- Плід сформований на 80% (ВВСН 78) – **Розасоль 8-17-41 = 4 кг/га + Терра-Сорб Фоліар = 1 л/га**
- Початок достигання плодів (ВВСН 79) – **Розалік В, Са = 3 л/га + Терра-Сорб Фоліар = 1 л/га**

