



Рекомендаційне повідомлення від технологічних експертів компанії «ЕРІДОН»

Актуальні рекомендації в боротьбі з карликовою сажкою на озимій пшениці

В 2013 році в Західному і прилеглому до нього Центральному регіоні України, на посівах озимої пшениці відбувся значний прояв карликової сажки, що стало причиною значного зараження ґрунту, інфекційний фон якого активно зберігається більше 7 років.

Ознаки пошкодження карликовою сажкою – підвищене кущення, карликовість рослин, подібно до твердої сажки - наявний запах оселедцю.

Починаючи з 2013 року карликова сажка проявляється щороку, через не ефективну дію більшості протруйників на даний вид сажки.

Протравник **Дивідент Стар** відмінно контролює всі види сажок, в тому числі карликову сажку, з нормою витрати 1,8 – 2 л/т насіння (за рахунок діючої речовини дифеноконазолу ефективно «працює» і у весняний період зараження пшениці карликовою сажкою).

Крім того, протравник **Дивідент Стар** добре контролює гельмінтоспоріозну кореневу гниль та осінній прояв септоріозу, що особливо актуально для ранніх посівів озимої пшениці.

Схема застосування **Дивідент Стар** з інсектицидним протруйником з додатковою стимуляцією кореневої системи та сприянням підвищенню кущення:

**Дивідент Стар 1,8 л/т + Інітер 0,6 л/т + Блек Джек 1 л/т +
Розалік ZnPNS 1 л/т + Келпак 2 л/т**

