



Рекомендаційне повідомлення від технологічних експертів компанії «ЕРІДОН»

## Ранньовесняний захист посівів озимого ріпаку

Посіви **озимого ріпаку** в Україні в цілому перезимували добре. У зв'язку з інтенсивним наростанням добових та денних температур практично по всіх регіонах почалася активна вегетація цієї культури. І звичайно, з наростанням температур починають активізуватись шкідники. Особливо небезпечними для озимого ріпаку є **стеблові прихованохоботники**, які можуть знизити майбутній врожай культури на 50% і більше. **Деякі види прихованохоботників можуть з'явитися вже за температури +4...+6°C.**

Для ефективного контролю прихованохоботників необхідно вже зараз **використовувати жовті чашки-пастки** (при +5°C перша-друга декада березня) і відслідковувати на регулярній основі заселення посівів даним шкідником. На полі доцільно встановлювати по декілька чашок.

Від моменту заселення посівів прихованохоботниками у агрономів є **не більше 3-5 днів для боротьби з ним** – до початку відкладання яєць. **Важливо зробити обприскування до початку яйцекладки.** Саме цей період є найбільш доцільним та ефективним у боротьбі з прихованохоботниками. За умов холодної та довготривалої весни обприскати посіви повторно. Для захисту посівів ріпаку від даних шкідників рекомендуємо використовувати наступні продукти:

**Еванс – 0,2 л/га, Карате – 0,2 л/га, Кілітон – 0,6 л/га**

Також доцільно включати в цей обробіток **фунгіцидний захист** препаратами на основі діючої речовини карбендазім (**Голдазім, Голдер Супер 0,5 – 1,0 л/га**). Дана діюча речовина ефективна проти **тифульозу, білої гнилі, кореневої шийки** – «підсушує некрози на рослинах».

Вдалих Вам врожаїв!

Менеджер з розвитку МПП Фірма «Ерідон»  
ЧЕРНЕНКО Євген Петрович | (050)-373-95-24



**ЕРІДОН®**

СПІВПРАЦЯ, ЯКА ГАРАНТУЄ УСПІХ