



*Рекомендаційне повідомлення від
технологічних експертів компанії «ЕРІДОН»*

Шкідники та хвороби ріпаку

Після гарної перезимівлі, в більшості випадків, із збереженим листовим апаратом ріпаку та встановленням позитивних температур відбувається активне відновлення вегетації. Посіви ріпаку стають більш привабливими як для сільгоспвиробників, так і для шкідників та хвороб, які в свою чергу впливають на отримання стабільних та якісних врожаїв. Різке коливання температур, їх підвищення (+12...+20°C) прискорює одночасну та більш масову появу різноманітних шкідників.

Найбільшу загрозу посівам ріпаку серед шкідників несуть: прихованохоботники, ріпаковий квіткоїд, попелиці, оленка волохата, ріпаковий пильщик, хрестоцвітні блішки і т.д.

Першими шкідниками, що вже з'явилися чи будуть ще з'являтися за температури повітря +6 °C, в залежності від регіону, є **прихованохоботники**. При досягненні середньодобової температури 8-9 °C на посівах ріпаку з'являтимуться **хрестоцвітні блішки**. Також докучатиме посівам і **ріпаковий листоїд**, відродження личинок відбувається в **квітні-травні**. При подальшій вегетації початком настання періоду цвітіння в посівах почне з'являтися **ріпаковий квіткоїд**. Якщо вчасно не проводити заходів захисту від даного шкідника, то він може знищити врожай на 80-100%. Для захисту посівів від шкідників рекомендуємо застосовувати наступні препарати:

**Еванс, КЕ – 0,15-0,2 л/га;
Кіллітон, КЕ – 0,5-0,6 л/га;**

**Тамер, ВП – 0,1-1,2 кг/га;
Карате 050 ЕС – 0,1-0,15 л/га;**

Препарати на основі діючої речовини (**ацетаміпрід 200 г/кг**) – **0,1-0,12 кг/га**





Рекомендаційне повідомлення від технологічних експертів компанії «ЕРІДОН»

Серед хвороб найбільшої шкідливості посівам завдають такі хвороби як:

- альтернаріоз,
- фомоз,
- несправжня борошниста роса,
- сіра гниль
- борошниста роса
- склеротиніоз,
- циліндроспоров,
- вертицильозне
- фузаріозне в'янення.

Для обмеження розвитку збудників, вищезгаданих хвороб на Ваших посівах ріпаку, рекомендуємо застосовувати наступні препарати:

Азоципер Нео, КС – 0,75-1,0 л/га; Вето, КЕ – 0,5 л/га; Нодісер, ЕВ – 1,0 л/га
Букат, КС – 0,5 л/га; Кларк, ВГ – 0,25-0,4 кг/га;

За більш детальною інформацією щодо більш якісного використання вищезгаданих препаратів, враховуючи особливості Вашого регіону, наявність тих чи інших шкідників та хвороб, звертайтеся до регіональних експертів МПП Фірми «ЕРІДОН».

Вдалих Вам врожаїв!

