*Рекомендаційне повідомлення від технологічних експертів компанії «ЕРІДОН»*

## Зменшення фітотоксичності ґрунтових гербіцидів

У період першої та другої декади травня в Центральних, Північних (Київська, Черкаська, Житомирська обл.) та інших регіонах України випала велика кількість опадів, місцями двомісячна норма. **Опади були нерівномірні, подекуди з грозовими дощами, під час яких випадало за 15-20 хвилин 35-40 мм**. Така інтенсивність та кількість опадів **призвела до промивання діючих речовин ґрунтових гербіцидів на посівах соняшнику в кореневмісну зону культури**.

Для прикладу на площах, де були внесені гербіциди із діючою речовиною **тербутилазин** та **ацетохлор** відбулось промивання цих діючих речовин в нижній прикореневий шар ґрунту, що призвело до токсикації рослин соняшнику та підгоряння листової поверхні.

Частину площ довелось пересіяти, на яких рослини соняшнику перебували у фазі 2 справжніх листків. Рясні дощі прогнозують до кінця другої декади травня, **тому проблема промивання діючих речовин ґрунтових гербіцидів тільки починається**.

Оптимальним рішенням цієї проблеми є застосування на посівах **соняшника** антистресових препаратів на основі вільних амінокислот таких, як **Терра-Сорб Фоліар (норма витрати 1,5 - 2 л/га)** та **Терра-Сорб Комплекс (1 – 1,5 л/га)** відразу після виявлення симптомів токсикації рослин соняшника, а також це актуально для **кукурудзи**. Не виключена поява зазначених проблем на посівах **сої**, на яких також вносили ґрунтові гербіциди на основі вказаних діючих речовин, а також такої діючої речовини, як **метрибузин. Оптимальні схеми захисту:**

- **Блек Джек 0,5 л/га + Терра-Сорб Фоліар 1,5 л/га**
- **Блек Джек 0,5 л/га + Терра-Сорб комплекс 1 л/га**

Експерт з технологічної підтримки «ЕРІДОН»
ГРИГОРЕНКО Ярослав Вікторович | (095) 280-02-79

ЕРІДОН®
СПІВПРАЦЯ, ЯКА ГАРАНТУЄ УСПІХ