




НАСІННЯ ОЗИМИХ КУЛЬТУР

2019



№ сторінки	Культура	Оригіатор насіння	Сорт	Різновид	Веґетаційний період	Регіон вирощування
18	Озима пшениця		СН Комбін	остистий	ранньостиглий	Південь, Схід
24	Озима пшениця		Ванесса	безостий	ранньостиглий	
10	Озима пшениця		Балітус	безостий	ранньостиглий	
12	Озима пшениця		Паннонікус	остистий	ранньостиглий	
9	Озима пшениця		Тацитус	безостий	ранньостиглий	
8	Озима пшениця		Фіделіус	безостий	ранньостиглий	
21	Озима пшениця		Алтіго	остистий	ранньостиглий	
13	Озима пшениця		Аспект <i>new</i>	безостий	ранньостиглий	
15	Озима пшениця		Артіст	безостий	середньоранній	Центр, Захід, Північ
6	Озима пшениця		Практик	безостий	середньоранній	
1	Озима пшениця		Меморі	безостий	середньоранній	
11	Озима пшениця		Лукуллус	остистий	середньоранній	
22	Озима пшениця		Нордіка	безостий	середньоранній	
20	Озима пшениця		Мескаль <i>new</i>	безостий	середньоранній	
16	Озима пшениця		Патрас	безостий	середньостиглий	Центр, Захід, Північ
17	Озима пшениця		Самурай	безостий	середньостиглий	
5	Озима пшениця		Ребелл	безостий	середньостиглий	
23	Озима пшениця		Банкір	безостий	середньостиглий	
2	Озима пшениця		Десамо	безостий	середньостиглий	
3	Озима пшениця		Гордіан	безостий	середньостиглий	
7	Озима пшениця		СО 207 <i>new</i>	безостий	середньостиглий	Центр, Захід, Північ
14	Озима пшениця		Продуцент <i>new</i>	безостий	середньопізній	
19	Озима пшениця		Матрікс	безостий	середньопізній	
4	Озима пшениця		РЖТ Реформ <i>new</i>	безостий	середньопізній	
27	Озимий ячмінь		Карміна <i>new</i>	шестирядний	ранньостиглий	Південь, Схід
27	Озимий ячмінь		Хайлайт	шестирядний	середньостиглий	Південь, Схід, Центр, Північ

Середньоранній сорт з міцним стеблом середньої висоти з підвищеним коефіцієнтом кушення. Відрізняється високою стійкістю до основних хвороб, особливо до борошнистої роси, жовтої та бурої іржі, а також до хвороб стебла.

ПРОФІЛЬ СОРТУ

Група якості	цінна
Різновид	лютесценс (безостий)
Висота рослин	85 см
Маса 1 000 насінин	45-52 г
Період вегетації	середньоранній

ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ

1. Середньоранній високоврожайний сорт
2. Безостий, середньорослий
3. Гарна зимостійкість
4. Стійкий до основних хвороб

РЕКОМЕНДОВАНІ ЗОНИ ВИРОЩУВАННЯ

Лісостеп, Полісся

РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА ТА СТРОКИ ВИСІВУ

Ранні 3,2 млн. шт. насінин на 1 га
Оптимальні 4 млн. шт. насінин на 1 га
Пізні 4,5 млн. шт. насінин на 1 га

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ

Борошниста роса

8

Септоріоз

8

Кореневі гнилі

7

Фузаріоз

7

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Зимостійкість

8

Стійкість до осипання

8

Посухостійкість

8

Розвиток з осені

7

Стійкість до вилягання

8

Розвиток навесні

8

Стійкість до ламкості стебла

7

Інтенсивність кушення

8

Середньорослий сорт озимої пшениці з середніми термінами колосіння та дозрівання. Має високий потенціал врожайності, гарну якість зерна з високим вмістом протеїну. Десамо особливо підходить для інтенсивної технології вирощування з різними термінами сівби. Має хорошу стійкість до основних хвороб, зокрема, бурої іржі, жовтої іржі, борошнистої роси та септоріозу листя.

ПРОФІЛЬ СОРТУ

Група якості	цінна
Різновид	лютесценс (безостий)
Висота рослин	80-90 см
Маса 1 000 насінин	45 г
Період вегетації	середньостиглий

ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ

1. Середньостиглий короткостебловий, високоврожайний сорт
2. Безостий, з високою стійкістю до хвороб
3. Відмінна стійкість до вилягання та зимостійкість
4. Високий вміст білку

РЕКОМЕНДОВАНІ ЗОНИ ВИРОЩУВАННЯ

Лісостеп, Полісся

РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА ТА СТРОКИ ВИСІВУ

Ранні 4,5 млн. шт. насінин на 1 га
Оптимальні 5 млн. шт. насінин на 1 га
Пізні 5,5 млн. шт. насінин на 1 га

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ

Борошниста роса



Септоріоз



Кореневі гнілі



Фузаріоз



АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Зимостійкість



Стійкість до осипання



Посуhostійкість



Розвиток з осені



Стійкість до вилягання



Розвиток навесні



Стійкість до ламкості стебла



Інтенсивність кущення



Середньостиглий низькорослий сорт компенсаційного типу, з дуже високим потенціалом врожайності та відмінною зимостійкістю.

ПРОФІЛЬ СОРТУ

Група якості	цінна
Різновид	лютесценс (безостий)
Висота рослин	80-90 см
Маса 1 000 насінин	48 г
Період вегетації	середньостиглий

ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ

1. Середньостиглий короткостебловий, з високим потенціалом врожайності
2. Безостий, стійкий до комплексу хвороб
3. Висока зимостійкість
4. Відмінна якість зерна

РЕКОМЕНДОВАНІ ЗОНИ ВИРОЩУВАННЯ

Лісостеп, Полісся

РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА ТА СТРОКИ ВИСІВУ

Ранні 4,5 млн. шт. насінин на 1 га
Оптимальні 5 млн. шт. насінин на 1 га
Пізні 5,5 млн. шт. насінин на 1 га

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ

Борошниста роса



Септоріоз



Кореневі гнілі



Фузаріоз



АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Зимостійкість



Стійкість до осипання



Посухостійкість



Розвиток з осені



Стійкість до вилягання



Розвиток навесні



Стійкість до ламкості стебла



Інтенсивність кущення



РЖТ РЕФОРМ ^{NEW}

ОЗИМА ПШЕНИЦЯ



Середньопізній, середньорослий сорт озимої пшениці з найвищим потенціалом врожайності з відмінною стійкістю до вилягання та високою зимостійкістю. Сорт має підвищену стійкість до основних хвороб зернових, таких як бура та жовта іржа, борошниста роса, септоріоз та фузаріоз. Всі ці переваги роблять РЖТ Реформ одним з найпоширеніших сортів в Європі.

ПРОФІЛЬ СОРТУ

Група якості	цінна
Різновид	лютесценс (безостий)
Висота рослин	70-75 см
Маса 1 000 насінин	53 г
Період вегетації	середньопізній

ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ

1. Найвищий потенціал урожайності
2. Ефективне поєднання зимостійкості та вилягання
3. Висока толерантність до листових та колосових хвороб
4. Стабільно висока якість зерна класу А

РЕКОМЕНДОВАНІ ЗОНИ ВИРОЩУВАННЯ

Лісостеп, Полісся

РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА ТА СТРОКИ ВИСІВУ

Ранні 3-3,5 млн. шт. насінин на 1 га
Оптимальні 3,5-3,8 млн. шт. насінин на 1 га
Пізні 3,8-4,2 млн. шт. насінин на 1 га

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ

Борошниста роса

8

Септоріоз

8

Кореневі гнилі

8

Фузаріоз

8

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Зимостійкість

9

Стійкість до осипання

9

Посухостійкість

7

Розвиток з осені

9

Стійкість до вилягання

8

Розвиток на весні

9

Стійкість до ламкості стебла

9

Інтенсивність кушення

8

Середньоранній низькорослий сорт з високим потенціалом врожайності. Стійкий до основних хвороб та має гарну зимостійкість.

ПРОФІЛЬ СОРТУ

Група якості	цінна
Різновид	лютесценс (безостий)
Висота рослин	85 см
Маса 1 000 насінин	45 г
Період вегетації	середньоранній

ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ

1. Середньоранній високоврожайний сорт
2. Низькорослий, безостий з міцним стеблом
3. Гарна посухостійкість та зимостійкість

РЕКОМЕНДОВАНІ ЗОНИ ВИРОЩУВАННЯ

Лісостеп, Полісся

РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА ТА СТРОКИ ВИСІВУ

Ранні 4,5 млн. шт. насінин на 1 га
Оптимальні 5 млн. шт. насінин на 1 га
Пізні 5,5 млн. шт. насінин на 1 га

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ

Борошниста роса



Септоріоз



Кореневі гнилі



Фузаріоз




АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Зимостійкість



Стійкість до осипання



Посухостійкість



Розвиток з осені



Стійкість до вилягання



Розвиток навесні



Стійкість до ламкості стебла



Інтенсивність кущення



Середньоранній сорт який поєднує високий потенціал врожайності та відмінну якість зерна. Невибагливий до строків посіву.

ПРОФІЛЬ СОРТУ

Група якості	цінна
Різновид	лютесценс (безостий)
Висота рослин	88 см
Маса 1 000 насінин	42 г
Період вегетації	середньоранній

ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ

1. Середньоранній високоврожайний сорт
2. Толерантний до строків посіву
3. Висока зимостійкість

РЕКОМЕНДОВАНІ ЗОНИ ВИРОЩУВАННЯ

Лісостеп, Полісся

РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА ТА СТРОКИ ВИСІВУ

Ранні 4,5 млн. шт. насінин на 1 га
Оптимальні 5 млн. шт. насінин на 1 га
Пізні 5,5 млн. шт. насінин на 1 га

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ

Борошниста роса

8

Септоріоз

7

Кореневі гнилі

7

Фузаріоз

8

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Зимостійкість

8

Стійкість до осипання

8

Посуhostійкість

8

Розвиток з осені

7

Стійкість до вилягання

8

Розвиток навесні

8

Стійкість до ламкості стебла

7

Інтенсивність кущення

8

Відомий своєю продуктивністю, сорт озимої пшениці французької селекції. Належить до низькорослої групи, середньостиглий, з раннім наливом колоса. CO 207 формує зерно з високою натурою та виходом борошна зі стабільним числом падіння. Стійкість до вилягання у низькорослих рослин, дозволяє витримувати підсилене азотне навантаження, а висока стійкість до враження хворобами та невимогливість до місця в сівозміні не позначаються негативно на врожайності.

ПРОФІЛЬ СОРТУ

Група якості	цінна
Різновид	лютесценс (безостий)
Висота рослин	83 см
Маса 1 000 насінин	43-45 г
Період вегетації	середньостиглий

ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ

1. Відмінні хлібопекарські якості
2. Низькоросла, стійка до вилягання
3. Середньостигла з ранніми термінами дозрівання
4. Придатна до вирощування у всіх природно-кліматичних зонах України

РЕКОМЕНДОВАНІ ЗОНИ ВИРОЩУВАННЯ

Лісостеп, Полісся

РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА ТА СТРОКИ ВИСІВУ

Ранні 4,5 млн. шт. насінин на 1 га

Оптимальні 5 млн. шт. насінин на 1 га

Пізні 5 млн. шт. насінин на 1 га

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ

Борошниста роса

8

Септоріоз

7

Кореневі гнілі

6

Фузаріоз

6

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Зимостійкість

8

Стійкість до осипання

8

Посухостійкість

8

Розвиток з осені

8

Стійкість до вилягання

6

Розвиток навесні

7

Стійкість до ламкості стебла

7

Інтенсивність кущення

8

ФІДЕЛІУС

ОЗИМА ПШЕНИЦЯ



Ранньостиглий сорт, який відноситься до високоврожайних сортів з гарною якістю зерна. Фіделіус має генетично підвищену стійкість до борошнистої роси та вилягання. Високоврожайний, низькорослий, безостий, стабільний. Має хорошу зимостійкість і велику масу 1000 насінин.

ПРОФІЛЬ СОРТУ

Група якості	цінна
Різновид	лютесценс (безостий)
Висота рослин	80 см
Маса 1 000 насінин	45-50 г
Період вегетації	ранньостиглий

ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ

1. Ранньостиглий високоврожайний сорт
2. Щільноколосий тип з доброю зимостійкістю
3. Висока стійкість до борошнистої роси та вилягання
4. Висока маса 1000 насінин

РЕКОМЕНДОВАНІ ЗОНИ ВИРОЩУВАННЯ

Степ, Лісостеп, Полісся

РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА ТА СТРОКИ ВИСІВУ

Ранні 3,5 млн. шт. насінин на 1 га
Оптимальні 4 млн. шт. насінин на 1 га
Пізні 4,5 млн. шт. насінин на 1 га

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ

Борошниста роса

8

Септоріоз

7

Кореневі гнілі

7

Фузаріоз

8

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Зимостійкість

8

Стійкість до осипання

8

Посухостійкість

8

Розвиток з осені

7

Стійкість до вилягання

8

Розвиток навесні

8

Стійкість до ламкості стебла

8

Інтенсивність кущення

8

Ранньостиглий сорт, який поєднує в собі високу продуктивність та стійкість до вилягання, має високий коефіцієнт кушення та гарні хлібопекарські якості. При інтенсивних технологіях Тацитус формує високі врожаї зерна. Дуже хороша стійкість до вилягання в несприятливі роки вирощування.

ПРОФІЛЬ СОРТУ

Група якості	цінна
Різновид	лютесценс (безостий)
Висота рослин	80 см
Маса 1 000 насінин	45-50 г
Період вегетації	ранньостиглий

ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ

1. Ранньостиглий сорт продовольчого напрямку (BQG 4 - 5)
2. Відмінна зимостійкість та стабільність
3. Високий потенціал врожайності, гарна якість зерна
4. Досить низькорослий, стійкий до вилягання

РЕКОМЕНДОВАНІ ЗОНИ ВИРОЩУВАННЯ

Лісостеп, Полісся

РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА ТА СТРОКИ ВИСІВУ

Ранні 3,5 млн. шт. насінин на 1 га

Оптимальні 4 млн. шт. насінин на 1 га

Пізні 4,5 млн. шт. насінин на 1 га

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ

Борошниста роса

8

Септоріоз

7

Кореневі гнилі

8

Фузаріоз

8

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Зимостійкість

9

Стійкість до осипання

8

Посухостійкість

8

Розвиток з осені

8

Стійкість до вилягання

8

Розвиток навесні

8

Стійкість до ламкості стебла

8

Інтенсивність кушення

8

Ранній, низькорослий, високоінтенсивний сорт з максимальною віддачею для Півдня та Сходу України. БАЛІТУС має стійкість до основних хвороб листя та колосу, добре переносить посушливі умови та має відмінну зимостійкість.

ПРОФІЛЬ СОРТУ

Група якості	цінна
Різновид	лютеценс (безостий)
Висота рослин	80-90 см
Маса 1 000 насінин	48 г
Період вегетації	ранньостиглий

ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ

1. Ранньостиглий високоінтенсивний сорт
2. Безостий, щільноколосого типу
3. Відмінна зимостійкість, посухостійкий
4. Відмінна стійкість до основних хвороб

РЕКОМЕНДОВАНІ ЗОНИ ВИРОЩУВАННЯ

Степ, Лісостеп, Полісся

РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА ТА СТРОКИ ВИСІВУ

Ранні 4,5 млн. шт. насінин на 1 га
Оптимальні 5 млн. шт. насінин на 1 га
Пізні 5,5 млн. шт. насінин на 1 га

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ

Борошниста роса



Септоріоз



Кореневі гнилі



Фузаріоз



АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Зимостійкість



Стійкість до осипання



Псухостійкість



Розвиток з осені



Стійкість до вилягання



Розвиток навесні



Стійкість до ламкості стебла



Інтенсивність кушення



Середньоранній сорт, гарно збалансований по врожайності та якості зерна. ЛУКУЛЛУС стійкий до основних хвороб листя та колосу та має добру зимостійкість.

ПРОФІЛЬ СОРТУ

Група якості	цінна
Різновид	еритросперум (остистий)
Висота рослин	95 см
Маса 1 000 насінин	48 г
Період вегетації	середньоранній

ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ

1. Середньоранній, високоврожайний сорт
2. Остистий з високою посухостійкістю
3. Добра зимостійкість

РЕКОМЕНДОВАНІ ЗОНИ ВИРОЩУВАННЯ

Полісся, Лісостеп

РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА ТА СТРОКИ ВИСІВУ

Ранні 3,5 млн. шт. насінин на 1 га
Оптимальні 4,1 млн. шт. насінин на 1 га
Пізні 4,5 млн. шт. насінин на 1 га

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ

Борошниста роса

8

Септоріоз

7

Кореневі гнилі

7

Фузаріоз

8

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Зимостійкість

8

Стійкість до осипання

8

Посухостійкість

8

Розвиток з осені

7

Стійкість до вилягання

8

Розвиток навесні

8

Стійкість до ламкості стебла

7

Інтенсивність кущення

8

ПАННОНІКУС

ОЗИМА ПШЕНИЦЯ



ПАННОНІКУС остистий, ранньостиглий, інтенсивний сорт для Центральної та Південно-Східної частини України. ПАННОНІКУС маючи велику масу 1000 насінин та генетично підвищену кількість зерен в колосі - показує стабільно високу врожайність. Стійкість до хвороб та вилягання робить цей сорт найкращим вибором для аграрія.

ПРОФІЛЬ СОРТУ

Група якості	цінна
Різновид	еритросперум (остистий)
Висота рослин	90 см
Маса 1 000 насінин	50 г
Період вегетації	ранньостиглий

ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ

1. Ранньостиглий остистий сорт з високою якістю зерна
2. Високий потенціал врожайності
3. Висока стабільність та маса 1000 насінин
4. Стійкий до вилягання та основних хвороб листя

РЕКОМЕНДОВАНІ ЗОНИ ВИРОЩУВАННЯ

Степ, Лісостеп, Полісся

РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА ТА СТРОКИ ВИСІВУ

Ранні 3,2 млн. шт. насінин на 1 га

Оптимальні 4 млн. шт. насінин на 1 га

Пізні 4,7 млн. шт. насінин на 1 га

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ

Борошниста роса

7

Септоріоз

6

Кореневі гнилі

7

Фузаріоз

6

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Зимостійкість

8

Стійкість до осипання

8

Посухостійкість

8

Розвиток з осені

8

Стійкість до вилягання

8

Розвиток навесні

8

Стійкість до ламкості стебла

8

Інтенсивність кущення

7

Високопродуктивний сорт німецької селекції. Ранній налив, і як наслідок швидке дозрівання в поєднанні з високими показниками посухо-та зимостійкості, забезпечує фермера від значних ризиків високих температур в період формування колоса, що останніми роками часто зустрічається по всій території України.

ПРОФІЛЬ СОРТУ

Група якості	цінна
Різновид	лютесценс (безостий)
Висота рослин	80 см
Маса 1 000 насінин	48 г
Період вегетації	ранньостиглий

ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ

1. Стабільна урожайність у офіційних сортовипробуваннях
2. Ранньостиглий сорт з хорошими хлібопекарськими якостями
3. Характеризується гарною зимостійкістю та стійкістю до основних хвороб
4. Придатна до вирощування після бобових, олійного ріпаку, кукурудзи та цукрових буряків

РЕКОМЕНДОВАНІ ЗОНИ ВИРОЩУВАННЯ

Степ, Лісостеп, Полісся

РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА ТА СТРОКИ ВИСІВУ

Ранні 4,5 млн. шт. насінин на 1 га

Оптимальні 5 млн. шт. насінин на 1 га

Пізні 5,5 млн. шт. насінин на 1 га

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ

Борошниста роса

8

Септоріоз

7

Кореневі гнілі

6

Фузаріоз

7

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Зимостійкість

8

Стійкість до осипання

8

Посуhostійкість

8

Розвиток з осені

7

Стійкість до вилягання

6

Розвиток навесні

8

Стійкість до ламкості стебла

7

Інтенсивність кущення

6

Середньопізній сорт озимої пшениці, рекомендований для Західних та Центрально-Західних регіонів. Має відмінні агрономічні характеристики, стійкість до основних хвороб з відмінною гнучкістю у термінах посіву. Сорт витримує високу густоту стояння за рахунок відмінної компенсаторної та регенераційної здатності. Високий потенціал врожайності, зимостійкість у комбінації з дуже доброю стійкістю до вилягання та стабільним числом падіння, роблять Продуцент найбільш очікуваним сортом.

ПРОФІЛЬ СОРТУ

Група якості	цінна
Різновид	лютесценс (безостий)
Висота рослин	79 см
Маса 1 000 насінин	49 г
Період вегетації	середньопізній

ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ

1. Сорт компенсаційного типу з дуже високою врожайністю
2. Гарна зимостійкість та стійкість до вилягання
3. Відмінна стійкість до хвороб листового апарату
4. Гнучкість у термінах посіву

РЕКОМЕНДОВАНІ ЗОНИ ВИРОЩУВАННЯ

Лісостеп, Полісся

РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА ТА СТРОКИ ВИСІВУ

Ранні 3,5 млн. шт. насінин на 1 га

Оптимальні 4 млн. шт. насінин на 1 га

Пізні 4,5 млн. шт. насінин на 1 га

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ

Борошниста роса

8

Септоріоз

8

Кореневі гнилі

6

Фузаріоз

8

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Зимостійкість

9

Стійкість до осипання

8

Посуhostійкість

8

Розвиток з осені

8

Стійкість до вилягання

8

Розвиток навесні

7

Стійкість до ламкості стебла

8

Інтенсивність кушення

8

Середньоранній сорт з високим потенціалом врожайності. Стійкий до основних хвороб із гарною зимостійкістю.

ПРОФІЛЬ СОРТУ

Група якості	цінна
Різновид	лютесценс (безостий)
Висота рослин	90 см
Маса 1 000 насінин	48 г
Період вегетації	середньоранній

ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ

1. Середньоранній високоврожайний сорт
2. Безостий з міцним стеблом стійким до вилягання
3. Гарна зимостійкість

РЕКОМЕНДОВАНІ ЗОНИ ВИРОЩУВАННЯ

Степ, Лісостеп

РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА ТА СТРОКИ ВИСІВУ

Ранні 4,5 млн. шт. насінин на 1 га
Оптимальні 5 млн. шт. насінин на 1 га
Пізні 5,5 млн. шт. насінин на 1 га

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ

Борошниста роса

8

Септоріоз

8

Кореневі гнілі

7

Фузаріоз

7

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Зимостійкість

8

Стійкість до осипання

8

Посухостійкість

8

Розвиток з осені

7

Стійкість до вилягання

8

Розвиток навесні

8

Стійкість до ламкості стебла

7

Інтенсивність кущення

8

ПАТРАС – середньостиглий, безостий з підвищеною зимостійкістю сорт, придатний для раннього посіву. Сорт компенсаційного типу із раннім стартом навесні. Колосовий тип сорту реалізує врожайність за рахунок високої озерненості колоса та маси тисячі насінин. Селекційна робота спрямована на прискорений налив зерна, що впливає на стабільність сорту в умовах високих температур під час наливу.

ПРОФІЛЬ СОРТУ

Група якості	цінна
Різновид	лютесценс (безостий)
Висота рослин	90 см
Маса 1 000 насінин	49 г
Період вегетації	середньостиглий

ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ

1. Добра зимостійкість
2. Стабільний за рівнем урожайності
3. Екологічно пластичний
4. Генетично підвищена стійкість до фузаріозу колоса та борошнистої роси

РЕКОМЕНДОВАНІ ЗОНИ ВИРОЩУВАННЯ

Лісостеп, Полісся

РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА ТА СТРОКИ ВИСІВУ

Ранні 3 млн. шт. насінин на 1 га
Оптимальні 4 млн. шт. насінин на 1 га
Пізні 4,5 млн. шт. насінин на 1 га

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ

Борошниста роса

8

Септоріоз

7

Кореневі гнилі

8

Фузаріоз

7

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Зимостійкість

8

Стійкість до осипання

9

Посухостійкість

7

Розвиток з осені

6

Стійкість до вилягання

6

Розвиток навесні

8

Стійкість до ламкості стебла

7

Інтенсивність кущення

6

САМУРАЙ один із перших сортів DSV в Україні, який подолав позначку 10 тон з гектара в товарному посіві. Сорт колосового типу середньої висоти з високою озерненістю колоса і масою тисячі насінин. Завдяки стійкості до вилягання, САМУРАЙ «пробачить» невчасне внесення регулятора росту та порадує агронома високим врожаєм та безпроблемним обмолотом.

ПРОФІЛЬ СОРТУ

Група якості	філер
Різновид	лютеценс (безостий)
Висота рослин	80 см
Маса 1 000 насінин	50 г
Період вегетації	середньостиглий

ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ

1. Добра зимостійкість
2. Стійкий до вилягання
3. Стабільний за рівнем урожайності
4. Екологічно пластичний

РЕКОМЕНДОВАНІ ЗОНИ ВИРОЩУВАННЯ

Лісостеп, Полісся

РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА ТА СТРОКИ ВИСІВУ

Ранні 3 млн. шт. насінин на 1 га

Оптимальні 4 млн. шт. насінин на 1 га

Пізні 4,5 млн. шт. насінин на 1 га

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ

Борошниста роса

6

Септоріоз

6

Кореневі гнілі

8

Фузаріоз

6

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Зимостійкість

7

Стійкість до осипання

9

Посухостійкість

7

Розвиток з осені

7

Стійкість до вилягання

8

Розвиток навесні

7

Стійкість до ламкості стебла

8

Інтенсивність кущення

7

Перший ранній інтенсивний сорт DSV створений для південних регіонів України. СН КОМБІН – пшениця короткого дня, фотоперіодично нечутлива і добре відростає в умовах короткого дня пізньої осені, а також рано навесні. Добре переносить посушливі умови та не втрачає врожайність під час наливу. Пізній посів та посів по соняшнику – це саме ті умови, під які створювався даний сорт.

ПРОФІЛЬ СОРТУ

Група якості	цінна
Різновид	еритросперум (остистий)
Висота рослин	85 см
Маса 1 000 насінин	48 г
Період вегетації	середньоранній

ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ

1. Висока зимостійкість
2. Добра посухостійкість
3. Стійкий до вилягання та комплексу хвороб
4. Підвищений коефіцієнт кущення

РЕКОМЕНДОВАНІ ЗОНИ ВИРОЩУВАННЯ

Степ, Лісостеп, Полісся

РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА ТА СТРОКИ ВИСІВУ

Ранні 3 млн. шт. насінин на 1 га

Оптимальні 4 млн. шт. насінин на 1 га

Пізні 4,5 млн. шт. насінин на 1 га

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ

Борошниста роса

6

Септоріоз

5

Кореневі гнилі

6

Фузаріоз

6

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Зимостійкість

7

Стійкість до осипання

8

Посухостійкість

8

Розвиток з осені

7

Стійкість до вилягання

8

Розвиток навесні

7

Стійкість до ламкості стебла

8

Інтенсивність кущення

7

МАТРИКС сорт компенсаційного типу з дуже потужним кущенням навесні. Створює добре затінення, запобігаючи непродуктивним випаровуванням вологи. Завдяки середньопізньому дозріванню та добрій жаростійкості МАТРИКС не припиняє вегетацію під час липневої спеки та повністю реалізує свій потенціал.

ПРОФІЛЬ СОРТУ

Група якості	цінна
Різновид	лютесценс (безостий)
Висота рослин	80 см
Маса 1 000 насінин	49 г
Період вегетації	середньопізній

ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ

1. Високоврожайний
2. Пластичний
3. Стійкий до фузаріозу колоса, кореневих гнилей
4. Генетична стійкість проти ламкості стебла

РЕКОМЕНДОВАНІ ЗОНИ ВИРОЩУВАННЯ

Полісся

РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА ТА СТРОКИ ВИСІВУ

Ранні 3 млн. шт. насінин на 1 га

Оптимальні 4 млн. шт. насінин на 1 га

Пізні 4,5 млн. шт. насінин на 1 га

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ

Борошниста роса

7

Септоріоз

7

Кореневі гнілі

8

Фузаріоз

7

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Зимостійкість

8

Стійкість до осипання

9

Посухостійкість

8

Розвиток з осені

6

Стійкість до вилягання

7

Розвиток навесні

6

Стійкість до ламкості стебла

7

Інтенсивність кущення

8



Новий середньоранній високоврожайний сорт озимої пшениці розрахований під інтенсивну технологію. Характеризується придатністю для пізніх термінів посіву, високою зимостійкістю та посухостійкістю. Має добре озернений колос та високу масу 1000.

ПРОФІЛЬ СОРТУ

Група якості	цінна
Різновид	лютесценс (безостий)
Висота рослин	75 см
Маса 1 000 насінин	50 г
Період вегетації	середньоранній

ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ

1. Високі показники врожайності
2. Висока зимостійкість
3. Придатний для пізніх термінів посіву
4. Висока стійкість до основних хвороб.

РЕКОМЕНДОВАНІ ЗОНИ ВИРОЩУВАННЯ

Лісостеп, Полісся

РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА ТА СТРОКИ ВИСІВУ

Ранні 3,5 млн. шт. насінин на 1 га

Оптимальні 4,2 млн. шт. насінин на 1 га

Пізні 5 млн. шт. насінин на 1 га

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ

Борошниста роса

8

Септоріоз

6

Кореневі гнилі

8

Фузаріоз

7

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Зимостійкість

8

Стійкість до осипання

8

Посухостійкість

8

Розвиток з осені

8

Стійкість до вилягання

6

Розвиток навесні

8

Стійкість до ламкості стебла

8

Інтенсивність кущення

8



АЛТИГО ранньостиглий, посухостійкий, остистий сорт для Південної та Східної частини України який має генетичну стійкість до основних хвороб та підвищену адаптивність до несприятливих погодних умов при вирощуванні. АЛТИГО має коротке стебло та підвищену стійкість до вилягання.

ПРОФІЛЬ СОРТУ

Група якості	цінна
Різновид	еритросперум (остистий)
Висота рослин	85 см
Маса 1 000 насінин	48 г
Період вегетації	ранньостиглий

ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ

1. Ранньостиглий, остистий, низькорослий, високоврожайний сорт
2. Посухостійкий
3. Відмінна стійкість до вилягання та зимостійкість

РЕКОМЕНДОВАНІ ЗОНИ ВИРОЩУВАННЯ

Степ, Лісостеп, Полісся

РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА ТА СТРОКИ ВИСІВУ

Ранні 4,5 млн. шт. насінин на 1 га

Оптимальні 5 млн. шт. насінин на 1 га

Пізні 5,5 млн. шт. насінин на 1 га

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ

Борошниста роса

8

Септоріоз

8

Кореневі гнілі

7

Фузаріоз

7

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Зимостійкість

8

Стійкість до осипання

8

Посухостійкість

8

Розвиток з осені

7

Стійкість до вилягання

8

Розвиток навесні

8

Стійкість до ламкості стебла

7

Інтенсивність кущення

8

НОРДІКА

ОЗИМА ПШЕНИЦЯ



Середньоранній, безостий сорт озимої пшениці з дуже високою врожайністю, зимостійкістю та посухостійкістю. Рослина міцна, стебло стійке до вилягання та осипання зерна. Головними перевагами сорту є також висока стійкість до ураження фузаріозом колоса, борою листковою іржею та борошнистою росою.

ПРОФІЛЬ СОРТУ

Група якості	цінна
Різновид	лютесценс (безостий)
Висота рослин	93 см
Маса 1 000 насінин	52 г
Період вегетації	середньоранній

ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ

1. Високоврожайний
2. Стійкий до мінусових температур
3. Підходить до вирощування в зонах недостатнього зволоження
4. Висока стійкість до фузаріозу колосу, борошнистої роси колосу і листя, септоріозу колосу

РЕКОМЕНДОВАНІ ЗОНИ ВИРОЩУВАННЯ

Лісостеп, Полісся

РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА ТА СТРОКИ ВИСІВУ

Ранні 3,5 млн. шт. насінин на 1 га

Оптимальні 4 млн. шт. насінин на 1 га

Пізні 5 млн. шт. насінин на 1 га

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ

Борошниста роса

7

Септоріоз

7

Кореневі гнилі

8

Фузаріоз

8

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Зимостійкість

8

Стійкість до осипання

8

Посухостійкість

5

Розвиток з осені

7

Стійкість до вилягання

7

Розвиток навесні

8

Стійкість до ламкості стебла

7

Інтенсивність кущення

7



Банкір створювався з огляду на можливість отримувати високу врожайність за несприятливих погодних умов та наявності стресових чинників. І селекціонерам «Байера» це вдалося. За потенційної врожайності близько 11 т/га Банкір має високу зимостійкість (стійкий до різких перепадів зимових температур) та морозовитривалість. Має добру стійкість до основних хвороб, у т. ч. фузаріозу стебла та колоса. Сорт має високі показники щодо вмісту клейковини і протеїнів та належить до цінних пшениць з високими хлібопекарськими властивостями.

ПРОФІЛЬ СОРТУ

Група якості	цінна
Різновид	лютесценс (безостий)
Висота рослин	90 см
Маса 1 000 насінин	50 г
Період вегетації	середньостиглий

ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ

1. Високоврожайний
2. Висока стійкість до вилягання
3. Добра зимостійкість
4. Відмінні хлібопекарські властивості

РЕКОМЕНДОВАНІ ЗОНИ ВИРОЩУВАННЯ

Лісостеп

РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА ТА СТРОКИ ВИСІВУ

Ранні 3,5млн. шт. насінин на 1 га
Оптимальні 4,2 млн. шт. насінин на 1 га
Пізні 4,7 млн. шт. насінин на 1 га

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ

Борошниста роса

7

Септоріоз

6

Кореневі гнилі

6

Фузаріоз

6

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Зимостійкість

7

Стійкість до осипання

8

Посухостійкість

7

Розвиток з осені

8

Стійкість до вилягання

7

Розвиток навесні

8

Стійкість до ламкості стебла

7

Інтенсивність кущення

8

Ранньостиглий короткостебловий сорт, характеризується високим рівнем врожаю, має дуже високу стійкість до вилягання та підвищену морозостійкість, гарно переносить пізні строки посіву, маючи високі початкові темпи росту.

ПРОФІЛЬ СОРТУ

Група якості	цінна
Різновид	лютесценс (безостий)
Висота рослин	85 см
Маса 1 000 насінин	45 г
Період вегетації	ранньостиглий

ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ

1. Ранньостиглий високоврожайний сорт
2. Безостий з високим потенціалом врожайності
3. Відмінна зимостійкість
4. Стійкий до основних хвороб

РЕКОМЕНДОВАНІ ЗОНИ ВИРОЩУВАННЯ

Степ, Лісостеп, Полісся

РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА ТА СТРОКИ ВИСІВУ

Ранні 4,5 млн. шт. насінин на 1 га

Оптимальні 5 млн. шт. насінин на 1 га

Пізні 5,5 млн. шт. насінин на 1 га

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ

Борошниста роса

8

Септоріоз

8

Кореневі гнилі

7

Фузаріоз

7

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Зимостійкість

8

Стійкість до осипання

8

Посухостійкість

8

Розвиток з осені

7

Стійкість до вилягання

8

Розвиток навесні

8

Стійкість до ламкості стебла

7

Інтенсивність кущення

8

Сорт озимого ячменю Карміна пристосований до вирощування в складних природно-кліматичних умовах із доброю стійкістю до основних хвороб та несприятливих факторів навколишнього середовища.

ПРОФІЛЬ СОРТУ

Тип використання	фуражний
Різновид	палідум (шестирядний колос)
Висота рослин	78 см
Маса 1 000 насінин	48 г
Вміст білку	13%
Група стиглості	ранньостиглий

ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ

1. Один з кращих для вирощування в складних умовах
2. Ранній сорт з високими показниками врожайності
3. Посухостійкий, перевершує всі сорти при вирощуванні на легких ґрунтах
4. Гарні показники зимостійкості
5. Висока стійкість до основних грибкових захворювань

РЕКОМЕНДОВАНІ ЗОНИ ВИРОЩУВАННЯ

Лісостеп, Степ

РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА ВИСІВУ

2,8-3,6 млн. шт. насінин на 1 га

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ



АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ



ХАЙЛАЙТ – сорт із дуже високою врожайністю, яка формується за рахунок високої озерненості колоса та дуже високої маси тисячі насінин. Виповненість зерна, легке відокремлення остюків при збиранні дають змогу отримувати якісний врожай із високою натурою.

ПРОФІЛЬ СОРТУ

Тип використання	фуражний
Різновид	палідум (шестирядний колос)
Висота рослин	100 см
Маса 1 000 насінин	51 г
Вміст білку	13%
Група стиглості	середньостиглий

ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ

1. Зимостійкий
2. Добра посухостійкість
3. Стабільний за рівнем урожайності
4. Підвищена стійкість до ураження вірусом жовтої мозаїки ячменю (ВЖМЯ)

РЕКОМЕНДОВАНІ ЗОНИ ВИРОЩУВАННЯ

Степ, Лісостеп, Полісся

РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА ВИСІВУ

3,0-3,5 млн. шт. насінин на 1 га

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ



АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ





ЛЮЦЕРНА ПЛАТО

Сорт люцерни з вертикальною формою росту. Висока врожайність зеленої та сухої маси, підвищена стійкість до вилягання, в'янення листя та до конюшиного раку - роблять цей сорт абсолютно особливим. За сприятливих умов може давати 5-6 укосів за рік. Потенціал урожайності від 400 до 800 кг сухого сіна з га за 2-3 укоси, а на 4-6 укіс може досягати 1200-2000 кг/га.

ПРОФІЛЬ СОРТУ

Вид	бобові
Тип використання	сінажний
Упаковка	25 кг

ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ

1. Висока врожайність сухої та сирої маси
2. Стійкий до вилягання
3. Стійкий до конюшинного раку
4. Підвищена стійкість до весняних заморозків

РЕКОМЕНДОВАНІ ЗОНИ

ВИРОЩУВАННЯ Лісостеп, Полісся

РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА

ВИСІВУ 25 кг на 1 га



NEW ЛЮЦЕРНА ВЕРКО

Новий високопродуктивний сорт люцерна Верко характеризується дуже тонким стеблом, відмінною стійкістю до вилягання та стійкістю до хвороб. Високоврожайний сорт здатен давати до 5 укосів за рік. Сорт виключно прямостоячого типу із доброю залистяністю, висотою рослини до 65 см.

ПРОФІЛЬ СОРТУ

Вид	бобові
Тип використання	сінажний
Упаковка	25 кг

ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ

1. Новий високопродуктивний сорт
2. Максимально тонке стебло
3. Стійкий до вилягання
4. Виключно прямостоячого типу із доброю залистяністю

РЕКОМЕНДОВАНІ ЗОНИ

ВИРОЩУВАННЯ Лісостеп, Полісся

РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА

ВИСІВУ 25 кг на 1 га

МАДАЛІНА ЛЮЦЕРНА



Мадаліна належить до сортів з високим відсотком залистяності, стійкий до вилягання та придатний до вирощування в посушливих умовах. Генетична основа Мадаліни це - сорти люцерни, які мають високу зимостійкість та демонструють відмінну стійкість до хвороб. Крім пристосованості до відповідних ґрунтово-кліматичних умов, сорт в результаті селекційної роботи отримав генетично високу врожайність у порівнянні з іншими сортами.

ГОСПОДАРСЬКІ ТА БІОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Швидкий розвиток навесні
- Початок цвітіння - середній
- Добра зимостійкість
- Добра посухостійкість
- Стійкість до фузаріозного в'янення та бурої плямистості
- Швидке відростання після укусу

КОРМОВІ ТРАВОСУМІШІ



КАНТРИ 2326 Високопродуктивна типово силосно-сінажна суміш

- **75%** Люцерна посівна / *Medicago sativa*

- **25%** Грястиця збірна / *Dactylis glomerata*

Рекомендована норма висіву: 35-40 кг на 1 га

МПП Фірма «Ерідон»

+380 (44) 536-92-00
+380 (44) 501-88-30

Центральний офіс:

вул. Чорновола, 30
с. Софіївська Борщагівка (промвузол Жуляни)
Києво-Святошинський р-н, Київська обл.

office@eridon.ua
03191, м. Київ, а/с 50

КОНТАКТИ РЕГІОНАЛЬНИХ ПІДРОЗДІЛІВ

ВІННИЦЬКА

• м. Вінниця
+380 (432) 55 78 14
• м. Іллінці
+380 (4345) 2 12 94
• смт Вапнярка
+380 (432) 50 62 01
+380 (432) 50 62 02

ВОЛИНЬКА

• м. Луцьк
+380 (332) 70 11 58
+380 (332) 70 11 59
+380 (332) 70 11 60

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

• м. Новомосковськ
+380 (5696) 9 64 81
+380 (5696) 9 64 82
• м. Кривий Ріг
+380 (564) 09 59 09

ДОНЕЦЬКА

• м. Краматорськ
+380 (6264) 7 21 42

ЖИТОМИРСЬКА

• м. Житомир
+380 (412) 43 09 42

ЗАКАРПАТСЬКА

• м. Мукачево
+380 (3131) 3 18 20

ЗАПОРІЗЬКА

• м. Запоріжжя
+380 (612) 26 28 90
• м. Бердянськ
+380 (6153) 2 37 00
+380 (6153) 2 37 02
• м. Токмак
+380 (6178) 4 27 72

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА

• м. Івано-Франківськ
+380 (342) 71 01 45

КИЇВСЬКА

• м. Київ
+380 (44) 536 92 02
• м. Біла Церква
+380 (44) 536 92 02
• м. Миронівка
+380 (4574) 5 31 40

КИРОВОГРАДСЬКА

• м. Добровеличівка
+380 (5253) 5 29 63
• м. Кропивницький
+380 (522) 27 10 27

ЛУГАНСЬКА

• м. Старобільськ
+380 (6461) 2 20 47

ЛЬВІВСЬКА

• смт Запитів
+380 (322) 36 21 10 (11)
+380 (322) 36 21 15

МИКОЛАЇВСЬКА

• смт Арбузинка
+380 (89) 250 03 01
• с. Баловне
+380 (512) 48 92 00
+380 (512) 48 92 01(02)

ОДЕСЬКА

• м. Одеса
+380 (48) 790 07 10 (11)
+380 (48) 790 07 12 (13)
• с. Чубівка
+380 (4862) 97 5 86
• м. Ізмаїл
+380 (4841) 6 17 81
• смт Сарата
+380 (4848) 2 29 98
• смт Тарутине
+380 (4848) 2 29 98

ПОЛТАВСЬКА

• м. Полтава
+380 (532) 66 18 12
• м. Лубни
+380 (95) 275 29 16

РІВНЕНСЬКА

• м. Рівне
+380 (362) 64 25 66

СУМСЬКА

• м. Суми
+380 (542) 65 12 92
• м. Конотоп
+380 (5447) 62 3 12

ТЕРНОПІЛЬСЬКА

• м. Тернопіль
+380 (352) 43-43-46

ХАРКІВСЬКА

• м. Харків
+380 (57) 766 45 27
• м. Балаклія
+380 (57) 492 22 23
• м. Лозова
+380 (99) 050 18 63

ХЕРСОНСЬКА

• м. Херсон
+380 (552) 41 06 90
• м. Каховка
+380 (5536) 2 71 10

ХМЕЛЬНИЦЬКА

• м. Хмельницький
+380 (382) 62 57 74
• м. Кам'янець-Подільський
+380 (3849) 5 07 07

ЧЕРКАСЬКА



• м. Черкаси
+380 (472) 64 72 75
• м. Умань
+380 (4744) 3 90 01 (05)

ЧЕРНІВЕЦЬКА

• м. Чернівці
+380 (372) 57 86 86
• с. Романківці
+380 (50) 420 74 75

ЧЕРНІГІВСЬКА

• м. Чернігів
+380 (462) 65 38 90
• м. Ічня
+380 (4633) 2 52 34



Центральний офіс
МПП Фірни «Ерідон»
+380 (44) 536 92 00
+380 (44) 501 88 30
office@eridon.ua



[www eridon ua](http://www.eridon.ua)