



Рекомендаційне повідомлення від технологічних експертів компанії «ЕРІДОН»

Контроль кліща на посівах сої

Тривала аномальна спека по всій території України посприяла масовому розмноженню павутинного кліща. Цього року масове заселення посівів сої **павутинним кліщем** спостерігається навіть у тих регіонах, де зазвичай на цього шкідника взагалі не звертали уваги в зв'язку з низькою шкодочинністю.

За експертними прогнозами пік розвитку кліща у цьому році припадає на середину липня, коли соя буде у фазі розвитку бобів. Але проконтролювати кліща в цю фазу розвитку досить складно у зв'язку з тим, що **соя** до цього часу формує значну біомасу, кліщ знаходиться переважно на нижній стороні листка, а більшість акарицидів є контактними. Добре покриття нижньої частини листа сої в цей період майже неможливе.

Оптимальною схемою захисту від Павутинного кліща є:

- Вода 300 л/га + **Спрей-Ейд** (30 мл/100 л води) + **Шерман** 1 л/ га + **Сіліксан** (0,15 л/га)
- Вода 300 л/га + **Спрей-Ейд** (30 мл/100 л води) + **Шерман** 0,8 л/ га + **Пайт** 0,3 л/га + **МультиМастр** (80 мл /100 л/га) при високих температурах та для додаткового контролю **Вогнівки акаціевої**

Вдалих Вам врожаїв!

