



*Рекомендаційне повідомлення від
технологічних експертів компанії «ЕРІДОН»*

Захист посівів озимого ріпаку на початковому етапі росту

Сезон посіву **озимого ріпаку** розпочинається дуже рано – з третьої декади липня.

Це пов'язано із наявністю вологи та зростанням температур. Сільгоспвиробники мають на меті отримати повноцінні сходи, тож розпочинають посів раніше оптимальних строків (після збирання ранніх зернових, орієнтуючись на опади).

Однією з основних технологічних операцій при посіві ріпаку є боротьба із бур'янами на початковому етапі росту. **Особливу увагу звертають на ґрунтові схеми контролю однорічних дводольних та злакових бур'янів.** Враховуючи особливості ґрунтово-кліматичних умов, достатня кількість вологи в посівному шарі ґрунту та висока температура повітря сприяє сходою великої кількості бур'янів.

Оптимальною та економічно ефективною **ґрунтовою схемою захисту посівів ріпаку** на початковому етапі росту та розвитку виступає:

- **Тайгейдер** (Пропізохлор 720 г/л) 2 - 2,5 л/га + **Бустер Фаст** (Кломазон 480 г/л) 0,17 – 0,2 л/га + **МультиМастр** 0,5 л/га

Вказана схема забезпечує повний контроль однорічних дводольних та злакових бур'янів, без виявлених ознак токсикації культури, наявність препарату **МультиМастр** забезпечить подовжений період ґрунтової дії.

