



ЕРІДОН®

СПІВПРАЦЯ, ЯКА ГАРАНТУЄ УСПІХ

НАСІННЯ ЯРИХ КУЛЬТУР

2020



№ стор.	Культура	Оригіатор насіння	Сорт	Особливості	Група стиглості
1	Пшениця яра		Кітрі <i>new</i>	безостий	середньостиглий
2	Ячмінь ярий		Овертур	дворядний	ранньостиглий
3	Ячмінь ярий		Гуллівер <i>new</i>	дворядний	середньоранній
4	Ячмінь ярий		Гладіс	дворядний	середньопізній
6	Соя		ЕС Гладіатор <i>new</i>	індетермінантний	0 (середньоранній)
7	Соя		ЕС Ментор	напівдетермінантний	00 (ранній)
8	Соя		ЕС Тенор <i>new</i>	індетермінантний	00 (ранній)
9	Соя		ЕС Командор <i>new</i>	напівдетермінантний	000 (дуже ранній)
10	Соя		ЕС Фавор <i>new</i>	напівдетермінантний	000 (дуже ранній)
11	Соя		ЕС Сенатор	індетермінантний	000 (дуже ранній)
12	Соя		Алігатор	індетермінантний	000 (дуже ранній)
13	Соя		Амадеа	індетермінантний	000 (дуже ранній)
14	Горох		Гамбіт	жовтозерний	середньостиглий
15	Горох		Есо	жовтозерний	середньостиглий
16	Горох		Аудіт	жовтозерний	середньопізній
17	Горох		Стабіл	жовтозерний	середньостиглий
18	Нут		Арас <i>new</i>	крупнозерний	ранньостиглий
19	Нут		Гоксу <i>new</i>	крупнозерний	ранньостиглий
20	Льон		Лірина	олійний	середньостиглий
21	Люцерна		Плато	синя	багаторічні
21	Люцерна		Верко	синя	багаторічні
22	Люцерна		Мадаліна	синя	багаторічні
22	Кормові травосуміші		КАНТPI 2326	силосно-сінажна	багаторічні
23	Кормові травосуміші		Лугова LS-1	пасовищно-сінажна	багаторічні
23	Кормові травосуміші		Для пасовищ та сінокошу KRS	пасовищно-сінокісна	багаторічні
24	Кормові травосуміші		Для пасовищ	пасовищна	багаторічні
24	Кормові травосуміші		Для молочних корів	пасовищна	багаторічні

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Посухостійкість

7

Стійкість до вилягання

8

Стійкість до ламкості стебла

8

Стійкість до осипання

9

Розвиток навесні

9

Інтенсивність кущення

7

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ

Борошниста роса

8

Кореневі гнилі

7

Септоріоз

8

Фузаріоз колосу

7

ПРОФІЛЬ СОРТУ

Група якості: цінна

Тип використання: хлібопекарський

Різновид: лютеценс (безостий)

Група стиглості: середньостиглий

Оригінатор: Selgen (Чехія)

МОРФОЛОГІЯ ТА СТРУКТУРА ВРОЖАЙНОСТІ

Висота рослин: 80-90 см

Маса 1 000 насінин: 45 г

Рекомендована норма висіву:

4,5-5,5 млн. шт. насінин на 1 га

Рекомендовані зони вирощування:

Полісся, Лісостеп

selgen

КІТРІ **NEW!**

ЯРА М'ЯКА ПШЕНИЦЯ

Інтенсивний високоврожайний сорт пшениці ярої характеризується невибагливістю до умов вирощування та підвищеною стійкістю до ураження борошнистою росою, фузаріозом та бурою листовою іржею. Відноситься до цінних пшениць із високими хлібопекарськими якостями.

ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ

1. Високоврожайний сорт
2. Невибагливий до попередника
3. Висока стійкість до хвороб
4. Підвищена стійкість до вилягання та осипання зерна

ОВЕРТЮР

ЯРИЙ ЯЧМІНЬ

Сорт ярого ячменю, який має високу стійкість до ламкості стебла та вилягання, а також високу толерантність до низки хвороб. Сорт був створений на основі генетичного матеріалу таких відомих сортів як Concerto та Quench. Рослина середньоросла з крупним зерном. Відноситься до різновиду Нутанс (Nutans).

ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ

- 1. Високоврожайний**
- 2. Надзвичайна стійкість до вилягання**
- 3. Висока стійкість до хвороб**

ПРОФІЛЬ СОРТУ

Тип використання: пивоварний
Різновид: нутанс (дворядний колос)
Група стиглості: ранньостиглий
Оригіатор: Limagrain (Франція)

МОРФОЛОГІЯ ТА СТРУКТУРА ВРОЖАЙНОСТІ

Висота рослин: 70-75 см
Маса 1 000 насінин: 40-56 г
Вміст білку: 9%

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Посухостійкість



Стійкість до вилягання



Розвиток навесні



Стійкість до ламкості стебла



Стійкість до ламкості колоса



Рекомендована норма висіву:
4,5 млн. шт. насінин на 1 га
Рекомендовані зони вирощування:
Полісся, Лісостеп, Степ

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ

Бура іржа



Карликова іржа



Борошниста роса



Сітчаста плямистість



Ринхоспоріоз



Гельмінтоспоріоз



Сажка



Рекомендована норма висіву:
3,5-4,5 млн. шт. насінин на 1 га
**Рекомендовані зони
вищущування:**
Полісся, Лісостеп, Степ

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ

Бура іржа

8

Карликова іржа

7

Борошниста роса

7

Сітчаста плямистість

8

Ринхоспоріоз

8

Гельмінтоспоріоз

7

Сажка

8

ВЖМЯ

8

ПРОФІЛЬ СОРТУ

Тип використання: пивоварний
Різнорид: нутанс (дворядний колос)
Група стиглості: середньоранній
Оригіатор: Secobra (Франція)

МОРФОЛОГІЯ ТА СТРУКТУРА ВРОЖАЙНОСТІ

Висота рослин: 60 см
Маса 1 000 насінин: 48 г
Вміст білку: 12%

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Посухостійкість

8

Стійкість до вилягання

9

Розвиток навесні

8

Стійкість до ламкості стебла

9

Стійкість до ламкості колоса

8

Інтенсивність кущення

7



NEW!

ГУЛЛІВЕР

ЯРИЙ ЯЧМІНЬ

Новинка на ринку Європи та України. Сорт з генетично підвищеним рівнем урожайності з кротким та міцним стеблом. Характеризується високою стійкістю до вилягання та до ламкості стебла. Середньоранній із відмінною стійкістю до хвороб. Сорт містить генетику найкращих сортів ячменю європейської селекції Шанді та Ірина.

ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ

- 1. Високий рівень урожайності**
- 2. Дуже міцне стебло**
- 3. Пластичність до умов вищущування**
- 4. Надзвичайна стійкість до вилягання**

ГЛАДІС

ЯРИЙ ЯЧМІНЬ

Середньорослий сорт ярого ячменю з високим потенціалом врожайності. Відрізняється підвищеною стійкістю до вилягання, толерантністю до ринхоспоріозу та іржі. Стабільно демонструє прекрасну врожайність в усіх зонах вирощування.

ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ

1. Високоврожайний
2. Стійкий до хвороб та вилягання
3. Підходить для всіх типів ґрунту

ПРОФІЛЬ СОРТУ

Тип використання: пивоварний
Різновид: нутанс (дворядний колос)
Група стиглості: середньопізній
Оригіатор: Limagrain (Франція)

МОРФОЛОГІЯ ТА СТРУКТУРА ВРОЖАЙНОСТІ

Висота рослин: 80 см
Маса 1 000 насінин: 47 г
Вміст білку: 9%

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Посуhostійкість



Стійкість до вилягання



Розвиток навесні



Стійкість до ламкості стебла



Стійкість до ламкості колоса



Інтенсивність кушення



Рекомендована норма висіву:
3,5-4,5 млн. шт. насінин на 1 га
**Рекомендовані зони
вирощування:**
Полісся, Лісостеп, Степ

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ

Бура іржа



Карликова іржа



Борошниста роса



Сітчаста плямистість



Ринхоспоріоз



Гельмінтоспоріоз



Сажка



ВЖМЯ





Напівдетермінантний



Індетермінантний

СОРТИ СОЇ ЄВРАЛІС

ГРУПА СТИГЛОСТІ	НАЗВА СОРТУ	ВИГЛЯД НАСІНИНИ	ВИД	ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
000, ДУЖЕ РАННІЙ	ЕС КОМАНДОР			Ранній, стабільний сорт, із високим вмістом білка, стійкий до вилягання
	АЛІГАТОР			Високопродуктивний ультраранній сорт
	ЕС ФАВОР			Високоврожайний сорт з високою комплексною стійкістю до хвороб
	ЕС СЕНАТОР			Дуже пластичний сорт, із високим вмістом протеїну, стійкий до стресових умов!
00, РАННІЙ	ЕС ТЕНОР			Ранній, стабільний сорт, із високим вмістом білка, стійкий до вилягання
	ЕС МЕНТОР			Бестселлер серед сортів Євраліс в Європі! Прекрасне поєднання високої стабільної врожайності та вмісту протеїну
0, СЕРЕДНЬОРАННІЙ	ЕС ГЛАДІАТОР			Стабільно високоврожайний сорт в своїй групі

ЕС ГЛАДІАТОР

СОЯ

Єдиний з сортів у своїй групі, який вирізняється не лише значним потенціалом урожайності, а ще й стабільністю показника продуктивності.

ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ

1. Відмінна посухостійкість
2. Стійкість до розтріскування
3. Пластичний та стабільний за врожайністю

Рекомендована норма висіву:

600 тис. шт. насінин на 1 га

Рекомендована густота рослин на момент збирання: 500 тис./га

Рекомендовані зони вирощування:

Лісостеп, Степ

Застереження!!!

Не використовувати Метоброумурон

ПРОФІЛЬ СОРТУ

Група стиглості: 0 (середньоранній)

Тип росту: індетермінантний

Веgetаційний період: 115-120 дн.

Кількість днів сходи-цвітіння: 48 дн.

Оригіатор: Euralis (Франція)

Опушення бобів та стебла:

світло-коричневе

Квітка: фіолетова

Біб: сірий

НАСІНИНА

Насіннева оболонка:

світло-коричнева

Інтенсивність пігментації:

без пігментації

Рубчик: світлий

МОРФОЛОГІЯ ТА СТРУКТУРА ВРОЖАЙНОСТІ

Висота рослин: 95 см

Висота кріплення нижнього боба:

13 см

Маса 1 000 насінин: 229 г

Кількість теплових одиниць: 2 700

Вміст білку: 43%

Вміст олії: 20,5%

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Енергія початкового розвитку

8

Здатність до галузнення

8

Стійкість до вилягання

9

Стійкість до розтріскування

8

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ

Склеротиніоз

8

Бактеріоз

8

Пероноспороз

8

Вірусні хвороби

7

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Енергія початкового розвитку

8

Здатність до галузнення

7

Стійкість до вилягання

9

Стійкість до розтріскування

8

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ

Склеротиніоз

8

Бактеріоз

7

Пероноспороз

6

Вірусні хвороби

8

ПРОФІЛЬ СОРТУ

Група стиглості: 00 (ранній)

Тип росту: напівдетермінантний

Вегетаційний період: 105 дн.

Кількість днів сходи-цвітіння: 50 дн.

Оригіатор: Euralis (Франція)

Опушення бобів та стебла:

світло-коричневе

Квітка: фіолетова

Біб: світло-коричневий

НАСІНИНА

Насіннева оболонка: жовта

Інтенсивність пігментації:

без пігментації

Рубчик: жовтий

МОРФОЛОГІЯ ТА СТРУКТУРА ВРОЖАЙНОСТІ

Висота рослин: 77 см

Висота кріплення нижнього боба:

13 см

Маса 1 000 насінин: 195 г

Кількість теплових одиниць: 2 600

Вміст білку: 43%

Вміст олії: 20,5%

EURALIS

ЕС МЕНТОР

СОЯ

Сорт сої, який є лідером по врожайності в ранній групі. Прекрасне поєднання високої стабільності, врожайності та вмісту протеїну.

ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ

1. Стабільно високий врожай
2. Пластичний
3. Високопротеїновий

Рекомендована норма висіву:

500-550 тис. шт. насінин на 1 га

Рекомендована густина рослин на

момент збирання: 450-520 тис./га

Рекомендовані зони вирощування:

Лісостеп, Степ

Застереження!!!

Не використовувати Метрибузин

ЕС ТЕНОР

СОЯ

Основними характеристиками сорту є ранньостиглість, високий вміст білку та стійкість до вилягання. Раннє дозрівання в усіх кліматичних зонах України.

ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ

1. Стійкість до вилягання
2. Високий вміст білку
3. Стійкість до осипання
4. Високий потенціал врожайності

Рекомендована норма висіву:

650 тис. шт. насінин на 1 га

Рекомендована густота рослин на момент збирання: 550 тис./га

Рекомендовані зони вирощування:

Лісостеп, Степ

Застереження!!!

Не використовувати Метоброумурон

ПРОФІЛЬ СОРТУ

Група стиглості: 00 (ранній)

Тип росту: індетермінантний

Веgetаційний період: 105-110 дн.

Кількість днів сходи-цвітіння: 46 дн.

Оригіатор: Euralis (Франція)

Опушення бобів та стебла:

світло-коричневе

Квітка: фіолетова

Біб: коричневий

НАСІНИНА

Насіннева оболонка: коричнева

Інтенсивність пігментації:

без пігментації

Рубчик: темно-коричневий

МОРФОЛОГІЯ ТА СТРУКТУРА ВРОЖАЙНОСТІ

Висота рослин: 81 см

Висота кріплення нижнього боба:

12 см

Маса 1 000 насінин: 188 г

Кількість теплових одиниць: 2 550

Вміст білку: 43%

Вміст олії: 20,5%

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Енергія початкового розвитку

8

Здатність до галузнення

8

Стійкість до вилягання

8

Стійкість до розтріскування

9

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ

Склеротиніоз

8

Бактеріоз

8

Пероноспороз

9

Вірусні хвороби

7

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Енергія початкового розвитку

8

Здатність до галузнення

5

Стійкість до вилягання

9

Стійкість до розтріскування

9

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ

Склеротиніоз

8

Бактеріоз

9

Пероноспороз

9

Вірусні хвороби

8

ПРОФІЛЬ СОРТУ

Група стиглості: 000 (дуже ранній)

Тип росту: напівдетермінантний

Вегетаційний період: 90-110 дн.

Кількість днів сходи-цвітіння: 45 дн.

Оригінатор: Euralis (Франція)

Опушення бобів та стебла:

світло-коричневе

Квітка: фіолетова

Біб: світло-коричневий

НАСІНИНА

Насіннева оболонка: жовта

Інтенсивність пігментації:

без пігментації

Рубчик: світлий

МОРФОЛОГІЯ ТА СТРУКТУРА ВРОЖАЙНОСТІ

Висота рослин: 74 см

Висота кріплення нижнього боба:

11 см

Маса 1 000 насінин: 196 г

Кількість теплових одиниць: 2 400

Вміст білку: 42%

Вміст олії: 20,7%

EURALIS

NEW!

ЕС КОМАНДОР

СОЯ

Напівдетермінантний сорт сої лідер в свої групі стиглості!

Відмінна врожайність. Високий вміст білку. Велика натура зерна.

ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ

1. Стабільний рівень продуктивності
2. Високий вміст протеїну
3. Стійкість до вилягання

Рекомендована норма висіву:

700 тис. шт. насінин на 1 га

Рекомендована густота рослин на

момент збирання: 580 тис./га

Рекомендовані зони вирощування:

Лісостеп, Степ

Застереження!!!

Не використовувати Пендиметалін

ЕС ФАВОР

СОЯ

Новий сорт з високими показниками продуктивності та ранніми термінами дозрівання. Ранньостиглий з відмінним потенціалом врожайності та вмістом білку.

ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ

1. Ранньостиглість
2. Високий вміст білку
3. Стійкість до комплексу хвороб

Рекомендована норма висіву:

700 тис. шт. насінин на 1 га

Рекомендована густота рослин на момент збирання: 600 тис./га

Рекомендовані зони вирощування:

Полісся, Лісостеп, Степ

Застереження!!!

Не використовувати Метоброумурон

ПРОФІЛЬ СОРТУ

Група стиглості: 000 (дуже ранній)

Тип росту: напівдетермінантний

Веgetаційний період: 90-105 дн.

Кількість днів сходи-цвітіння: 43 дн.

Оригіатор: Euralis (Франція)

Опушення бобів та стебла:

світло-коричневе

Квітка: фіолетова

Біб: світло-коричневий

НАСІНИНА

Насіннева оболонка:

світло-коричнева

Інтенсивність пігментації:

без пігментації

Рубчик: темно-коричневий

МОРФОЛОГІЯ ТА СТРУКТУРА ВРОЖАЙНОСТІ

Висота рослин: 69 см

Висота кріплення нижнього боба:

11 см

Маса 1 000 насінин: 191 г

Кількість теплових одиниць: 2 400

Вміст білку: 42%

Вміст олії: 21,4%

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Енергія початкового розвитку

8

Здатність до галузнення

5

Стійкість до вилягання

8

Стійкість до розтріскування

9

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ

Склеротиніоз

8

Бактеріоз

9

Пероноспороз

9

Вірусні хвороби

8

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Енергія початкового розвитку

8

Здатність до галузнення

7

Стійкість до вилягання

8

Стійкість до розтріскування

8

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ

Склеротиніоз

8

Бактеріоз

7

Пероноспороз

6

Вірусні хвороби

8

ПРОФІЛЬ СОРТУ

Група стиглості: 000 (дуже ранній)

Тип росту: індетермінантний

Вегетаційний період: 100 дн.

Кількість днів сходи-цвітіння: 50 дн.

Оригінатор: Euralis (Франція)

Опушення бобів та стебла:

світло-коричневе

Квітка: фіолетова

Біб: світло-коричневий

НАСІНИНА

Насіннева оболонка: жовта

Інтенсивність пігментації:

без пігментації

Рубчик: жовтий

МОРФОЛОГІЯ ТА СТРУКТУРА ВРОЖАЙНОСТІ

Висота рослин: 81 см

Висота кріплення нижнього боба:

12 см

Маса 1 000 насінин: 186 г

Кількість теплових одиниць: 2 500

Вміст білку: 41%

Вміст олії: 21%

EURALIS

ЕС СЕНАТОР

СОЯ

Ранньостиглий сорт сої з високим вмістом протеїну. Пластичний, дуже стійкий до стресових умов. Один з найкращих сортів по співвідношенню ранньостиглості та врожайності.

ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ

1. Стабільна врожайність
2. Стійкий до вилягання
3. Толерантний до стресів

Рекомендована норма висіву:

700 тис. шт. насінин на 1 га

Рекомендована густота рослин на

момент збирання: 650-680 тис./га

Рекомендовані зони вирощування:

Лісостеп, Степ

Застереження!!!

Не використовувати Метрибузин

АЛІГАТОР

СОЯ

Ранньостиглий, посухостійкий сорт сої з стабільно високим потенціалом урожайності. Рослини невисокі та стійкі до вилягання. За висотою кріплення нижнього боба добре адаптований до механізованого збирання.

ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ

1. Дуже ранній
2. Посухостійкий
3. Високоврожайний

Рекомендована норма висіву:

700 тис. шт. насінин на 1 га

Рекомендована густота рослин на момент збирання: 650-680 тис./га

Рекомендовані зони вирощування:

Лісостеп, Степ

ПРОФІЛЬ СОРТУ

Група стиглості: 000 (дуже ранній)

Тип росту: індетермінантний

Веgetаційний період: 100 дн.

Кількість днів сходи-цвітіння: 43 дн.

Оригіатор: Euralis (Франція)

Опушення бобів та стебла:

світло-коричневе

Квітка: фіолетова

Біб: світло-коричневий

НАСІНИНА

Насіннева оболонка: жовта

Інтенсивність пігментації:

без пігментації

Рубчик: коричневий

МОРФОЛОГІЯ ТА СТРУКТУРА ВРОЖАЙНОСТІ

Висота рослин: 74 см

Висота кріплення нижнього боба:

12 см

Маса 1 000 насінин: 180 г

Кількість теплових одиниць: 2 500

Вміст білку: 40,5%

Вміст олії: 21%

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Енергія початкового розвитку

9

Здатність до галузнення

7

Стійкість до вилягання

8

Стійкість до розтріскування

8

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ

Склеротиніоз

9

Бактеріоз

7

Пероноспороз

7

Вірусні хвороби

8

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Енергія початкового розвитку

8

Здатність до галузнення

7

Стійкість до вилягання

9

Стійкість до розтріскування

8

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ

Склеротиніоз

7

Бактеріоз

8

Пероноспороз

7

Вірусні хвороби

7

ПРОФІЛЬ СОРТУ

Група стиглості: 000 (дуже ранній)

Тип росту: індетермінантний

Вегетаційний період: 102 дн.

Кількість днів сходи-цвітіння: 50 дн.

Оригіатор: Заатбау (Австрія)

Опушення бобів та стебла:

світло-коричневе

Квітка: фіолетова

Біб: світло-коричневий

НАСІНИНА

Насіннева оболонка: жовта

Інтенсивність пігментації:

без пігментації

Рубчик: жовтий

МОРФОЛОГІЯ ТА СТРУКТУРА ВРОЖАЙНОСТІ

Висота рослин: 75 см

Висота кріплення нижнього боба:

14 см

Маса 1 000 насінин: 150 г

Кількість теплових одиниць: 2450

Вміст білку: 43%

Вміст олії: 21%



АМАДЕА

СОЯ

Сорт з досконалою генетикою. Ідеально збалансований за показниками урожайності та якості. Високостійкий до вилягання та осипання

ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ

1. Високоврожайний сорт
2. Стійкий до вилягання та осипання
3. Стабільна продуктивність

Рекомендована норма висіву:

600 тис. шт. насінин на 1 га

Рекомендована густота рослин на

момент збирання: 550 тис./га

Рекомендовані зони вирощування:

Лісостеп, Степ

ГАМБІТ

ГОРОХ

Середньостиглий сорт жовтозерного гороху з потенціалом врожайності до 60 ц/га. Інтенсивного, прямостоячого типу, стійкий до вилягання та осипання. Сорт відноситься до найбільш стійких сортів проти комплексу коренових та стеблових хвороб. Не вибагливий до попередника, може висіватись після зернових та кукурудзи. Посів краще проводити в ранні строки.

ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ

1. Високоврожайний та пластичний
2. Невибагливий до попередника
3. Стійкий до осипання
4. Висока стійкість до переноспорузу

ПРОФІЛЬ СОРТУ

Група стиглості: середньостиглий

Колір зерна: жовтозерний

Однорідність насіння за кольором: 100%

Форма зерна: кругла

Оригіатор: Селген (Чехія)

МОРФОЛОГІЯ ТА СТРУКТУРА ВРОЖАЙНОСТІ

Висота рослин: 104 см

Маса 1 000 насінин: 280-285 г

Вміст білку: 24%

Рекомендована норма висіву:

0,9 - 1 млн. шт. насінин на 1 га

Рекомендовані зони вирощування:

Полісся, Лісостеп, Степ

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Енергія початкового розвитку

9

Посухостійкість

8

Стійкість до вилягання

8

Стійкість до осипання

7

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ

Кореневі гнилі

8

Борошниста роса

8

Вірусні хвороби

8

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Енергія початкового розвитку

9

Посухостійкість

8

Стійкість до вилягання

7

Стійкість до осипання

8

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ

Кореневі гнилі

8

Борошниста роса

8

Вірусні хвороби

8

ПРОФІЛЬ СОРТУ

Група стиглості: середньостиглий

Колір зерна: жовтозерний

Однорідність насіння за кольором:

100%

Форма зерна: кругла

Оригінатор: Селген (Чехія)

МОРФОЛОГІЯ ТА СТРУКТУРА ВРОЖАЙНОСТІ

Висота рослин: 101 см

Маса 1 000 насінин: 240-270 г

Вміст білку: 24%

Рекомендована норма висіву:

0,9 - 1 млн. шт. насінин на 1 га

Рекомендовані зони вирощування:

Полісся, Лісостеп, Степ

selgen

ЕСО

ГОРОХ

Середньорослий сорт, стійкий до вилягання. Характеризується стійкістю до посухи та осипання з потенційною врожайністю - 65 ц/га. Сорт безлисткового - прямостоячого типу. Придатний до збирання прямим комбайнуванням. Стійкий до кореневих гнилей, аскохітозу, антракнозу та пероноспорозу.

ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ

1. Посухостійкість
2. Високоврожайний сорт
3. Стійкий до ураження основними збудниками хвороб
4. Висока стійкість до пероноспорозу

АУДІТ

ГОРОХ

Сорт гороху з високим потенціалом врожайності, підвищеною стійкістю до вилягання стебла та осипання насіння. Стійкий до стресових умов та з генетично підвищеною посухостійкістю.

ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ

1. Стабільна врожайність
2. Високий вміст протеїну
3. Відмінна стійкість до вилягання
4. Стійкість до хвороб
5. Генетично підвищена посухостійкість

ПРОФІЛЬ СОРТУ

Група стиглості: середньопізній

Колір зерна: жовтозерний

Однорідність насіння за кольором:
100%

Форма зерна: кругла

Оригіатор: Лімагрейн (Франція)

МОРФОЛОГІЯ ТА СТРУКТУРА ВРОЖАЙНОСТІ

Висота рослин: 80 -100 см

Маса 1 000 насінин: 255 г

Вміст білку: 24%

Рекомендована норма висіву:

1,0-1,1 млн. шт. насінин на 1 га

Рекомендовані зони вирощування:

Полісся, Лісостеп, Степ

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Енергія початкового розвитку

9

Посухостійкість

8

Стійкість до вилягання

9

Стійкість до осипання

6

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ

Кореневі гнилі

8

Борошниста роса

8

Вірусні хвороби

8

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Енергія початкового розвитку

9

Посухостійкість

6

Стійкість до вилягання

9

Стійкість до осипання

6

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ

Кореневі гнилі

8

Борошниста роса

8

Вірусні хвороби

8

ПРОФІЛЬ СОРТУ

Група стиглості: середньостиглий

Колір зерна: жовтозерний

Однорідність насіння за кольором:
100%

Форма зерна: кругла

Оригінатор: Саатбау (Австрія)

МОРФОЛОГІЯ ТА СТРУКТУРА ВРОЖАЙНОСТІ

Висота рослин: 110 см

Маса 1 000 насінин: 240-270 г

Вміст білку: 25%

Рекомендована норма висіву:

0,9-1,1 млн. шт. насінин на 1 га

Рекомендовані зони вирощування:

Полісся, Лісостеп, Степ



СТАБІЛ

ГОРОХ

Сорт гороху з потужним початковим ростом. Дуже пластичний, завдяки чому має високу та стабільну врожайність. Генетично підвищена стійкість до осипання та вилягання.

ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ

1. Високоврожайний та пластичний
2. Швидкий початковий розвиток
3. Стійкий до вилягання та осипання
4. Високий вміст протеїну

APAC NEW!

НУТ

Посухостійкий сорт нуту турецької селекції. Характеризується відмінною стійкістю до корневих гнилей та антракнозу із генетично підвищеною стійкістю до осипання.

ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ

1. Посухостійкий
2. Стійкий до осипання
3. Високоврожайний

ПРОФІЛЬ СОРТУ

Група стиглості: ранньостиглий
Веgetаційний період: 90 дн.
Оригіатор: Olgunlar (Туреччина)
Тип: Kabuli (Світлий)
Колір зерна: бежевий
Однорідність насіння за кольором: 100 %
Калібр зерна: 10 мм
Форма зерна: кутаста

МОРФОЛОГІЯ ТА СТРУКТУРА ВРОЖАЙНОСТІ

Висота рослин: 54,5 см
Маса 1 000 насінин: 510 г
Вміст білку: 23%
Висота кріплення нижнього бобу: 31,5 см

Рекомендована норма висіву:
 280 тис. шт. насінин/га
Рекомендовані зони вирощування:
 Степ, Лісостеп

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Посухостійкість

8

Стійкість до вилягання

6

Стійкість до осипання

6

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ

Аскохітоз

8

Кореневі гнилі

7

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Посухостійкість

7

Стійкість до вилягання

5

Стійкість до осипання

5

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ

Аскохітоз

6

Кореневі гнилі

6

ПРОФІЛЬ СОРТУ

Група стиглості: ранньостиглий

Веgetаційний період: 105 дн.

Оригіатор: Olgunlar (Туреччина)

Тип: Kabuli (Світлий)

Колір зерна: бежевий

Однорідність насіння

за кольором: 100 %

Калібр зерна: 10 мм

Форма зерна: куста

МОРФОЛОГІЯ ТА СТРУКТУРА ВРОЖАЙНОСТІ

Висота рослин: 45 см

Маса 1 000 насінин: 450 г

Вміст білку: 22%

Висота кріплення нижнього бобу:
25,5 см

Рекомендована норма висіву:

280 тис. шт. насінин/га

Рекомендовані зони вирощування:

Степ, Лісостеп



ГОКСУ **NEW!**

НУТ

Сорт нуту турецької селекції, типу Kabuli (світлий). Крупнозерний із кустастою формою зерна. Характеризується доброю морозостійкістю та стійкістю до антракнозу.

ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ

1. Морозостійкий
2. Висока стійкість до хвороб
3. Відмінна стійкість до вилягання

ЛІРИНА

ЛЬОН ОЛІЙНИЙ

Сорт олійного льону, який залишається найкращим за показниками врожайності та вмісту олії в насінні. Підвищенна посухостійкість дала змогу розширити ареал вирощування сорту з Полісся та Лісостепу до Степової зони. Технологічність сорту надає високу придатність до механізованого збирання, стійкість до вилягання, осипання та рівномірного дозрівання.

ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ

1. Високий та стабільний врожай
2. Висока стійкість до вилягання
3. Стійкість до посухи

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Енергія початкового розвитку

7

Посухостійкість

9

Стійкість до вилягання

9

Стійкість до осипання

9

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ

Фузаріоз

5

Антракноз

5

ПРОФІЛЬ СОРТУ

Група стиглості: середньостиглий

Вегетаційний період: 120 дн.

Оригігатор: DSV (Німеччина)

МОРФОЛОГІЯ ТА СТРУКТУРА ВРОЖАЙНОСТІ

Висота рослин: 70 см

Технічна довжина: 48 см

Маса 1 000 насінин: 7,0 г

Частка волокна: 50%

Вихід довгого волокна: 0%

Вихід короткого волокна: 100%

Вміст олії: 45%

Рекомендована норма висіву:

4-5 млн. шт. насінин на 1 га

Рекомендовані зони вирощування:

Полісся, Лісостеп, Степ

ПЛАТО

Сорт люцерни з вертикальною формою росту. Висока врожайність зеленої та сухої маси, підвищена стійкість до вилягання, в'янення листя та до конюшинного раку - роблять цей сорт абсолютно особливим. За сприятливих умов може давати 5-6 укосів в рік.

Потенціал урожайності від 400 до 800 кг сухого сіна з га за 2-3 укоси, а на 4-6 укіс може досягати 1200-2000 кг/га.

ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ:

1. Висока врожайність сухої та сирої маси
2. Стійкий до вилягання
3. Стійкий до конюшинного раку
4. Підвищена стійкість до весняних заморозків

ВЕРКО

Новий високопродуктивний сорт люцерни Верко характеризується дуже тонким стеблом із відмінною стійкістю до вилягання та стійкістю до хвороб. Високоврожайний сорт здатен давати до 5 укосів за рік. Сорт виключно прямостоячого типу із доброю залистяністю, висотою рослини до 65 см.

ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ:

1. Новий високопродуктивний сорт
2. Максимально тонке стебло
3. Стійкий до вилягання
4. Виключно прямостоячого типу із доброю залистяністю

МАДАЛІНА

Мадаліна належить до сортів з високим відсотком залистяності. Стійкий до вилягання та придатний до вирощування в посушливих умовах. Генетична основа Мадаліни це - сорти люцерни, які мають високу зимостійкість та демонструють відмінну стійкість до хвороб. Крім пристосованості до відповідних ґрунтово-кліматичних умов, сорт в результаті селекційної роботи отримав генетично високу врожайність у порівнянні з іншими сортами.

ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ:

1. Швидкий розвиток навесні
2. Початок цвітіння середній
3. Добра зимостійкість
4. Добра посухостійкість
5. Стійкість до фузаріозного в'янення та бурї плямистості
6. Швидке відростання після укусу

КОРМОВІ ТРАВΟΣУМІШІ DSV

КАНТРИ 2326

Високопродуктивна типово силосно-сінажна суміш

- 75% Люцерна посівна / Medicago sativa
- 25% Грястиця збірна / Dactylis glomerata

Рекомендована норма висіву: 35-40 кг на 1 га

ЛУГОВА LS-1

Якісна суміш для випасання. Трави у складі, характеризуються швидким приростом зеленої маси призначеної для випасання тварин. Використовується для створення луків на всіх типах ґрунтів.

- 12% Вівсяниця лугова
- 15% Грястиця збірна
- 10% Райграс багатоквітковий
- 15% Вівсяниця червона
- 12% Райграс збірний
- 4% Стоколос
- 4% Вівсяниця тростинна
- 21% Райграс багаторічний
- 7% Конюшина біла

Рекомендована норма висіву: 35-60 кг на 1 га

ДЛЯ ПАСОВИЩ ТА СІНОКОСУ KRS

Суміш трав, що ідеально підходить для виробництва якісного сіна, або випасання худоби. У складі присутні види трав, що характеризуються швидким відновленням та високим врожаєм зеленої маси. Призначена для ґрунтів із достатньою забезпеченістю вологою.

- 10% Вівсяниця лугова
- 15% Грястиця збірна
- 10% Райграс вестервольдський
- 12% Вівсяниця червона
- 7% Райграс збірний
- 5% Стоколос
- 4% Вівсяниця тростинна
- 30% Райграс багаторічний
- 6% Конюшина біла

Рекомендована норма висіву: 35-60 кг на 1 га

КОРМОВІ ТРАВΟΣУМІШІ



ДЛЯ ПАСОВИЩ

Виключно пасовищна суміш трав, що дає до п'яти приростів протягом сезону. До складу входять злакові та бобові трави, які дають поживний корм з високим вмістом протеїну.

- 10% Вівсяниця лугова
- 10% Вівсяниця червона
- 4% Вівсяниця тростинна
- 10% Тимофіївка лугова
- 8% Райграс збірний
- 25% Райграс багаторічний
- 12% Райграс багатоквітковий
- 8% Райграс вестервольдський
- 5% Стоколос
- 6% Тонконіг лучний
- 6% Люцерна посівна

Рекомендована норма висіву: 35-60 кг на 1 га

ДЛЯ МОЛОЧНИХ КОРІВ

Ідеальна пасовищна суміш для молочних господарств, яка також може використовуватись і на зелену масу. Придатна для всіх типів ґрунтів. Вміст мітлиці та райграсу гарантує міцність дернини і стійкість перед витоптуванням. Наявність білої конюшини і люцерни збільшує вміст білку та покращує смакові якості, а стоколос збільшує цінність та урожайність отриманого корму.

- 10% Вівсяниця лугова
- 5% Тимофіївка лугова
- 10% Тонконіг лучний
- 15% Стоколос
- 15% Райграс збірний
- 20% Райграс багаторічний
- 10% Райграс багатоквітковий
- 8% Конюшина лугова
- 8% Люцерна посівна

Рекомендована норма висіву: 35-60 кг на 1 га

+380 (44) 536-92-00
+380 (44) 501-88-30

Центральний офіс:

вул. Чорновола, 30
с. Софіївська Борщагівка (промвузол Жуляни)
Києво-Святошинський р-н, Київська обл.

office@eridon.ua
03191, м. Київ, а/с 50

КОНТАКТИ РЕГІОНАЛЬНИХ ПІДРОЗДІЛІВ

ВІННИЦЬКА

• м. Вінниця
+380 (432) 55 78 14
• м. Іллінці
+380 (4345) 2 12 94
• смт Вапнярка
+380 (432) 50 62 01
+380 (432) 50 62 02

ВОЛИНЬСЬКА

• м. Луцьк
+380 (332) 70 11 58
+380 (332) 70 11 59
+380 (332) 70 11 60

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

• м. Новомосковськ
+380 (5696) 9 64 81
+380 (5696) 9 64 82
• м. Кривий Ріг
+380 (564) 09 59 09

ДОНЕЦЬКА

• м. Краматорськ
+380 (6264) 7 21 42

ЖИТОМИРСЬКА

• м. Житомир
+380 (412) 43 09 42

ЗАКАРПАТСЬКА

• с. Ключарки
+380 (3131) 3 18 20

ЗАПОРІЗЬКА

• м. Запоріжжя
+380 (612) 26 28 90
• м. Бердянськ
+380 (6153) 2 37 00
+380 (6153) 2 37 02
• м. Токмак
+380 (6178) 4 27 72

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА

• м. Івано-Франківськ
+380 (342) 71 01 45

КИЇВСЬКА

• м. Київ
+380 (44) 536 92 02
• м. Біла Церква
+380 (44) 536 92 02
• м. Миронівка
+380 (4574) 5 31 40

КИРОВОГРАДСЬКА

• м. Добровеличівка
+380 (5253) 5 29 63

• м. Кропивницький
+380 (522) 27 10 27

ЛУГАНСЬКА

• м. Старобільськ
+380 (6461) 2 20 47

ЛЬВІВСЬКА

• смт Запитів
+380 (322) 36 21 10 (11)
+380 (322) 36 21 15

МИКОЛАЇВСЬКА

• смт Арбузинка
+380 (89) 250 03 01
• с. Баловне
+380 (512) 48 92 00
+380 (512) 48 92 01(02)

ОДЕСЬКА

• м. Одеса
+380 (48) 790 07 10 (11)
+380 (48) 790 07 12 (13)
• с. Чубівка
+380 (4862) 97 5 86
• м. Ізмаїл
+380 (4841) 6 17 81
• смт Сарата
+380 (4848) 2 29 98

• смт Тарутине
+380 (4848) 2 29 98

ПОЛТАВСЬКА

• м. Полтава
+380 (532) 66 18 12
• м. Лубни
+380 (95) 275 29 16

РІВНЕНСЬКА

• м. Рівне
+380 (362) 64 25 66

СУМСЬКА

• м. Суми
+380 (542) 65 12 92
• м. Конотоп
+380 (5447) 62 3 12

ТЕРНОПІЛЬСЬКА

• м. Тернопіль
+380 (352) 43-43-46

ХАРКІВСЬКА

• м. Харків
+380 (57) 766 45 27
• м. Балаклія
+380 (57) 492 22 23
• м. Лозова
+380 (99) 050 18 63

ХЕРСОНСЬКА

• м. Херсон
+380 (552) 41 06 90
• м. Каховка
+380 (5536) 2 71 10

ХМЕЛЬНИЦЬКА

• м. Хмельницький
+380 (382) 62 57 74
• м. Кам'янець-Подільський
+380 (3849) 5 07 07

ЧЕРКАСЬКА

• м. Черкаси
+380 (472) 64 72 75
• м. Умань
+380 (4744) 3 90 01(05)

ЧЕРНІВЕЦЬКА

• м. Чернівці
+380 (372) 57 86 86
• с. Романківці
+380 (50) 420 74 75

ЧЕРНІГІВСЬКА

• м. Чернігів
+380 (462) 65 38 90
• м. Ічня
+380 (4633) 2 52 34



+380 (44) 536 92 00

+380 (44) 501 88 30

office@eridon.ua



www.eridon.ua