

ЛІНОЛЕВИЙ | СЕРЕДНЬОСТИГЛИЙ

115-118 днів



MAS 96.P

НАША ВІДПОВІДЬ ПІД ЧАС
НАСТУПУ ВОВЧКА

- ГЕНЕТИЧНО ВИСОКИЙ РІВЕНЬ УРОЖАЙНОСТІ**
максимально реалізується у виробничих умовах
- НАЛЕЖНИЙ РІВЕНЬ ТОЛЕРАНТНОСТІ ДО ВОВЧКА РАСИ G**
дає можливість отримати високу врожайність у регіонах, де поширені агресивні раси вовчка
- ВІДМІННИЙ ФІТОСАНІТАРНИЙ СТАН ПРОТЯГОМ ВЕГЕТАЦІЇ**
обумовлений толерантністю до склеротиніозу стебла та кошика

АГРОТЕХНОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ

Вміст олії:	44-47%
Маса 1000 зерен (г):	52-62
Цвітіння:	середньопізнє
Висота рослини:	висока
Форма кошика:	плоска
Нахил кошика:	похилий
Стартовий ріст:	6
Стійкість проти вилягання:	7
Посухостійкість:	9
Вовчок:	G

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ

Несправжня борошниста роса:	RM9
Фомопсис:	7
Склеротиніоз (кошика):	8
Склеротиніоз (стебла):	8

АГРОТЕХНОЛОГІЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

	Умови з достатнім зволоженням	Умови з нестійким зволоженням
Рекомендована густота до збирання (рослин/га)	60-65 000	50-55 000
Рекомендована зона вирощування	Лісостеп, Степ	



МЕТОДИ ЗАХИСТУ СОНЯШНИКУ ВІД ВОВЧКА

ПЕРЕД ПОСІВОМ

- Ідентифікуйте інфіковані поля
- Дотримуйтеся мінімальної сівозміни: мінімум 3 роки перед посівом соняшнику на цьому самому полі

РІЗНОМАНІТНІСТЬ ВИБОРУ

- Використовуйте гібриди соняшнику, стійкі проти вовчка соняшникового або придатні до виробничих систем Clearfield®/Clearfield® PLUS
- Використовуйте гербіциди в максимально дозволеному дозуванні
- Уникайте дефіциту поживних речовин, щоб мати сильні рослини

ПІСЛЯ ЗБОРУ ВРОЖАЮ

- Збирайте врожай на неінфікованих полях спочатку, а вже потім на інфікованих
- Ретельно очищайте та мийте техніку після кожного поля
- Використовуйте систему глибокого обробітку ґрунту, щоб уникнути розповсюдження насіння паразита вітром або дикими тваринами

