



# ЕС АГОРА

**NEW**


ГАРАНТІЯ ПРИБУТКУ ЗА  
ПОСТІЙНОГО РИЗИКУ АТАКИ  
ВОВЧКА СОНЯШНИКОВОГО

## ІДЕНТИФІКАЦІЯ

Група стиглості	Ранній
Тип	Помірно інтенсивний
Висота рослини	150–160 см
Діаметр кошика	22–26 см
Нахил кошика	Напів-припіднятий
Олійність	48–50 %

## ОРІЄНТОВНА КІЛЬКІСТЬ ДНІВ

Сходи – цвітіння	64–66
Сходи – збирання	100–105
Рекомендовані зони вирощування	Степ, Лісостеп

## ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ

- Ранній високий урожай
- Полігенна стійкість до вовчка соняшникового > 7 рас
- Толерантність до нових рас мілдью (НБР)
- Низькорослий, стійкий до вилягання

## ГУСТОТА ПЕРЕД ЗБИРАННЯМ

Для зони недостатнього зволоження	45–55 тис. рослин/га
Для зони достатнього зволоження	55–60 тис. рослин/га

## АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Більша чутливість	Більша стійкість
Енергія початкового росту	8	8
Посухостійкість	8	8
Стійкість до вилягання	8	8
<b>ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО:</b>		
- Фомопсису	7	8
- Склеротиніозу кошика	8	8
- Склеротиніозу стебла	8	8
- Іржі	7	9
- Вертицильозу	9	9
- Несправжньої борошністої роси	9	9

## РЕЗУЛЬТАТИ ВРОЖАЙНОСТІ В 2020 р., ц/га (в перерахунку на 7%)

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ	Білоцерківський район	45,8 ц/га	38,7 ц/га
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ	Новомосковський район	39,7 ц/га	41,3 ц/га
МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ	Кривоозерський район	41,4 ц/га	
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ	Оріхівський район		
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ	Кегичівський район		