

Метобер Пауер® 600 SC

**Досходовий системний гербіцид для захисту посівів
соняшнику, картоплі, сої та кукурудзи**




Метобер Пауер® 600 SC

Діюча речовина:..... Метобромурон 600 г/л
 Препаративна форма: Концентрат суспензії
 Норма витрати: 1,7-3,3 л/га
 Норма робочої рідини: 200-400 л/га

Переваги Метобер Пауер® 600 SC

- Широкий спектр контролю бур'янів, в тому числі амброзії полинолистої, лободи та гірчаків
- Надзвичайно низька фітотоксичність (картоплі, соняшника, сої, кукурудзи та інш.)
- Унікальна властивість реактивації
- Без обмежень у сівозміні
- Можливість застосовувати на піщаних ґрунтах



Спосіб дії

Метобромурон поглинається головним чином кореневою системою бур'янів і транслонується ксилемою до листків. Метобромурон порушує процес фотосинтезу. Діюча речовина зв'язується з певним сайтом у хлоропластах, що призводить до гальмування фотосинтезу. Продукування поживних речовин зупиняється внаслідок утворення високореактивних молекул, які руйнують клітинні мембрани.

Спектр дії

Спектр бур'янів визначено на основі результатів випробувань (на різних культурах, у різних ґрунтово-кліматичних зонах, у різні роки)

Широколисті бур'яни	2,0 л	2,5 л	3,0 л
Амброзія полинолиста	●●●	●●●●	●●●●
Вероніка перська	●●	●●	●●●
Галінсога дрібнокріткова	●●●	●●●	●●●●
Гібіскус трійчастий	●●●	●●●●	●●●●
Гірчак березкоподібний	●●	●●●	●●●
Гірчак звичайний (спориш)	●●●	●●●	●●●●
Гірчак печучийний	●●●	●●●	●●●●
Гірчиця польова	●●●●	●●●●	●●●●
Глуха кропива пурпурова	●●●	●●●●	●●●●
Грицики звичайні	●●●●	●●●●	●●●●
Дурман звичайний	●●●	●●●	●●●
Жовтозілля звичайне	●●●	●●●	●●●
Зірочник середній	●●●●	●●●●	●●●●
Канатник Теофраста	●●	●●●	●●●
Лобода біла	●●●●	●●●●	●●●●
Лобода гібридна	●●●	●●●	●●●●
Лутига розлога	●●●	●●●	●●●●
Нетреба звичайна	●	●●	●●

Осот рожевий	●●●	●●●	●●●
Паслін чорний	●●	●●	●●
Переліска однорічна	●●	●●	●●
Підмаренник чіпкий	●	●●	●●
Портулак городній	●●●	●●●	●●●●
Редька польова	●●●	●●●	●●●
Ріпак, падалиця	●●	●●●	●●●
Ромашка лікарська	●●●	●●●	●●●●
Рутка лікарська	●●	●●●	●●●
Чистець польовий	●●●	●●●	●●●
Щириця звичайна	●●●	●●●	●●●●

Злакові бур'яни	2,0 л	2,5 л	3,0 л
Мишій (види)	●●●	●●●	●●●●
Пальчатка кров'яна	●●	●●	●●
Плоскуха звичайна	●●	●●●	●●●
Просо	●●●	●●●	●●●●
Тонконіг однорічний	●●●●	●●●●	●●●●

●●●● Дуже чутливі (90-100%), ●●● Чутливі (75-89%), ●● Помірно чутливі (51-74%), ● Нечутливі >50 %

Рекомендації щодо використання

Культура	Спектр дії	Фаза внесення	Норма витрати, л/га	
			Мін	Макс
Соняшник	Однорічні дводольні та деякі злакові бур'яни	До появи сходів культури	1,7	3,3
Картопля			1,7	2,5
Кукурудза				
Соя				

Не рекомендується застосовувати, якщо очікуються приморозки



Амброзія полинолиста



Лобода біла



Гірчак звичайний



Ромашка лікарська



Тонконіг однорічний



Гірчиця польова