

Lentagran®

45 WP

Важлива ланка в боротьбі з бур'янами

- Широкий спектр боротьби з бур'янами
- Гарна селективність у багатьох культурах
- Можливість поєднання з іншими діючими речовинами



Lentagran®

45 WP

Діюча речовина:..... Піридат 450 г/кг

Препаративна форма:..... Водорозчинний порошок

Норма витрати:..... 1,0-2,0 кг/га

Норма робочої рідини:..... 200-400 л/га

Лентагран 45® – контактний гербіцид, спрямований на боротьбу з дводольними бур'янами на овочевих культурах.

Лентагран 45® - широкий спектр контролю дводольних бур'янів. Це пов'язано з унікальним механізмом дії діючою речовиною - Піридат. Завдяки цьому ви можете отримати безпрецедентні результати!

Спосіб Дії

- **Контактний гербіцид:** діюча речовина абсорбується листям
- **Інгібітор фотосинтезу:** під час фотосинтезу, транспорт електронів інгібується незворотно
- **Симптоми ураження:** негайне припинення росту, після чого повне відмирання. Листя жовтіє, потім чорніє (процес починається з поверхні листочка)
- **Сприятливі умови:** тепла погода (висока температура й достатня волога) сприятимуть росту бур'янів та ефективності піридату

Спектр дії

Глуха кропива пурпурна	■	Галінсога дрібноквіткова	■
Лобода біла	■	Рутка лікарська	■
Кропива жалка	■	Амброзія полинолиста	■
Нетреба звичайна	■	Зірочник середній	■
Підмаренник чіпкий	■	Гірчак почечуйний	■
Паслін чорний	■	Гірчак березкоподібний	■
Спориш звичайний	■	Ромашка лікарська	■
Гірчак шорсткий	■	Жовтозілля звичайне	■
Пупавка польова	■	Талабан польовий	■
Щириця загнута	■	Хвощ польовий	■
Грицики звичайні	■		

■ Дуже чутливі ■ Помірно чутливі ■ Помірно нечутливі

В переліку вказана незначна частина чутливих бур'янів до Лентаграну 45®



Лобода біла

Галінсога дрібноквіткова

Щириця загнута

Паслін чорний

Рекомендації щодо використання

Культура	Фаза внесення	Норма, л/га
Капуста білокачанна	Через 1-3 тижні після висадки розсади у ґрунт	1,0 - 2,0
Цибуля	від 3-х справжніх листків культури	до 2,0*

* - максимально допустима одноразова доза 0,5 кг/га

Лентагран 45® - це гербіцид, який чудово інтегрується в стратегію боротьби з бур'янами на різних культурах. Якщо рівень засміченості поля дуже великий, рекомендується використовувати збільшену дозу гербіциду Лентагран 45®.

Лентагран 45® застосовують на бур'яни на ранніх стадіях розвитку (на стадії сім'ядолі і до 2-4 справжніх листків).

- на цибулі можна вносити препарат, коли є розвинений восковий шар на культурі (принаймні, через 2 дні після останніх опадів)
- не рекомендується використання, коли вночі температура знижується нижче 2°C, а в день перевищує 25°C
- уникайте застосування препарату перед очікуванням дощу (до 2 годин)
- не рекомендується використання разом із ад'ювантами, добривами та грамініцидами

Світовий досвід застосування Лентагран 45® на наступних культурах:

часник, томати, горох, квасоля, сочевиця, брокколі, спаржа, капуста цвітна, цибуля шалот, цибуля порей



Belchim Crop Protection
Technologielaan 7,
B-1840 Londerzeel
Tel: + 32 (0)52 30 09 06
Fax: + 32 (0)52 30 11 35

Представники в Україні:
Суріс Олександр - +380 (50) 527 44 85
Тітов Олексій - +380 (50) 383 81 93
Штефан Андрій - +380 (66) 703 57 71

www.belchim.ua