

КУКУРУДЗА | СОНЯШНИК | СОРГО

КАТАЛОГ 2023



ЕРІДОН®
СПІВПРАЦЯ, ЯКА ГАРАНТУЄ УСПІХ



think
SOLUTIONS
think **RAGT**

ЄВРОПЕЙСЬКА мультинаціональна компанія

ЄДИНА КОМПАНІЯ, ЩО ВЕДЕ СЕЛЕКЦІЮ 32 ВИДІВ КУЛЬТУР:

КУКУРУДЗА
(7 селекційних програм)

ЗЕРНОВІ ЗЛАКИ
(9 селекційних програм)
Пшениця м'яка
Пшениця тверда
Ячмінь
Тритикале
Овес

ОЛІЙНІ
(5 селекційних програм)
Соняшник
Ріпак

**СОРГО
ЗЕРНОБОБОВІ**
(2 селекційні програми)
Горох
Соя


**39
ПРОГРАМ
ДОСЛІДЖЕННЯ**

КОРМОВІ ТРАВИ
(9 селекційних програм)
Райграс англійський
Райграс італійський
Гібридний райграс
Грястиця збірна
Костриця висока
Кострець
Люцерна посівна
Конюшина червона
Конюшина біла

**СИДЕРАЛЬНІ
КУЛЬТУРИ**
(2 селекційні програми)
Гірчиця
Редька

**ГАЗОННІ
ТРАВИ**
(3 селекційні програми)
Райграс англійський
Костриця висока
Костриця червона

**32
ВИДИ
КУЛЬТУР**



17 НАУКОВО-
ДОСЛІДНИЦЬКИХ
СТАНЦІЙ В ЄВРОПІ

1 - Druelle - F 2 - La Courtade - F 3 - Port de Lanne - F 4 - Montbartier - F
5 - Montours - F 6 - Villampuy - F 7 - Louville - F 8 - Prémèsques - F
9 - Ickleton - GB 10 - Cambridge - GB 11 - Neer - NL 12 - Saerbeck - D
13 - Silstedt - D 14 - Ottmaring - D 15 - Branisovice - CZ 16 - Mezofalva - HU
17 - Dnipro - UA

19 ФІЛІАЛІВ
У СВІТІ

1 - RAGT Semences - F 2 - RAGT Saaten Deutschland - D 3 - RAGT Saaten Österreich - A
4 - RAGT Benelux - B, L, NL 5 - Joordens Zaden - B, L, NL 6 - RAGT Polska - PL
7 - RAGT Vetömag - HU 8 - RAGT Seeds - GB 9 - RAGT Czech - CZ 10 - RAGT Iberica - E
11 - RAGT Nordics - DK, S, N, FIN, LT, EST, LV 12 - RAGT Seminte - RO
13 - RAGT Semences - UA 14 - RAGT Italia - I 15 - Les Gazons de France - F
16 - Seed Force - AUS 17 - Seed Force - NZ 18 - RAGT Argentina - RA
19 - RAGT Beijing Business Management (consulting) - CHN

7 НАСІННЄВИХ
ЗАВОДІВ

1 - Rodez - F 2 - Agen - F 3 - Le Mans - F 4 - Châteaudun - F 5 - Palencia - E
6 - Ickleton - GB 7 - Kessel - NL

100 РОКІВ ІСТОРІЇ

70 років селекції рослин

RAGT Semences завдяки потужній селекції та багатству свого генетичного банку, пропонує сорти і гібриди, що задовольняють 85% європейських фермерів по головних видах культур.

1919

Створення синдикату "Центральна платформа" та "Кооперативу" з питань постачання, збирання, кредитування та страхування.

1951

Початок селекції зернових, фуражних та сої.

2002

RAGT вступає до Biogemma.

2006

Створення RAGT Iberica в Іспанії та RAGT Vetömag в Угорщині. Створення RAGT Nordics в Данії.

2010

Створення RAGT Semences-Україна. RAGT придбала компанію SERASEM – дослідження по зернових (INVIVO).

2020

RAGT Semences придбала Seed Force в Новій Зеландії та Австралії.

1944

Створення RAGT – приватного акціонерного товариства.

1962-2000

40 років співпраці в дослідженнях з Dekalb, 50% RAGT, 50% Dekalb для Європи: кукурудза, соняшник, сорго.

2004

RAGT наслідує зернову діяльність Монсанта (дослідження). Створення RAGT Seeds в Великобританії. Створення RAGT Seeds Benelux у Нідерландах. Створення RAGT Czech у Чеській Республіці.

2009

створення RAGT Seminte в Румунії.

2011

Підписання контрактної угоди в галузі досліджень щодо м'якої пшениці з Bayer CropScience.

2021

RAGT та Bayer підписали угоду щодо створення селекційної програми гібридної пшениці.



КОМПАНІЯ ЕРІДОН

НАДІЙНИЙ ПАРТНЕР RAGT SEMENCES В УКРАЇНІ

Компанія «ЕРІДОН» понад чверть століття сприяє розвитку аграрного потенціалу України, забезпечуючи ефективні технології вирощування для отримання максимальної врожайності та якості сільськогосподарських культур. Основний напрямок діяльності компанії – дистриб'юція широкого спектру насіння польових культур, засобів захисту рослин, біостимуляторів, мінеральних добрив, спеціальних та мікродобрив.



НАДІЙНІСТЬ І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

- Ми успішно працюємо на ринку з 1993 р. та орієнтуємось на довготривалу співпрацю. Наша репутація перевірена часом
- Ми є компанією №1 в Україні з комплексного забезпечення аграрних виробників оборотними засобами для сільського господарства. Це є найкращою демонстрацією нашого професіоналізму та відповідальності



ШИРОКИЙ АСОРТИМЕНТ ТА КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД

- Надзвичайно широкий спектр сертифікованої продукції високої якості
- Ексклюзивні інноваційні пропозиції, наявні лише у нашому асортименті
- Вигідні умови на пакетні пропозиції
- Агроконсультаційний супровід та навчальні програми для клієнтів
- Надання послуг з агротрейдингу
- Постійний пошук нових постачальників з інноваційними продуктами



ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ПОКРИТТЯ ТА ЛОГІСТИКА

- Найбільш розгалужена мережа регіональних підрозділів по всій території України, яка забезпечує максимальну наближеність до агровиробника
- Розвинута логістична інфраструктура з 60 орендованих та власних складських комплексів загальною площею 100 000 м², включаючи 4 (площею 7 500 м²) з регульованою температурою та вологістю, що забезпечує повне збереження якості продукції на шляху від виробника до клієнта
- Власний автопарк налічує 60 автомобілів із різними типами причепів: зерновози, тентовані причепи, автоцистерни для перевезення рідких мінеральних добрив



ЕФЕКТИВНІ ФІНАНСОВІ РІШЕННЯ

- Програми кредитування
- Розрахунок сільгосппродукцією
- Форвардні контракти
- Зернові програми лояльності
- Програма закупівлі товарного соняшнику
- Аграрні розписки
- Авальовані векселі та банківські гарантії




«ЕРІДОН» У ЦИФРАХ:

- 29 років на ринку України
- 11 000 постійних клієнтів
- 32 регіональних підрозділів
- 60 складських комплексів: 37 власних площею 70 000 м² та 23 орендованих – 30 000 м²
- 60 власних вантажних автомобілів
- 950 професіоналів
- 10 нових дистриб'юторських центрів було відкрито за останні роки: Полтава, Чернігів, Луцьк, Суми, Конотоп, Івано-Франківськ, Рівне, Харків, Тернопіль, Кам'янець-Подільський
- 11 агропідприємств із земельним банком 55 000 га

- ЕРІДОН — є ведучим брендом групи компаній ЕРІДОН, в яку також входять ЕРІДОН-ТЕХ, ЕРІДОН-БУД та інші підприємства, що займаються:
- Дистрибуцією і сервісом сільськогосподарської техніки
- Комплексним аграрним інжинірингом
- Рослинництвом (товарна та насіннева продукція)
- Тваринництвом (м'ясний та молочні напрямки)
- Переробкою сільгосппродукції
- Ми впевнені, що лідерство – це не лише обсяг, а й корпоративна відповідальність та бізнес-кодекс,

які формують плідні взаємовідносини та довіру між партнерами шляхом послідовного та якісного виконання зобов'язань для зміцнення майбутнього агропромислового комплексу України.



ДОСЯГАЙМО УСПІХУ РАЗОМ!
ЕРІДОН — ЦЕ КОМПАНІЯ, ЯКА ДОПОМАГАЄ РОСТИ ВАШОМУ БІЗНЕСУ!

КУКУРУДЗА

За підтримки власних 17 дослідних станцій ми змогли поширити нашу гаму гібридів кукурудзи від ФАО 160 до ФАО 600, пристосовану до різних ґрунтово-кліматичних умов: від регіонів з помірним океанічним кліматом до регіонів з більш континентальним кліматом.

Наші гібриди кукурудзи вирізняються швидким стартовим ростом за низької температури, високою стійкістю до хвороб

і вилягання, відмінними показниками віддання вологи зерна під час дозрівання. Гібриди формують стабільний урожай навіть у стресових умовах, маючи дуже високий потенціал, який досягає більш як 150 ц/га сухого зерна.

Селекціонери компанії RAGT Semences постійно працюють над поліпшенням гібридів кукурудзи на зерно й силос. У промисловому напрямі їхню роботу спрямовано на збільшення

виробництва біоенергії, поліпшення кормових показників силосу й збільшення виходу борошна та круп. Селекційна робота вчених RAGT Semences має на меті підвищити адаптації до різних ґрунтово-кліматичних зон, жаро- й посухостійкості, стійкості до стресових умов і гербіцидів.

У цьому каталозі ми запропонуємо вам одні з найкращих гібридів, заadaptовані до ґрунтово-кліматичних зон України.

На сьогоднішній день майже 95% нашої лінійки складають гібриди із програми H₂O Stressless

Крістоф Шен

Керівник та експерт сектору кукурудзи «RAGT Semences»



ЕФЕКТИВНІ ГІБРИДИ КУКУРУДЗИ Stressless H₂O*



Виробляти більше й краще — покликання сучасного сільського господарства. Упродовж багатьох років аграрії, вирощуючи кукурудзу, стикалися з проблемою сухіших і жаркіших кліматичних умов, зокрема на Півдні України, ураховуючи недостатнє забезпечення рослин вологою і добривами. Саме в цьому контексті селекціонери RAGT Semences пропонують фермерам альтернативу, розвиваючи ефективніші гібриди.

Ефективні гібриди кукурудзи й толерантність до стресових умов: нестачі вологи та високих температур.

Нестача вологи й стрес від високих температур — з-поміж причин коливання врожайності кукурудзи. Це стосується всіх зон вирощування кукурудзи, а особливо Півдня України, на ґрунтах з недостатнім запасом вологи або регіональних, найбільш схильних до тривалих періодів посухи.

*Stressless H₂O — стійкість до стресових умов

Дані обмежуючі фактори виробництва вимагають вибору адаптованого гібрида. Компанія «RAGT Semences» пропонує для України гаму гібридів кукурудзи здатних краще переносити критичні стресові стадії нестачі вологи і високих температур.

Гібриди «Stressless H₂O»* відповідають певним критеріям

Цей вибір гібридів — результат співпраці між дослідним центром RAGT Semences (автор генетичного матеріалу) та відділом технічного розвитку, що перевіряє поведінку гібридів у великих масштабах (тести на полях у виробничих умовах).

Генетика: гібрид має генетичну схильність до посушливих умов (адаптовані батьківські лінії).

Продуктивність, як в оптимальних, так і в стресових умовах: гібрид повинен бути, ефективним у зоні достатнього і недостатнього зволоження.

Ефективність в посушливих умовах: гібрид повинен зберігати високий потенціал і регулярність у стресових умовах.

Конкурентоспроможність в порівнянні зі стандартами ринку: гібрид повинен володіти кращим потенціалом порівняно з гібридами найбільш поширеними в даній групі стиглості.

Стабільність при різних умовах!

*Stressless H₂O — стійкість до стресових умов.

Гібрид	ФАО	Тип зерна	Психостійкість (1-9)	Холодостійкість (1-9)	Вологовіддача (1-9)	Початкові темпи росту (1-9)	Вирощування в монокультурі (1-9)	Вирощування по мінімальному обробітку грунту (1-9)
РЖТ АЯКС	210	кременисто-зубовидний	9	7	7	7	7	8
РЖТ АЛІККС	220	кременисто-зубовидний	9	7	9	8	9	9
РЖТ МАКСАЛІА	250	зубовидний	9	8	9	7	7	8
РЖТ МАКСАТАК	250	кременисто-зубовидний	8	9	9	9	9	9
РЖТ ХРОМІККС	250	кременисто-зубовидний	9	7	9	7	8	8
РЖТ ЕККСЛАМ	270	зубовидний	9	8	8	8	9	9
РЖТ ЛІПЕККС	290	зубовидний	9	8	9	8	9	9
РЖТ МОТОРІККС	290	зубовидний	9	8	9	8	8	9
РЖТ ЕККСАКТ	300	зубовидний	8	9	8	9	8	9
РЖТ ІНЕДІККС	320	зубовидний	9	8	8	9	9	9
РЖТ ДУБЛІККС	320	зубовидний	7	8	9	9	7	7
РЖТ ГІМАЛАЯККС	330	зубовидний	8	8	8	8	8	8
РЖТ ЗАНЕТІККС	340	зубовидний	9	9	9	8	9	9
РЖТ ВІНККС	360	зубовидний	8	8	7	8	8	8
РЖТ ГЕККСАГОН	370	зубовидний	9	8	8	8	9	9
РЖТ НОЕМІККС	380	зубовидний	8	8	8	8	8	8
РЖТ ЛЕККСТУР	420	зубовидний	9	9	8	8	9	9

КУКУРУДЗА




ТИП ЗЕРНА: кременисто-зубовидний

Використання: зерно
Висота рослини: нижча за середню

РЖТ АЯКС

ФАО 210

- Гібрид перевірений часом та нашими ґрунтово-кліматичними умовами
- Раннє досягання, у поєднанні з високою посухостійкістю, забезпечує стабільно високий урожай у різних ґрунтово-кліматичних умовах
- Висока пластичність до різних технологій вирощування і обробітку ґрунту та висока стійкість до вилягання гарантують повну реалізацію потенціалу гібриду



ВИСОКА
ПОСУХОСТІЙКІСТЬ



МІЦНЕ СТЕБЛО ТА
КОРЕНЕВА СИСТЕМА



ВИСОКОТОЛЕРАНТНИЙ
ДО ФУЗАРІОЗУ СТЕБЛА
І ПОЧАТКА



Агрономічні характеристики, [1-9]:

Посухостійкість залежить від H₂O	9
Вологовіддача	7
Початкові темпи росту	7
Холодостійкість	7
Стійкість до фузаріозу	8



Рекомендації до вирощування, [1-9]:

Монокультура	7
Мінімальний обробіток ґрунту	8
Нульовий обробіток ґрунту	8
Придатність до пізнього збирання	9
Рівень мінерального живлення	8




Рекомендована густота рослин/га на момент збирання:

Зона достатнього зволоження	75-80 тис
Зона середнього зволоження	70-75 тис
Зона недостатнього зволоження	65-70 тис
Зона посухи	45-55 тис



Рекомендовані терміни посіву



оптимальний
оптимально пізній

КУКУРУДЗА



ТИП ЗЕРНА: кременисто-зубовидний

Використання: зерно, крупа
Висота рослини: середня

РЖТ АЛІККС

ФАО 220



- Новинка у ранній групі з потужними основними характеристиками
- Висока стійкість до вилягання, посухи та хвороб – формує прекрасний фундамент для вирощування у монокультурі та за різного виду обробітку ґрунту
- Високоурожайний та стабільний гібрид з швидкою вологовіддачею



ВИСОКА
ПОСУХОСТІЙКІСТЬ



ШВИДКА
ВОЛОГОВІДДАЧА



ПЛАСТИЧНИЙ ДО УМОВ
ВИРОЩУВАННЯ



Агрономічні характеристики, [1-9]:

Посуhostійкість	9
Вологовіддача	9
Початкові темпи росту	8
Холодостійкість	7
Стійкість до фузаріозу	8



Рекомендації до вирощування, [1-9]:

Монокультура	9
Мінімальний обробіток ґрунту	9
Нульовий обробіток ґрунту	9
Придатність до пізнього збирання	9
Рівень мінерального живлення	7




Рекомендована густота рослин/га на момент збирання:

Зона достатнього зволоження	75-80 тис
Зона середнього зволоження	70-75 тис
Зона недостатнього зволоження	65-70 тис
Зона посухи	45-55 тис



Рекомендовані терміни посіву



оптимальний
оптимально пізній

КУКУРУДЗА



ТИП ЗЕРНА: кременисто-зубовидний

Використання: зерно, крупа
Висота рослини: нижча за середню

РЖТ ХРОМІККС

ФАО 250

- Чудова пластичність до умов вирощування та широкий ареал вирощування
- Висока стабільність та результативність в зоні посухи
- Висока стійкість до вилягання та компактні розміри забезпечують високу результативність в різних кліматичних зонах



ВИСОКА
ПОСУХОСТІЙКІСТЬ



ШВИДКА
ВОЛОГОВІДДАЧА



МІЦНЕ СТЕБЛО ТА
КОРЕНЕВА СИСТЕМА



Агрономічні характеристики, [1-9]:

Посухостійкість залежність від H₂O	9
Вологовіддача	9
Початкові темпи росту	7
Холодостійкість	7
Стійкість до фузаріозу	8



Рекомендації до вирощування, [1-9]:

Монокультура	8
Мінімальний обробіток ґрунту	8
Нульовий обробіток ґрунту	7
Придатність до пізнього збирання	9
Рівень мінерального живлення	7




Рекомендована густота рослин/га на момент збирання:

Зона достатнього зволоження	70-75 тис
Зона середнього зволоження	65-75 тис
Зона недостатнього зволоження	65-70 тис
Зона посухи	45-55 тис



Рекомендовані терміни посіву



оптимальний
оптимально пізній

КУКУРУДЗА



ТИП ЗЕРНА: кремнисто-зубовидний

Використання: зерно, крупа
Висота рослини: нижча за середню

РЖТ МАККСАТАК

ФАО 250

- Новий лідер у своїй групі серед кремнисто-зубовидних гібридів!
- Гібрид об'єднує в собі всі найголовніші агрономічні характеристики, що дає можливість досягнути найвищих результатів!
- Швидкі темпи стартового росту та висока холодостійкість забезпечують формування високого потенціалу!



ВИСОКА
ХОЛОДОСТІЙКІСТЬ



ШВИДКА
ВОЛОГОВІДДАЧА



ШВИДКИЙ СТАРТОВИЙ
РІСТ



Агрономічні характеристики, (1-9):

Посухостійкість залежність від H₂O	8
Вологовіддача	9
Початкові темпи росту	9
Холодостійкість	9
Стійкість до фузаріозу	8



Рекомендації до вирощування, (1-9):

Монокультура	9
Мінімальний обробіток ґрунту	9
Нульовий обробіток ґрунту	7
Придатність до пізнього збирання	8
Рівень мінерального живлення	9




Рекомендована густота рослин/га на момент збирання:

Зона достатнього зволоження	75-80 тис
Зона середнього зволоження	70-75 тис
Зона недостатнього зволоження	65-70 тис
Зона посухи	-



Рекомендовані терміни посіву



оптимально ранній
оптимальний
оптимально пізній

КУКУРУДЗА



ТИП ЗЕРНА: зубовидний

Використання: зерно
Висота рослини: нижча за середню

РЖТ МАККСАЛІЯ

ФАО 250

- Гібрид перевірений часом та нашими ґрунтово-кліматичними умовами
- Посухостійкість, зубовидність, швидка вологовіддача зробили гібрид лідером у зонах від достатнього зволоження до посухи
- Надзвичайно пластичний до технологій вирощування та ґрунтів, а раннє ФАО допомагає краще подолати критичні періоди під час вегетації



ВИСОКА
ПОСУХОСТІЙКІСТЬ



ШВИДКА
ВОЛОГОВІДДАЧА



ПЛАСТИЧНИЙ ДО УМОВ
ВИРОЩУВАННЯ



Агрономічні характеристики, [1-9]:

Посухостійкість залежить від Н₂O	9
Вологовіддача	9
Початкові темпи росту	7
Холодостійкість	8
Стійкість до фузаріозу	7



Рекомендації до вирощування, [1-9]:

Монокультура	7
Мінімальний обробіток ґрунту	8
Нульовий обробіток ґрунту	8
Придатність до пізнього збирання	8
Рівень мінерального живлення	8




Рекомендована густота рослин/га на момент збирання:


Зона достатнього зволоження	70-75 тис
Зона середнього зволоження	65-70 тис
Зона недостатнього зволоження	65-70 тис
Зона посухи	45-55 тис



Рекомендовані терміни посіву



оптимальний
оптимально пізній



«Вирощуємо РЖТ МАККСАЛІЯ вже третій рік поспіль на великих площах (біля 500 га). Гібрид надзвичайно пластичний до технологій вирощування та ґрунтів, швидка вологовіддача, завжди стабільно високий урожай.»

Дзюба Юрій Васильович,
головний агроном кластеру
«Антоніни», ТОВ «Епіцентр Агро»
Хмельницька обл., Хмельницький р-н

КУКУРУДЗА



ТИП ЗЕРНА: зубовидний

Використання: зерно
Висота рослини: середня

РЖТ ЕККСЛАМ

ФАО 270

- Високоадаптований до всіх зон вирощування кукурудзи
- Об'єднуючи високу посухостійкість і швидкі початкові темпи росту демонструє високий результат урожайності в різних умовах
- Добре адаптований до вирощування в монокультурі та різних видів обробітку ґрунту



ВИСОКА
ПОСУХОСТІЙКІСТЬ



ПЛАСТИЧНИЙ ДО УМОВ
ВИРОЩУВАННЯ



МІЦНЕ СТЕБЛО ТА
КОРЕНЕВА СИСТЕМА



Агрономічні характеристики, [1-9]:

Посухостійкість	9
Вологовіддача	8
Початкові темпи росту	8
Холодостійкість	8
Стійкість до фузаріозу	8



Рекомендації до вирощування, [1-9]:

Монокультура	9
Мінімальний обробіток ґрунту	9
Нульовий обробіток ґрунту	9
Придатність до пізнього збирання	9
Рівень мінерального живлення	7




Рекомендована густота рослин/га на момент збирання:

Зона достатнього зволоження	75-80 тис
Зона середнього зволоження	70-75 тис
Зона недостатнього зволоження	65-70 тис
Зона посухи	45-55 тис



Рекомендовані терміни посіву



оптимально ранній
оптимальний
оптимально пізній

2021 - **127 ц/га** (51 ГА)
СТОВ "Вербів"
Бережанський р-н

2021 - **127 ц/га** (100 ГА)
ПП "Качан 07"
Козівський р-н

2021 - **122 ц/га** (30 ГА)
ФГ "Курила"
Теребовлянський р-н

2021 - **144 ц/га** (20 ГА)
СФГ "Лілея"
Теребовлянський р-н

2021 - **145 ц/га** (20 ГА)
СФГ "Носко"
Теребовлянський р-н

2021 - **126 ц/га** (100 ГА)
СТОВ "Юстинівське"
Підгаєцький р-н

2021 - **112 ц/га** (ДЕМО)
ФГ "Захід-Птиця"
Пустомитівський р-н

2021 - **111 ц/га** (70 ГА)
ТОВ "Штерн Агро"
Тлумецький р-н

2021 - **118 ц/га** (40 ГА)
ТОВ "Берестівець"
Уманський р-н

2021 - **100 ц/га** (70 ГА)
СТОВ "Світанок"
Чорнобаївський р-н

2021 - **122 ц/га** (40 ГА)
СТОВ "Степ"
Монастирищенський р-н

2021 - **111 ц/га** (60 ГА)
СТОВ "Степ-2000"
Уманський р-н

2021 - **115 ц/га** (80 ГА)
ТОВ "Агромір-Кор"
Володимирецький р-н

2021 - **107 ц/га** (130 ГА)
ПрАТ "Мізоцьке РТП"
Здолбунівський р-н

2021 - **118 ц/га** (30 ГА)
ФГ "Млинівська Чайка"
Млинівський р-н

2021 - **108 ц/га** (ДЕМО)
ПП "Імпак"
Андрушівський р-н

2021 - **117 ц/га** (ДЕМО)
ПП "Климчук"
Бердичівський р-н

2021 - **126 ц/га** (ДЕМО)
ТОВ "Сігнет Центр"
Попільнянський р-н

2021 - **110 ц/га** (50 ГА)
ПП "Камінське"
Кролевецький р-н

2021 - **103 ц/га** (600 ГА)
ТОВ "Контакт Плюс"
Шосткинський р-н

2021 - **103 ц/га** (200 ГА)
ПСП "Соснівська"
Конотопський р-н

2021 - **127 ц/га** (40 ГА)
ФГ "Андрущенко І.І."
Миронівський р-н

2021 - **125 ц/га** (100 ГА)
ТОВ "Ван Хоф Юкрейн ЛТД"
Згурівський р-н

2021 - **118 ц/га** (30 ГА)
ТОВ "Нашашка"
Рокитнянський р-н

2021 - **110 ц/га** (169 ГА)
ТОВ "ТАК Агро"
Тетіївський р-н

2021 - **109 ц/га** (300 ГА)
ТОВ "АПК Магнат"
Ніжинський р-н

2021 - **93 ц/га** (300 ГА)
СФГ "Крокус"
Ріпкинський р-н

2021 - **104 ц/га** (ДЕМО)
СФГ "Перлина"
Лубенський р-н

2021 - **112 ц/га** (ДЕМО)
ФГ "Золотий Колос"
Могилів-Подільський р-н

2021 - **119 ц/га** (ДЕМО)
СТОВ "Левківське"
Погребищенський р-н

2021 - **107 ц/га** (20 ГА)
ФГ "Поліщука"
Погребищенський р-н

2021 - **116 ц/га** (30 ГА)
ТОВ "Райфайзен Агро"
Іллінецький р-н


2021 - **111 ц/га** (ДЕМО)
ТОВ "Рубанський АФ"
Мурованокуриловецький р-н

2021 - **121 ц/га** (50 ГА)
ФГ "Династія"
Старокостянтинівський р-н

2021 - **108 ц/га** (650 ГА)
ТОВ "Епіцентр Агро"
Красилівський р-н

2021 - **95 ц/га** (ДЕМО)
ТОВ "Агро-Овен"
Магдалинівський р-н

2021 - **107 ц/га** (200 ГА)
ТОВ "Степ Агро"
Новоукраїнський р-н



«РЖТ ЕККСКЛАМ вирощуємо в товарних посівах вже третій рік поспіль. Дуже задоволені результатом урожайності 2021 року, який склав понад 100 ц/га на великій площі біля 600 га. Тому в сезоні 2022 РЖТ ЕККСКЛАМ знову займає велику частину в структурі посівних площ кукурудзи. Гібрид пластичний до умов вирощування, має високу посухостійкість і вологовіддачу.»



Синегуб Віктор Михайлович,
головний агроном
ТОВ «Контакт Плюс», Сумська обл.,
Шосткинський р-н

КУКУРУДЗА



ТИП ЗЕРНА: зубовидний

Використання: зерно
Висота рослини: середня

РЖТ ЛІПЕККС



ФАО 290

- Наш бестселер! Чудове поєднання стійкості до несприятливих погодніх умов та пластичності до вирощування в різних ґрунтово-кліматичних умовах
- Стійкість до вилягання, в поєднанні з високою толерантністю до фузаріозу стебла і початку, є основою для високого результату за різних технологій посіву і вирощування
- Надзвичайно стабільний і високоврожайний гібрид перевірений роками вирощування у всіх регіонах кукурудзяного поясу



ВИСОКА
ПОСУХОСТІЙКІСТЬ



ШВИДКА
ВОЛОГОВІДДАЧА



ПЛАСТИЧНИЙ ДО УМОВ
ВИРОЩУВАННЯ



Агрономічні характеристики, [1-9]:

Посухостійкість	9
Вологовіддача	9
Початкові темпи росту	8
Холодостійкість	8
Стійкість до фузаріозу	9



Рекомендації до вирощування, [1-9]:


Монокультура	9
Мінімальний обробіток ґрунту	9
Нульовий обробіток ґрунту	9
Придатність до пізнього збирання	9
Рівень мінерального живлення	7




Рекомендована густота рослин/га на момент збирання:

Зона достатнього зволоження	70-75 тис
Зона середнього зволоження	65-70 тис
Зона недостатнього зволоження	60-65 тис
Зона посухи	45-55 тис

Рекомендовані терміни посіву



оптимально ранній
оптимальний
оптимально пізній



Касяненко Валерій Миколайович,
керівник відділення
ТОВ «ТАК Агро»
Київська обл., Тетіївський р-н

«РЖТ ЛІПЕККС маємо в товарних посівах вже третій сезон. В 2021 році на площі понад 500 га отримали урожайність 132,7 ц/га – це найкращий показник на великих масивах. Гібрид сподобався високою посухостійкістю та доброю пластичністю до вирощування в різних ґрунтово-кліматичних умовах.»

КУКУРУДЗА



ТИП ЗЕРНА: зубовидний

Використання: зерно
Висота рослини: середня

РЖТ МОТОРІККС

ФАО 290

- **Новий лідер у зоні посухи!** Наш новий стандарт посухостійкості та стабільності у важких умовах сьогодення
- **Швидка вологовіддача і початкові темпи росту** в поєднанні з високою регулярністю початків в несприятливих умовах формують надійний фундамент реалізації потенціалу
- **Дуже комфортна висота рослини, міцне стебло та коренева система** гарантують ефективне вирощування при різних технологіях посіву і живлення



ВИСОКА
ПОСУХОСТІЙКІСТЬ



ШВИДКА
ВОЛОГОВІДДАЧА



ПЛАСТИЧНИЙ ДО УМОВ
ВИРОЩУВАННЯ



Агрономічні характеристики, [1-9]:

Посухостійкість	9
Вологовіддача	9
Початкові темпи росту	8
Холодостійкість	8
Стійкість до фузаріозу	8



Рекомендації до вирощування, [1-9]:

Монокультура	8
Мінімальний обробіток ґрунту	9
Нульовий обробіток ґрунту	9
Придатність до пізнього збирання	8
Рівень мінерального живлення	7




Рекомендована густота рослин/га на момент збирання:

Зона достатнього зволоження	70-75 тис
Зона середнього зволоження	65-70 тис
Зона недостатнього зволоження	60-65 тис
Зона посухи	45-55 тис



Рекомендовані терміни посіву



оптимальний
оптимально пізній

КУКУРУДЗА



ТИП ЗЕРНА: зубовидний

Використання: зерно
Висота рослини: вища за середню

РЖТ ЕККЗАКТ



ФАО 300

- Наш новий лідер у зоні достатнього та середнього зволоження з високим потенціалом урожайності та прекрасною реакцією на інтенсивну технологію вирощування
- Висока холодостійкість і швидкі темпи стартового росту в поєднанні з доброю посухостійкістю дають можливість повністю реалізувати потенціал урожайності
- Поєднує в собі всі необхідні характеристики для досягнення найвищих результатів урожайності



ВИСОКА
ХОЛОДОСТІЙКІСТЬ



ШВИДКИЙ СТАРТОВИЙ
РІСТ



ВИСОКОІНТЕНСИВНИЙ



Агрономічні характеристики, (1-9):

Посухостійкість залежить від H₂O	8
Вологовіддача	8
Початкові темпи росту	9
Холодостійкість	9
Стійкість до фузаріозу	8



Рекомендації до вирощування, (1-9):

Монокультура	8
Мінімальний обробіток ґрунту	9
Нульовий обробіток ґрунту	9
Придатність до пізнього збирання	8
Рівень мінерального живлення	9




Рекомендована густота рослин/га на момент збирання:

Зона достатнього зволоження	75-80 тис
Зона середнього зволоження	70-75 тис
Зона недостатнього зволоження	65-70 тис
Зона посухи	-



Рекомендовані терміни посіву



оптимально ранній
оптимальний
оптимально пізній



think
PERFORMANCE
think **RAGT**

КУКУРУДЗА



ТИП ЗЕРНА: зубовидний

Використання: зерно
Висота рослини: вища за середню

РЖТ ДУБЛІККС

ФАО 320

- Чудовий баланс ФАО, інтенсивності та швидкої вологовіддачі
- Швидкі темпи стартового росту допомагають комфортно подолати виклики погоди на початкових етапах розвитку
- Розкриває високий потенціал продуктивності за інтенсивної технології вирощування



ШВИДКИЙ СТАРТОВИЙ
РІСТ



ШВИДКА
ВОЛОГОВІДДАЧА



ВИСОКОІНТЕНСИВНИЙ



Агрономічні характеристики, [1-9]:

Посухостійкість залежність від H₂O	7
Вологовіддача	9
Початкові темпи росту	9
Холодостійкість	8
Стійкість до фузаріозу	7



Рекомендації до вирощування, [1-9]:


Монокультура	7
Мінімальний обробіток ґрунту	7
Нульовий обробіток ґрунту	8
Придатність до пізнього збирання	7
Рівень мінерального живлення	9



Рекомендована густота рослин/га на момент збирання:

Зона достатнього зволоження	70-75 тис
Зона середнього зволоження	65-70 тис
Зона недостатнього зволоження	60-65 тис
Зона посухи	45-55 тис

Рекомендовані терміни посіву



оптимально ранній
оптимальний
оптимально пізній

КУКУРУДЗА



ТИП ЗЕРНА: зубовидний

Використання: зерно
Висота рослини: середня

РЖТ ІНЕДІККС

ФАО 320



- Лідер у своїй групі ФАО за рахунок високої посухостійкості та швидким темпам стартового росту
- Пластичний та стабільний гібрид у найважчих умовах з прекрасним збереженням регулярності
- Високоадаптивний до різних технологій посіву та вирощування



ШВИДКИЙ СТАРТОВИЙ
РІСТ



ВИСОКА
ПОСУХОСТІЙКІСТЬ



ПЛАСТИЧНИЙ ДО УМОВ
ВИРОЩУВАННЯ



Агрономічні характеристики, [1-9]:

Посухостійкість	9
Вологовіддача	8
Початкові темпи росту	9
Холодостійкість	8
Стійкість до фузаріозу	8



Рекомендації до вирощування, [1-9]:

Монокультура	9
Мінімальний обробіток ґрунту	9
Нульовий обробіток ґрунту	9
Придатність до пізнього збирання	8
Рівень мінерального живлення	8




Рекомендована густина рослин/га на момент збирання:

Зона достатнього зволоження	70-75 тис
Зона середнього зволоження	65-70 тис
Зона недостатнього зволоження	60-65 тис
Зона посухи	45-55 тис



Рекомендовані терміни посіву



оптимально ранній
оптимальний
оптимально пізній

2021 - **137 ц/га** (ДЕМО)
ПП "Агрофірма Дзвони"
Перемишлянський р-н

2021 - **111 ц/га** (ДЕМО)
ПП "Агрофірма Лугове"
Бродівський р-н

2021 - **113 ц/га** (ДЕМО)
ФГ "Захід-Птиця"
Пустомитівський р-н

2021 - **106 ц/га** (140 ГА)
ФГ "Коровай"
Мостиський р-н

2021 - **121 ц/га** (30 ГА)
ТОВ "Перв'ятичі-Агроком"
Сокальський р-н

2021 - **109 ц/га** (160 ГА)
СТОВ "Авангард"
Борзнянський р-н

2021 - **133 ц/га** (ДЕМО)
ТОВ "Агродім"
Бахмацький р-н

2021 - **109 ц/га** (400 ГА)
ТОВ "АПК Магнат"
Ніжинський р-н

2021 - **119 ц/га** (ДЕМО)
ТОВ "Сігнет Центр"
Попільнянський р-н

2021 - **116 ц/га** (126 ГА)
ТОВ "Ічнянське"
Ічнянський р-н

2021 - **105 ц/га** (300 ГА)
ТОВ "Плиски-Агро"
Борзнянський р-н

2021 - **123 ц/га** (10 ГА)
СФГ "Світанок"
Прилуцький р-н

2021 - **105 ц/га** (ДЕМО)
ТОВ "Батьківщина"
Конотопський р-н

2021 - **124 ц/га** (31 ГА)
ПП "Камінське"
Кролевецький р-н

2021 - **115 ц/га** (200 ГА)
ТОВ "Контакт Плюс"
Шосткинський р-н

2021 - **131 ц/га** (100 ГА)
ПСП "Соснівська"
Конотопський р-н

2021 - **99 ц/га** (100 ГА)
ТОВ "Степ Агро"
Новоукраїнський р-н

2021 - **120 ц/га** (ДЕМО)
ТОВ "Білоцерківська АФ"
Білоцерківський р-н

2021 - **121 ц/га** (ДЕМО)
ТОВ "Інтерагроінвест"
Ставищенський р-н

2021 - **121 ц/га** (ДЕМО)
ПП "Каштан АФ"
Васильківський р-н

2021 - **121 ц/га** (ДЕМО)
ТОВ "Насташка"
Рокитнянський р-н

2021 - **107 ц/га** (20 ГА)
ФГ "Родина 2007"
Згурівський р-н

2021 - **117 ц/га** (50 ГА)
ТОВ "ФК ЛТД"
Володарський р-н

2021 - **123 ц/га** (150 ГА)
ПСП "Агрофірма Горинь"
Лановецький р-н

2021 - **147 ц/га** (ДЕМО)
ПОП "Аркадія"
Гусятинський р-н

2021 - **128 ц/га** (100 ГА)
СТОВ "Верів"
Бережанський р-н

2021 - **140 ц/га** (65 ГА)
ПАП "Дзвін"
Чортківський р-н

2021 - **147 ц/га** (ДЕМО)
ТОВ "Калина Фармінг"
Чортківський р-н

2021 - **127 ц/га** (150 ГА)
ПП "Качан 07"
Козівський р-н

2021 - **112 ц/га** (176 ГА)
ТОВ "Україна"
Підволочиський р-н

2021 - **132 ц/га** (ДЕМО)
ТОВ "Агробуд"
Оратівський р-н

2021 - **128 ц/га** (ДЕМО)
ТОВ "Вінницька
Агропромислова Група"
Вінницький р-н

2021 - **148 ц/га** (ДЕМО)
ФГ "Золотий Колос"
Могилів-Подільський р-н

2021 - **133 ц/га** (ДЕМО)
ТОВ "Кусто Агро"
Вінницький р-н

2021 - **116 ц/га** (200 ГА)
ФГ "Україна"
Липовецький р-н

2021 - **127 ц/га** (35 ГА)
СТОВ "Хлібороб"
Шаргородський р-н

2021 - **147 ц/га** (ДЕМО)
ПСП "Аскольд Агро"
Жашківський р-н


2021 - **140 ц/га** (ДЕМО)
ТОВ "Березино"
Жашківський р-н

2021 - **105 ц/га** (125 ГА)
СТОВ "Дніпро"
Чорнобаївський р-н

2021 - **138 ц/га** (5 ГА)
СТОВ "Злагода"
Звенигородський р-н

2021 - **150 ц/га** (ДЕМО)
ТОВ "НВФ Урожай"
Черкаський р-н

2021 - **115 ц/га** (50 ГА)
СТОВ "Світанок"
Чорнобаївський р-н



«Гібрид РЖТ ІНЕДІККС вирощуємо другий рік поспіль. В 2021 році ми отримали рекордний урожай в товарних посівах – 140 ц/га, після чого було прийнято рішення збільшити площу на сезон 2022 посіву РЖТ ІНЕДІККС до 350 га. Гібрид сподобався доброю регулярністю та високим потенціалом урожайності.»

Коринецький Богдан Іосипович,
агроном
ПАП «Дзвін»
Тернопільська обл., Чортківський р-н



КУКУРУДЗА




ТИП ЗЕРНА: зубовидний

Використання: зерно
Висота рослини: середня

РЖТ ГІМАЛАЯККС

ФАО 330

- Добре адаптований до різних умов вирощування та інтенсивної технології
- Висока збалансованість основних агро-технічних характеристик гарантує повну реалізацію потенціалу
- Розкриває високий потенціал продуктивності за інтенсивної технології вирощування



ВИСОКА
ПОСУХОСТІЙКІСТЬ



ШВИДКИЙ СТАРТОВИЙ
РІСТ



ВИСОКОІНТЕНСИВНИЙ



Агрономічні характеристики, [1-9]:

Посуhostійкість	8
Вологовіддача	8
Початкові темпи росту	8
Холодостійкість	8
Стійкість до фузаріозу	8



Рекомендації до вирощування, [1-9]:

Монокультура	8
Мінімальний обробіток ґрунту	8
Нульовий обробіток ґрунту	8
Придатність до пізнього збирання	7
Рівень мінерального живлення	9




Рекомендована густота рослин/га на момент збирання:

Зона достатнього зволоження	65-70 тис
Зона середнього зволоження	60-65 тис
Зона недостатнього зволоження	60-65 тис
Зона посухи	45-55 тис



Рекомендовані терміни посіву



оптимальний
оптимально пізній

КУКУРУДЗА



ТИП ЗЕРНА: зубовидний

Використання: зерно
Висота рослини: середня

РЖТ ЗАНЕТІККС

ЛІДЕР З ПРОДАЖУ

ФАО 340

- Наш новий стандарт у холодостійкості та стабільності у складних умовах вирощування сьогодні
- Лідер у своїй групі ФАО за рахунок адаптованості та пластичності до умов вирощування, посухостійкості та високому потенціалу урожайності
- Має швидку вологовіддачу та стабільно високі результати урожайності



ВИСОКА
ХОЛОДОСТІЙКІСТЬ



ШВИДКА
ВОЛОГОВІДДАЧА



ВИСОКА
ПОСУХОСТІЙКІСТЬ



Агрономічні характеристики, (1-9):

Посухостійкість	9
Вологовіддача	9
Початкові темпи росту	8
Холодостійкість	9
Стійкість до фузаріозу	9



Рекомендації до вирощування, (1-9):

Монокультура	9
Мінімальний обробіток ґрунту	9
Нульовий обробіток ґрунту	9
Придатність до пізнього збирання	9
Рівень мінерального живлення	7




Рекомендована густота рослин/га на момент збирання:

Зона достатнього зволоження	70-75 тис
Зона середнього зволоження	65-70 тис
Зона недостатнього зволоження	60-65 тис
Зона посухи	45-55 тис



Рекомендовані терміни посіву



оптимально ранній
оптимальний
оптимально пізній

КУКУРУДЗА



ТИП ЗЕРНА: зубовидний

Використання: зерно
Висота рослини: середня

РЖТ ВІНККС



ФАО 360

- Висока збалансованість основних агро-технічних характеристик гарантує повну реалізацію потенціалу
- Гібрид перевірений часом та нашими ґрунтово-кліматичними умовами
- Чудово адаптується до зменшення азотного живлення та за рахунок високої посухостійкості є прекрасним гібридом для напівінтенсивних технологій вирощування



ВИСОКА
ПОСУХОСТІЙКІСТЬ



ШВИДКИЙ СТАРТОВИЙ
РІСТ



ПЛАСТИЧНИЙ ДО УМОВ
ВИРОЩУВАННЯ



Агрономічні характеристики, [1-9]:

Посухостійкість stress tolerance H ₂ O	8
Вологовіддача	7
Початкові темпи росту	8
Холодостійкість	8
Стійкість до фузаріозу	8



Рекомендації до вирощування, [1-9]:

Монокультура	8
Мінімальний обробіток ґрунту	8
Нульовий обробіток ґрунту	8
Придатність до пізнього збирання	8
Рівень мінерального живлення	7




Рекомендована густота рослин/га на момент збирання:

Зона достатнього зволоження	65-70 тис
Зона середнього зволоження	60-65 тис
Зона недостатнього зволоження	60-65 тис
Зона посухи	45-55 тис



Рекомендовані терміни посіву



оптимальний
оптимально пізній

КУКУРУДЗА



ТИП ЗЕРНА: зубовидний

Використання: зерно
Висота рослини: середня

РЖТ ГЕККСАГОН

ФАО 370

- Лідер у своїй групі ФАО за рахунок високої посухостійкості та пластичності
- Високоадаптивний до різних технологій посіву та вирощування
- Чудово справляється з викликами природи на завершальних етапах вегетації



ВИСОКА
ПОСУХОСТІЙКІСТЬ



ВИСОКОІНТЕНСИВНИЙ



МІЦНЕ СТЕБЛО ТА
КОРЕНЕВА СИСТЕМА



Агрономічні характеристики, (1-9):

Посухостійкість залежить від Н₂O	9
Вологовіддача	8
Початкові темпи росту	8
Холодостійкість	8
Стійкість до фузаріозу	9



Рекомендації до вирощування, (1-9):

Монокультура	9
Мінімальний обробіток ґрунту	9
Нульовий обробіток ґрунту	9
Придатність до пізнього збирання	9
Рівень мінерального живлення	9




Рекомендована густота рослин/га на момент збирання:

Зона достатнього зволоження	70-75 тис
Зона середнього зволоження	65-70 тис
Зона недостатнього зволоження	60-65 тис
Зона посухи	45-55 тис



Рекомендовані терміни посіву



оптимально ранній
оптимальний
оптимально пізній

КУКУРУДЗА



ТИП ЗЕРНА: зубовидний

Використання: зерно
Висота рослини: середня




РЖТ НОЕМІККС

ФАО 380

- Швидкий стартовий ріст та добра посухостійкість гарантують високий результат у зоні недостатнього зволоження
- Високоадаптивний до різних технологій посіву та вирощування
- Висока толерантність до хвороб стебла і початку, стабільність у зоні недостатнього зволоження



ШВИДКИЙ СТАРТОВИЙ
РІСТ



ВИСОКОТОЛЕРАНТНИЙ
ДО ФУЗАРІОЗУ СТЕБЛА
І ПОЧАТКУ



ПЛАСТИЧНИЙ ДО УМОВ
ВИРОЩУВАННЯ



Агрономічні характеристики, [1-9]:

Посухостійкість stress tolerance H ₂ O	8
Вологовіддача	8
Початкові темпи росту	8
Холодостійкість	8
Стієкість до фузаріозу	8



Рекомендації до вирощування, [1-9]:


Монокультура	8
Мінімальний обробіток ґрунту	8
Нульовий обробіток ґрунту	8
Придатність до пізнього збирання	8
Рівень мінерального живлення	8



Рекомендована густота рослин/га на момент збирання:

Зона достатнього зволоження	70-75 тис
Зона середнього зволоження	65-70 тис
Зона недостатнього зволоження	60-65 тис
Зона посухи	45-55 тис

Рекомендовані терміни посіву



оптимальний
оптимально пізній

КУКУРУДЗА



ТИП ЗЕРНА: зубовидний

Використання: зерно
Висота рослини: середня

РЖТ ЛЕККСТУР



ФАО 420

- Лідер у своїй групі ФАО за рахунок основних агротехнічних характеристик
- Висока посухостійкість та холодостійкість гарантують високий результат у зоні посухи
- Гібрид перевірений часом та кліматом, демонструє надзвичайно високі результати у всіх регіонах вирощування кукурудзи



ВИСОКА
ХОЛОДОСТІЙКІСТЬ



ВИСОКА
ПОСУХОСТІЙКІСТЬ



ПЛАСТИЧНИЙ ДО УМОВ
ВИРОЩУВАННЯ



Агрономічні характеристики, [1-9]:

Посухостійкість залежність від H₂O	9
Вологовіддача	8
Початкові темпи росту	8
Холодостійкість	9
Стійкість до фузаріозу	9



Рекомендації до вирощування, [1-9]:

Монокультура	9
Мінімальний обробіток ґрунту	9
Нульовий обробіток ґрунту	9
Придатність до пізнього збирання	9
Рівень мінерального живлення	8




Рекомендована густина рослин/га на момент збирання:

Зона достатнього зволоження	65-70 тис
Зона середнього зволоження	60-65 тис
Зона недостатнього зволоження	55-60 тис
Зона посухи	45-55 тис



Рекомендовані терміни посіву



оптимально ранній
оптимальний
оптимально пізній


«RAGT SEMENCES» КРОКУЄ ДО МАЙБУТНЬОГО



Селекція соняшнику: 45-річний досвід

- Початок програми селекції у Франції в 1972р.
- 2 селекційні програми [Франція та Україна]
- 150 експериментальних точок у всьому світі
- 4 лабораторії: фітопатології (стійкості до хвороб), молекулярного маркування, біометрії та якості
- 2 покоління в рік завдяки роботі в Південній півкулі [Чилі]

Дослідницькі програми соняшнику на світовому рівні
150 експериментальних місць



Напрямки селекції: у пріоритеті продуктивність та стабільність врожайності

Потенціал врожайності зерна – це один із головних критеріїв для сільгоспвиробників. Це також один із головних напрямків у селекції соняшнику в компанії RAGT Semences. Однак, важливо, щоб врожайність була пов'язана зі стійкістю до хвороб, що гарантуватиме стабільність продуктивності. З огляду на це, RAGT Semences надає великого значення таким критеріям стабільності, як-от:


- толерантність до стресу (недостача вологи та стійкість до високих температур);
- пластичність (адаптація до всіх зон вирощування та агро-кліматичних умов);
- толерантність до хвороб (фомосис, біла гниль, вертицильоз, сіра гниль, іржа й фомоз);
- стійкість до нових рас патогенів та паразитів (несправжня борошниста роса й вовчок);
- стійкість до вилягання;
- стартовий ріст;
- запилення.

Головні цілі селекції RAGT Semences – надати сільгоспвиробникам збалансовані гібриди соняшнику, які поєднують всі ці характеристики для високої продуктивності та рентабельності виробництва.



Ціль: урожайність та стабільність показників


- Дуже важливо, щоб чиста врожайність була пов'язана з агрономічними критеріями стабільності, такими як: стійкість до стресових умов, толерантність до хвороб, стійкість до паразитів та вилягання.





Генетика соняшнику RAGT Semences: еталон вмісту олії

Вміст олії – це генетична ознака. Вона поліпшується методом селекції, що базується на здатності асиміляції в кінцевому циклі розвитку рослини. Це вимагає доброго санітарного стану рослини й доброго stay-green в період наливу насіння. Програми селекції соняшнику RAGT Semences мають на меті збільшення вмісту олії та отримання гібридів з середнім вмістом > 56% в сухій речовині. Завдяки своїй генетичній базі, з історично високим вмістом олії, сучасна лінійка RAGT Semences охоплює гібриди, які одночасно високоврожайні та мають дуже високий вміст олії.



РІЗНИЦЯ СЕРЕДЬНОГО ВМІСТУ ОЛІЇ МІЖ ГІБРИДАМИ RAGT SEMENCES ТА КОНКУРЕНТНИМИ ГІБРИДАМИ

+2.2 бала вмісту олії (+4%)

Джерело: база даних RAGT Semences середні показники з 943 порівнянь між гібридами RAGT Semences / Конкурентними



Генетика соняшнику RAGT – це в середньому +2,2 бали вмісту олії проти конкурентних гібридів. Наш гібрид РЖТ ВОЛЛЬФ з символом «Високий вміст олії» має вміст олії більше ніж +5% в порівнянні з комерційними нормами.



Чому започатковано дослідницьку програму в Україні?

Надати гібридам толерантність до стресу дефіциту води та стійкості до високого температурного режиму. Використати інноваційні джерела стійкості до вовчка. Отримати гібриди стійкі до специфічних хвороб (наприклад, іржі).

ІННОВАЦІЇ RAGT SEMENCES



Гібриди соняшнику з високим вмістом олії В середньому +5% вмісту олії до комерційних норм



Гібриди з високим вмістом олеїнової кислоти – це гібриди, до складу олії яких входить більш ніж 82% олеїнових кислот і менше 10% полі-ненасичених жирних кислот



Гібриди Вігор плюс мають дуже швидкий стартовий ріст, високу рівномірність (швидко закривають міжряддя) та адаптивність посіву у різних ґрунтово-кліматичних умовах

Express® SX®

Гібриди соняшнику для використання з гербіцидом Express® компанії FMC



Гібриди виробничої системи Clearfield®Plus толерантні до гербіциду Євро-Лайтнінг®Плюс. Ці гібриди селекції RAGT Semences компанія BASF кваліфікувала як толерантні до гербіциду соняшнику Clearfield®Plus. Це дозволяє конкретно реагувати на проблему боротьби з вовчком та бур'янами



think
SOLUTIONS
think **RAGT**

СОНЯШНИК

Гібрид	Гербіцидний захист	Група стиглості	Тип використання	Стійкість до вовчка	Посухостійкість	Вміст олії	Вміст олеїнової кислоти	Висота рослини
РЖТ ВОЛЛЬФ	Класичний	Ранньостиглий	Лінолевий	A-F	8	54-56%		Нижча за середню
РЖТ ВОЛЛТЕР СУ	Express®SX®	Ранньостиглий	Лінолевий	A-G	9	50-54%		Вища за середню
РЖТ ІНТЕРСТЕЛЛАР СУ	Express®SX®	Середньоранній	Лінолевий	A-E	7	50-54%		Вища за середню
РЖТ ВАЛЛЕНСІЯ КЛП	 Clearfield® Plus Production System	Середньостиглий	Лінолевий	A-F	8	52-54%		Середня
РЖТ КАПІТОЛЛ	Класичний	Ранньостиглий	Високоолеїновий	A-E	7	50-54%	86-90%	Нижча за середню
РЖТ АНГЕЛЛО	Класичний	Середньоранній	Високоолеїновий	A-G	9	50-54%	88-92%	Середня

СОНЯШНИК

РЖТ ВОЛЛЬФ

ЛІДЕР З ПРОДАЖУ

Ранньостиглий
Лінолевий
Гербіцидний захист: Класичний

- Лідер у ранньостиглій групі! Дуже високий вміст олії, в поєднанні з найвищим урожаєм, покращує економічний результат при традиційній технології
- Наш стандарт у стійкості до вилягання, пластичності до умов вирощування та стабільності розкриття потенціалу
- Компактні розміри, висока посухостійкість та стійкість до вовчка рас А-Е формують надійний фундамент до вирощування у більшості регіонів України

Стійкість до вовчка: А-Е

Висота рослини: Нижча за середню



ВИСОКА
ПОСУХОСТІЙКІСТЬ



ДУЖЕ ВИСОКИЙ
ВМІСТ ОЛІЇ



ВИСОКА СТІЙКІСТЬ ДО
ВИЛЯГАННЯ



Агрономічні характеристики, (1-9):

Початкові темпи росту	8
Посухостійкість	8
Стійкість до вилягання	9



Толерантність до хвороб, (1-9):

Фомопсис	8
Фомоз	7
Іржа	8
Біла гниль кошика	8
Несправжня борошниста роса	7



Рекомендована зона вирощування та густота рослин/га на момент збирання:

Достатнього зволоження	60-65 тис
Середнього зволоження	55-60 тис
Недостатнього зволоження	50-55 тис
Посухи	45-50 тис
Критичної посухи	-

Вміст олії

Oil+
SUNFLOWER



2021 – **40 ц/га** (65 га)
ПП «Качан-07»
Козівський р-н

2021 – **41 ц/га** (4 га)
ТОВ «Ласковецький Бровар»
Теребовлянський р-н

2021 – **38 ц/га** (25 га)
ТОВ «Агро-Рось»
Підволочиський р-н

2021 – **44 ц/га** (40 га)
ПАП «Дзвін»
Чортківський р-н

2021 – **43 ц/га** (12 га)
СТОВ «Вербів»
Бережанський р-н

2021 – **42 ц/га** (53 га)
СГВК «Ім. М. Грушевського»
Рогатинський р-н

2021 – **44 ц/га** (50 га)
ПрАТ «Дашківці»
Літинський р-н

2021 – **43 ц/га** (30 га)
ФГ «Ясована»
Шаргородський р-н

2021 – **42 ц/га** (52 га)
ФГ «Перлина Турії»
Турійський р-н

2021 – **36 ц/га** (200 га)
ФГ «Хомяк»
Сокальський р-н

2021 – **42 ц/га** (425 га)
ТОВ «Сігнет Центр»
Попільнянський р-н

2021 – **43 ц/га** (85 га)
ФГ «Агро-Ленд»
Ставищенський р-н

2021 – **42 ц/га** (225 га)
ТОВ «Сільгосптехніка Нова»
Володарський р-н

2021 – **40 ц/га** (100 га)
АФ «Узинська»
Білоцерківський р-н

2021 – **42 ц/га** (60 га)
СФГ «Альта»
Бориспільський р-н

2021 – **41 ц/га** (8 га)
ПАФ «Подолька»
Диканський р-н

2021 – **39 ц/га** (ДЕМО)
СФГ «Перлина»
Лубенський р-н

2021 – **36 ц/га** (110 га)
ПОП «Ім. Войкова»
Чернігівський р-н

2021 – **39 ц/га** (270 га)
ФГ «Північ Агро»
Ніжинський р-н

2021 – **42 ц/га** (220 га)
ТОВ «Дзензелівське»
Маньківський р-н

2021 – **40 ц/га** (180 га)
ФГ «Ім. Чкалова»
Тальнівський р-н

2021 – **42 ц/га** (80 га)
ПП «Перлина Тікича»
Маньківський р-н

2021 – **42 ц/га** (18 га)
ПОП «Соколівка»
Жашківський р-н

2021 – **40 ц/га** (100 га)
ТОВ «Тікич Агро»
Жашківський р-н


2021 – **36 ц/га** (120 га)
ТОВ «Трайгон Фармінг Харків»
Богодухівський р-н

2021 – **35 ц/га** (830 га)
ТОВ «Агропрайм»
Савранський р-н

2021 – **42 ц/га** (46 га)
ФГ «Димов»
Вільшанський р-н

2021 – **41 ц/га** (38 га)
ТОВ «Шевченка»
Голованівський р-н

2021 – **45 ц/га** (26 га)
ТОВ «Перше Травня»
Новоукраїнський р-н



**Результати
урожайності**

«Вирощуємо РЖТ ВОЛЛЬФ починаючи з 2020 року, дуже задоволені стабільно високим результатом урожайності та вмістом олії. Гібрид стійкий до вилягання, має компактні розміри, пластичний до умов вирощування.
З кожним роком збільшуємо площу посіву РЖТ ВОЛЛЬФ і у 2022 вже маємо великий масив біля 600 га.»

Олег Гундзик, директор
ПАП «Дзвін», Тернопільська обл.,
Чортківський р-н

СОНЯШНИК

РЖТ ВОЛЛТЕР СУ

Ранньостиглий
Лінолевий
Гербіцидний захист: **Express®SX®**




- Новинка у системі гербіцидного захисту Express SX з надзвичайно важливими характеристиками для розкриття повного потенціалу урожайності
- Висока посухостійкість, стійкість до вовчку рас А-Г та швидкі темпи росту на початку вегетації забезпечують максимальну адаптованість до вирощування в умовах посухи
- Стійкість до нових рас несправжньої борошнистої роси та високотолерантність до фомопсису і білої гнилі кошику допомагає досягати найвищих результатів у всіх зонах вирощування

Стійкість до вовчка: А-Г

Висота рослини: Вища за середню



СТІЙКИЙ ДО НОВИХ
РАС НЕСПРАВЖНЬОЇ
БОРОШНИСТОЇ РОСИ



ВИСОКА
ПОСУХОСТІЙКІСТЬ



СТІЙКИЙ ДО РАС
ВОВЧКУ А-Г



Агрономічні характеристики, (1-9):

Початкові темпи росту	9
Посухостійкість	9
Стійкість до вилягання	7



Толерантність до хвороб, (1-9):


Фомопсис	8
Фомоз	7
Іржа	7
Біла гниль кошика	8
Несправжня борошниста роса	9



Рекомендована зона вирощування та густота рослин/га на момент збирання:

Достатнього зволоження	55-60 тис
Середнього зволоження	55-60 тис
Недостатнього зволоження	50-55 тис
Посухи	45-50 тис
Критичної посухи	40-45 тис

Вміст олії



СОНЯШНИК



Стійкість до вовчка: А-Е

Висота рослини: Вища за середню

РЖТ ІНТЕРСТЕЛЛАР СУ

Середньоранній
Лінолевий
Гербіцидний захист: **Express® SX®**

- Новинка у системі гербіцидного захисту Express SX з високою адаптованістю до зони середнього та достатнього зволоження
- Високотолерантність до іржі та основних хвороб допомагає отримати найкращий результат
- Завдяки високій енергії стартового росту, швидко з'єднує рядки, що допомагає ефективніше долати стрес на початку вегетації



СТІЙКИЙ ДО НОВИХ
РАС НЕСПРАВЖНЬОЇ
БОРОШНИСТОЇ РОСИ



ВИСОКОТОЛЕРАНТНИЙ
ДО ФОМОПСИСУ ТА ІРЖІ



ШВИДКІ ТЕМПИ РОСТУ



Агрономічні характеристики, [1-9]:

Початкові темпи росту	8
Посухостійкість	7
Стійкість до вилягання	7



Толерантність до хвороб, [1-9]:


Фомопсис	8
Фомоз	8
Іржа	9
Біла гниль кошика	8
Несправжня борошниста роса	9



Рекомендована зона вирощування та густота рослин/га на момент збирання:

Достатнього зволоження	55-60 тис
Середнього зволоження	55-60 тис
Недостатнього зволоження	50-55 тис
Посухи	-
Критичної посухи	-

Вміст олії



СОНЯШНИК

РЖТ ВАЛЛЕНСІЯ КЛП

Середньостиглий
Лінолевий

Гербіцидний захист:  **Clearfield[®] Plus**
Production System

- Новинка у системі гербіцидного захисту Clearfield Plus з стійкістю до вовчка рас A-F та високою посухостійкістю, що є потужним фундаментом для розкриття усього потенціалу в зоні посухи
- Висока толерантність до більшості хвороб, у тому числі фомопсису, іржі та нових рас несправжньої борошнистої роси, дає можливість отримувати не тільки високу врожайність, а й високу олійність
- Висока стабільність і пластичність у зоні недостатнього зволоження та посухи

Стійкість до вовчка: A-F


Висота рослини: Середня



СТІЙКИЙ ДО НОВИХ
РАС НЕСПРАВЖНЬОЇ
БОРОШНИСТОЇ РОСИ



ВИСОКОТОЛЕРАНТНИЙ
ДО ФОМОПСИСУ ТА ІРЖІ



ВИСОКА
ПОСУХОСТІЙКІСТЬ



Агрономічні характеристики, (1-9):

Початкові темпи росту	8
Посухостійкість	8
Стійкість до вилягання	8



Толерантність до хвороб, (1-9):

Фомопсис	9
Фомоз	8
Іржа	8
Біла гниль кошика	8
Несправжня борошниста роса	9



Рекомендована зона вирощування та густота рослин/га на момент збирання:

Достатнього зволоження	60-65 тис
Середнього зволоження	55-60 тис
Недостатнього зволоження	50-55 тис
Посухи	45-50 тис
Критичної посухи	-

Вміст олії

Oil+
SUNFLOWER



A man in a dark shirt is standing in a field of sunflowers, reaching up with his right hand towards a sunflower seed head. The background is a soft, warm sunset sky. The sunflowers have large green leaves and some are starting to turn brown.

think
INNOVATION
think **RAGT**

СОНЯШНИК

РЖТ КАПІТОЛЛ

Ранньостиглий
Високоолеїновий
Гербіцидний захист: Класичний



- Найранніший високоолеїновий гібрид у нашому портфоліо, який допомагає ефективно планувати жнива
- Інтенсивний гібрид, який чудово підходить для зони достатнього зволоження
- Поєднує в собі високий потенціал урожаю, компактні розміри і високу стійкість до вилягання

Стойкість до вовчка: А-Е

Висота рослини: Нижча за середню



НАЙРАННІШИЙ ГІБРИД
У ЛІНІЙЦІ



ВИСОКОТОЛЕРАНТНИЙ
ДО ФОМОПСИСУ ТА ІРЖІ



ВИСОКА СТІЙКІСТЬ
ДО ВИЛЯГАННЯ



Агрономічні характеристики, (1-9):

Початкові темпи росту	8
Посухостійкість	7
Стойкість до вилягання	8



Толерантність до хвороб, (1-9):


Фомопсис	8
Фомоз	7
Іржа	8
Біла гниль кошика	7
Несправжня борошниста роса	8




Рекомендована зона вирощування та густота рослин/га на момент збирання:

Достатнього зволоження	60-65 тис
Середнього зволоження	55-60 тис
Недостатнього зволоження	-
Посухи	-
Критичної посухи	-

Вміст олії



високий



високий

Вміст
олеїнової
кислоти

СОНЯШНИК



РЖТ АНГЕЛЛО

Середньоранній
Високоолеїновий
Гербіцидний захист: Класичний



- Висока посухостійкість і стійкість до вовчка рас А-Г гарантує високий результат в зоні посухи
- Високоолеїновий гібрид, який за рахунок швидких темпів росту на початкових етапах вегетації допомагає ефективніше подолати період першого стресу
- Висока стабільність і пластичність у зоні недостатнього зволоження та посухи

Стійкість до вовчка: А-Г


Висота рослини: Середня



СТІЙКИЙ ДО НОВИХ
РАС НЕСПРАВЖНЬОЇ
БОРОШНИСТОЇ РОСИ



СТІЙКИЙ ДО РАС
ВОВЧКУ А-Г



ВИСОКА
ПОСУХОСТІЙКІСТЬ



Агрономічні характеристики, [1-9]:

Початкові темпи росту	9
Посухостійкість	9
Стійкість до вилягання	8



Толерантність до хвороб, [1-9]:



Фомопсис	8
Фомоз	8
Іржа	7
Біла гниль кошика	8
Несправжня борошниста роса	9



Рекомендована зона вирощування та густота рослин/га на момент збирання:

Достатнього зволоження	-
Середнього зволоження	-
Недостатнього зволоження	50-55 тис
Посухи	45-50 тис
Критичної посухи	40-45 тис

Вміст олії



Вміст
олеїнової
кислоти

НАСІННЯ СОРГО RAGT ІСТОРІЯ ПРИСТРАСТІ



Гібрид	Група стиглості	Висота рослини	Колір зерна	Напрямок використання	Вміст таніну	Тип волоті	Видовження волоті від першого листка	Початкові темпи росту	Міцність стебла	Стійкість до хвороб	Посуhostійкість
РЖТ АЙСБЕРГ	ранньостиглий	Середня /100-130 см	білий *(1,3)	зерно	без танінів	напівщільна	9	8	9	8	9
РЖТ ГГОЛДЕН	середньоранній	Нижча за середню/90-120 см	білий*(2,5)	зерно	без танінів	напівщільна	7	7	7	8	9
РЖТ АЛІГГАТОР	середньоранній	Середня /100-130 см	білий*(1,7)	зерно	без танінів	напіврозпушена	7	8	9	8	9
РЖТ АМІГГО	середньоранній	Грандіозне / 450+ см	червоний	силос,біогаз	без танінів	розпушена	7	7	9	8	9

5 ОСНОВ СЕЛЕКЦІЇ СОРГО



УРОЖАЙ

ШВИДКЕ ДОЗРІВАННЯ

СТАБІЛЬНІСТЬ

МОРФОЛОГІЯ

ЯКІСТЬ

ТИП ВОЛОТІ



ІНТЕНСИВНІСТЬ БІЛОГО

1 2 3 4 5

Селекційна програма основана на посухостійкості

Більше 75% експериментів/випробувань проводиться в умовах дефіциту вологи і азотного живлення.



Дослідні випробування на стресостійкість у двох різних погоднокліматичних середовищах (Франція та Україна) дозволяють оцінити поведінку наших батьківських ліній і гібридів в процесі селекції.



Наша випробувальна мережа дозволяє тестувати гібриди більш ніж три роки в умовах критичної посухи перед їх реєстрацією.



Завдяки біотехнології та біометрії ми можемо ідентифікувати та контролювати гени, які забезпечують стійкість до посухи.

СОРГО



РЖТ АЙСБЕРГ



Агрономічні характеристики, [1-9]:

Видовження волоті від першого листка	9
Початкові темпи росту	8
Міцність стебла	9
Стійкість до хвороб	8
Посуhostійкість	9
Вміст протеїну	8



Рекомендована густота рослин/га на момент збирання:

Зона посухи	110-130 тис
Зона недостатнього зволоження	130-160 тис
Зона середнього зволоження	160-190 тис
Зона достатнього зволоження	190-230 тис

Група стиглості: ранньостиглий

Висота рослини: Середня /100-130 см

Колір зерна: білий *[1,3]


Напрямок використання: зерно

Вміст таніну: без танінів

Тип волоті: напівщільна



СОРГО



РЖТ ГГОЛДЕН



Агрономічні характеристики, [1-9]:

Видовження волоті від першого листка	7
Початкові темпи росту	7
Міцність стебла	7
Стійкість до хвороб	8
Посуhostійкість	9
Вміст протеїну	8



Рекомендована густота рослин/га на момент збирання:

Зона посухи	110-130 тис
Зона недостатнього зволоження	130-160 тис
Зона середнього зволоження	160-190 тис
Зона достатнього зволоження	190-230 тис

Група стиглості: середньоранній

Висота рослини: Нижча за середню/90-120 см

Колір зерна: білий*[2,5]

Напрямок використання: зерно

Вміст таніну: без танінів

Тип волоті: напівщільна



СОРГО



Група стиглості: середньоранній

РЖТ АЛІГГАТОР



Агрономічні характеристики, [1-9]:

Видовження волоті від першого листка	7
Початкові темпи росту	8
Міцність стебла	9
Стійкість до хвороб	8
Посухостійкість	9
Вміст протеїну	8



Рекомендована густота рослин/га на момент збирання:

Зона посухи	110-130 тис
Зона недостатнього зволоження	130-160 тис
Зона середнього зволоження	160-190 тис
Зона достатнього зволоження	190-230 тис

Висота рослини: Середня /100-130 см

Колір зерна: білий*[1,7]

Напрямок використання: зерно

Вміст таніну: без танінів

Тип волоті:
напіврозпушена



СОРГО



Група стиглості: середньоранній

РЖТ АМІГГО



Агрономічні характеристики, [1-9]:

Видовження волоті від першого листка	7
Початкові темпи росту	7
Міцність стебла	9
Стійкість до хвороб	8
Посухостійкість	9
Вміст протеїну	8



Рекомендована густота рослин/га на момент збирання:

Зона посухи	140-160 тис
Зона недостатнього зволоження	150-180 тис
Зона середнього зволоження	170-200 тис
Зона достатнього зволоження	190-220 тис


Висота рослини: Грандіозне / 450+ см

Колір зерна: червоний

Напрямок використання: силос, біогаз

Вміст таніну: без танінів

Тип волоті:
розпушена





think
SOLUTIONS
think RAGT



ЕРІДОН®
СПІВПРАЦЯ, ЯКА ГАРАНТУЄ УСПІХ

КОНТАКТНІ ДАНІ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОФІСУ:

ТОВ «ФІРМА ЕРІДОН»: +0 (800) 408 700, +380 (44) 536 92 00,
office@eridon.ua, www.eridon.ua

Адреса: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Софіївська
Борщагівка, вул. Чорновола, 30

www.ragt.ua

ТОВ "РАЖТ Семенс-Україна"
вул. Героїв Оборони, 10А, оф. 148
03127, Київ, Україна
тел.: +38 (044) 538 15 31

КОНТАКТНІ ДАНІ РЕГІОНАЛЬНИХ ПРЕДСТАВНИЦТВ:

Вінницька область

м. Вінниця +380 (432) 55 78 14
м. Іллінці +380 (4345) 2 12 94
смт. Вапнярка +380 (432) 50 62 01 (02)

Волинська область

м. Луцьк +380 (332) 70 11 58 (59, 60)

Дніпропетровська область

м. Новомосковськ +380 (5696) 9 64 81 (82)
м. Кривий Ріг +380 (056) 409 40 21

Донецька область

м. Краматорськ +380 (6264) 7 21 42

Житомирська область

м. Житомир +380 (50) 411 21 90

Закарпатська область

м. Мукачево +380 (3131) 3 18 20

Запорізька область

м. Бердянськ +380 (6153) 2 37 00 (02)
м. Запоріжжя +380 (612) 86 23 53
м. Токмак +380 (6178) 4 27 72

Івано-Франківська область

с. Ямниця +380 (50) 301 51 64

Київська область

м. Київ +380 (44) 536 92 02

Кіровоградська область

м. Кропивницький +380 (44) 354 35 69
смт. Добровеличківка +380 (5253) 5 23 02
м. Олександрія +380 (50) 374 62 43

Луганська область

м. Старобільськ +380 (6461) 2 20 47

Львівська область

смт. Запитів +380 (322) 36 21 10 (11, 15)

Миколаївська область

м. Миколаїв +380 (512) 48 92 00 (01, 02)
смт. Арбузинка +380 (89) 250 03 01

Одеська область

м. Ізмаїл +380 (4841) 6 17 81;
+380 (66) 663 24 05
м. Одеса +380 (48) 790 07 10 (11, 12, 13)
м. Подільськ +380 (4862) 97 5 86
смт. Сарата +380 (4848) 2 29 98

Полтавська область

м. Лубни +380 (95) 275 29 16
м. Полтава +380 (50) 359 94 58

Рівненська область

м. Рівне +380 (362) 67 17 00

Сумська область

м. Суми +380 (542) 65 12 92
м. Конотоп +380 (95) 286 19 21

Тернопільська область

+380 (892) 50 80 87
+380 (892) 50 43 46
+380 (892) 50 40 57

Харківська область

м. Балаклія +380 (57) 492 22 23
м. Харків +380 (57) 766 45 27

Херсонська область

м. Таврійськ +380 (50) 414 16 37
м. Херсон +380 (552) 41 06 90

Хмельницька область

м. Хмельницький +380 (50) 486 71 30
м. Кам'янець-Подільський +380 (3849) 5 07 07

Черкаська область

м. Умань +380 (4744) 3 90 01 (05)
м. Черкаси +380 (472) 64 72 75

Чернівецька область

м. Чернівці +380 (372) 57 86 86

Чернігівська область

м. Ічня +380 (4633) 2 52 34
м. Чернігів +380 (95) 281 73 74