



ЕРІДОН®
СПІВРАЦЯ, ЯКА ГАРАНТУЄ УСПІХ

НАСІННЯ

ОЗИМИХ культур **2023**

ОЗИМИЙ
ЯЧМІНЬ



ОЗИМЕ
ЖИТО



ОЗИМИЙ
РІПАК

ОЗИМА
ПШЕНИЦЯ





ПШЕНИЦЯ ОЗИМА

СОРТ	ОРИГІНАТОР	РІЗНОВИД	ГРУПА СТИГЛОСТІ
Андрада	Viterra Seed	Еритроспермум (остистий)	Ранньостиглий
Балітус	SAATBAU	Лютесценс (безостий)	Ранньостиглий
СН Комбін	DSV	Еритроспермум (остистий)	Ранньостиглий
Аспект	DSV	Лютесценс (безостий)	Ранньостиглий
Асорі New	Secobra	Лютесценс (безостий)	Середньоранній
Сорріал New	Lidea	Лютесценс (безостий)	Середньоранній
Футурум	Secobra	Лютесценс (безостий)	Середньоранній
Меморі	Secobra	Лютесценс (безостий)	Середньоранній
Нордіка	Limagrain	Лютесценс (безостий)	Середньоранній
Артіст	DSV	Лютесценс (безостий)	Середньоранній
Самурай	DSV	Лютесценс (безостий)	Середньостиглий
Патрас	DSV	Лютесценс (безостий)	Середньостиглий
Продуцент	DSV	Лютесценс (безостий)	Середньостиглий



ПЕРЕВАГИ

- Характеризується **відмінними якісними показниками**;
- Сорт **має високу зимостійкість** та відмінно переносить весняні заморозки;
- Висока стійкість** до основних хвороб;
- Підходить для всіх технологій вирощування**, добре реагує на азотні добрива.

МОРФОЛОГІЯ РОСЛИНИ

Висота рослини,
см

82

РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА ТА СТРОКИ ВИСІВУ, млн. шт. насінин на 1 га

Ранні

3,4

Оптимальні

3,5

Пізні

3,7

ДОДАТКОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рекомендовані
зони вирощування

Полісся
Лісостеп
Степ

АНДРАДА



Сорт ранньостиглої, червоноколосої озимої пшениці розробленої в Європі Станцією с.г досліджень і розробок в місті Турда. Сорт був створений схрещуванням ліній «Dropia x T57-90» для посушливих умов Південно-Східної частини Європи та південного Причорномор'я. Головною метою цього схрещування було поєднання чудової якості виготовленого хліба від сорту «Dropia» та високої врожайності і посухостійкості від лінії «T57-90».

Якісні характеристики відображаються високим вмістом білка в зерні 14% і вище, що пов'язано з прекрасним індексом клейковини. Сорт показав хороші показники врожайності у більшості офіційних випробуваннях. В середньому за три роки тестувань, АНДРАДА відрізнялася більшою врожайністю від інших сортів.



ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Оригінатор	Viterro Seed	Різновид	Еритроспермум (остистий)
Група якості	Сильна	Група стиглості	Ранньостиглий



АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Зимостійкість	8	Стійкість до осипання	8
Посухостійкість	8	Розвиток восени	8
Стійкість до вилягання	8	Розвиток навесні	7
Стійкість до ламкості стебла	8	Інтенсивність кущення	8



СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ

Борошниста роса	8	Септоріоз	7
Кореневі гнилі	7	Фузаріоз колосу	9



ПЕРЕВАГИ

- **Ранньостиглий** високоінтенсивний сорт;
- **Безостий**, щільноколосого типу;
- **Відмінна зимостійкість**, посухостійкий;
- Відмінна **стійкість** до основних хвороб.

МОРФОЛОГІЯ РОСЛИНИ

Висота рослини,
см

80-90

РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА
ТА СТРОКИ ВИСІВУ,
млн. шт. насінина на 1 га

Ранні

4,5

Оптимальні

5,0

Пізні

5,5

ДОДАТКОВІ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рекомендовані
зони вирощування

Полісся
Лісостеп
Степ

БАЛІТУС



Ранній, низькорослий, високоінтенсивний сорт з максимальною віддачею для Півдня та Сходу України.

БАЛІТУС має стійкість до основних хвороб листя та колосу, добре переносить посушливі умови та має відмінну зимостійкість.



ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Оригінатор	SAATBAU	Різновид	Лютесценс (безостий)
Група якості	Цінна	Група стиглості	Ранньостиглий



АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Зимостійкість	 8	Стійкість до осипання	 8
Посухостійкість	 8	Розвиток восени	 7
Стійкість до вилягання	 8	Розвиток навесні	 8
Стійкість до ламкості стебла	 7	Інтенсивність кущення	 8



СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ

Борошниста роса	 8	Септоріоз	 8
Кореневі гнилі	 7	Фузаріоз колосу	 7



ПЕРЕВАГИ

- Висока **зимостійкість**;
- Добра **посухостійкість**;
- Стійкий до вилягання** та комплексу хвороб;
- Підвищений** коефіцієнт кущення.

МОРФОЛОГІЯ РОСЛИНИ

Висота рослини,
см

85

РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА ТА СТРОКИ ВИСІВУ, млн. шт. насінин на 1 га

Ранні

3,0

Оптимальні

4,0

Пізні

4,5

ДОДАТКОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рекомендовані
зони вирощування

Полісся
Лісостеп
Степ

СН КОМБІН



Перший ранній інтенсивний сорт DSV створений для південних регіонів України.

СН КОМБІН – пшениця короткого дня, фотоперіодично нечутлива і добре відростає в умовах короткого дня пізньої осені, а також рано навесні. Добре переносить посушливі умови та не втрачає врожайність під час наливу. Пізній посів і посів по соняшнику – це саме ті умови, під які створювався даний сорт.



ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Оригінатор	DSV	Різновид	Еритроспермум (остистий)
Група якості	Цінна	Група стиглості	Ранньостиглий



АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Зимостійкість	7	Стійкість до осипання	8
Посухостійкість	8	Розвиток восени	7
Стійкість до вилягання	8	Розвиток навесні	7
Стійкість до ламкості стебла	8	Інтенсивність кущення	7



СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ

Борошниста роса	6	Септоріоз	5
Кореневі гнилі	6	Фузаріоз колосу	6



 ПЕРЕВАГИ

- **Стабільна урожайність** в офіційних сортовипробуваннях;
- **Ранньостиглий сорт** з хорошими хлібопекарськими якостями;
- **Характеризується гарною зимостійкістю** та стійкістю до основних хвороб;
- **Придатна до вирощування** після бобових, ріпаку, кукурудзи та цукрових буряків.

МОРФОЛОГІЯ РОСЛИНИ

Висота рослини, см	80
--------------------	----

РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА ТА СТРОКИ ВИСІВУ, млн. шт. насінин на 1 га

Ранні	4,5
Оптимальні	5,0
Пізні	5,5

ДОДАТКОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рекомендовані зони вирощування	Полісся Лісостеп Степ
--------------------------------	-----------------------------

АСПЕКТ



Сорт, який поєднує важливі характеристики: потужний старт навесні, ранній налив і дозрівання, а також високі показники посухо- та зимостійкості. Така комбінація дає надзвичайно широкую адаптивність від умов Півночі, де значно коротший вегетаційний період, до умов Півдня, де критичними є швидкість наливу, яка убезпечить фермера від значних ризиків високих температур в період дозрівання. Аспект - цінна пшениця, з хорошим показником числа падіння та високою масою тисячі насінин.

 ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Оригінатор	DSV	Різнovid	Лютесценс (безостий)
Група якості	Цінна	Група стиглості	Ранньостиглий

 АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Зимостійкість	 8	Стійкість до осипання	 8
Посухостійкість	 8	Розвиток восени	 7
Стійкість до вилягання	 6	Розвиток навесні	 8
Стійкість до ламкості стебла	 7	Інтенсивність кущення	 6

 СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ

Борошниста роса	 8	Септоріоз	 7
Кореневі гнілі	 6	Фузаріоз колосу	 7



ПЕРЕВАГИ

- Хороші якісні параметри зерна, на межі групи Е/А;
- Низькорослий сорт **стійкий до вилягання та осипання** зерна;
- Високоврожайний**, із гарною зимостійкістю;
- Відмінна стійкість до основних хвороб**, особливо до борошнистої роси та до бурі іржі.

МОРФОЛОГІЯ РОСЛИНИ

Висота рослини, см	85
--------------------	----

РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА ТА СТРОКИ ВИСІВУ, млн. шт. насінин на 1 га

Ранні	3,0
Оптимальні	3,3
Пізні	3,5

ДОДАТКОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рекомендовані зони вирощування	Полісся Лісостеп Степ
--------------------------------	-----------------------------

ACORI

New



Пшениця озима, яка вражає своєю урожайністю та якістю!

Універсальний сорт, який ідеально підходить для інтенсивних та середньо інтенсивних технологій вирощування в широкому діапазоні ґрунтів, де вирощується пшениця. У нього добре розвинена коренева система та він ідеально підходить для посушливих умов вирощування!



ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Оригінатор	Secobra	Різновид	Лютесценс (безостий)
Група якості	Сильна	Група стиглості	Середньоранній



АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Зимостійкість	8	Стійкість до осипання	8
Посухостійкість	8	Розвиток восени	8
Стійкість до вилягання	8	Розвиток навесні	8
Стійкість до ламкості стебла	8	Інтенсивність кущення	9



СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ

Борошниста роса	8	Септоріоз	8
Кореневі гнілі	8	Фузаріоз колосу	8



ПЕРЕВАГИ

- Швидке дозрівання в кінці вегетації;
- Стабільна врожайність;
- Дуже висока **холодостійкість**;
- Висока **стійкість до вилягання**;
- Чудові показники** якості зерна.

МОРФОЛОГІЯ РОСЛИНИ

Висота рослини,
см

70

РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА
ТА СТРОКИ ВИСІВУ,
млн. шт. насінин на 1 га

Ранні

3,5

Оптимальні

3,8

Пізні

4,0

ДОДАТКОВІ
ХАРАКТЕРИСТИКИРекомендовані
зони вирощуванняПолісся
Лісостеп
Степ

СОРРІАЛ

New

Lidea

Сорріал низькорослий сорт пшениці озимої, з гарною стійкістю до хвороб та високим потенціалом продуктивності.

Характеризується високим вмістом протеїнів та відмінними хлібопекарськими якостями.



ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Оригінатор	Lidea	Різнovid	Лютесценс (безостий)
Група якості	Сильна	Група стиглості	Середньоранній



АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Зимостійкість	8	Стійкість до осипання	8
Посухостійкість	7	Розвиток восени	7
Стійкість до вилягання	8	Розвиток навесні	8
Стійкість до ламкості стебла	8	Інтенсивність кушення	7



СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ

Борошниста роса	7	Септоріоз	6
Кореневі гнилі	7	Фузаріоз колосу	7



ПЕРЕВАГИ

- Відмінна врожайність як при інтенсивному, так і при екстенсивному вирощуванні;
- Відмінна стійкість до хвороб;
- Відмінна придатність до всіх умов вирощування.

МОРФОЛОГІЯ РОСЛИНИ

Висота рослини,
см

80

РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА ТА СТРОКИ ВИСІВУ, млн. шт. насінин на 1 га

Ранні

3,1-3,2

Оптимальні

3,6-4,0

Пізні

4,2-4,7

ДОДАТКОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рекомендовані
зони вирощування

Полісся
Лісостеп
Степ

ФУТУРУМ



Сорт пшениці озимої з відмінним поєднанням високої врожайності та невибагливості до умов вирощування, Футурум входить до числа найкращих сортів у асортименті компанії Secobra.

Сорт вражає своєю потужною листовою поверхнею та великою кількістю продуктивних стебел. З точки зору стійкості до хвороб, сорт не має слабких місць, та має відмінну стійкість до смугастої, стеблової іржі та ін. Футурум - це сорт для всіх, хто прагне високих врожаїв зернових.



ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Оригінатор	Secobra	Різновид	Лютесценс (безостий)
Група якості	Цінна	Група стиглості	Середньоранній



АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Зимостійкість	8	Стійкість до осипання	8
Посухостійкість	8	Розвиток восени	7
Стійкість до вилягання	9	Розвиток навесні	8
Стійкість до ламкості стебла	9	Інтенсивність кущення	7



СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ

Борошниста роса	9	Септоріоз	8
Кореневі гнилі	8	Фузаріоз колосу	9



ПЕРЕВАГИ

- Середньоранній високоврожайний сорт;
- Безостий, середньорослий;
- Гарна зимостійкість;
- Стійкий до основних хвороб.

МОРФОЛОГІЯ РОСЛИНИ

Висота рослини, см	85
--------------------	----

РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА ТА СТРОКИ ВИСІВУ, млн. шт. насінин на 1 га

Ранні	3,2
Оптимальні	4,0
Пізні	4,5

ДОДАТКОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рекомендовані зони вирощування	Полісся Лісостеп
--------------------------------	---------------------

МЕМОРІ



Сорт німецької селекції, флагман серед озимих пшениць. Займає перше місце в Європейських випробуваннях по врожайності.

Це ідеальний сорт для тих, хто шукає найкращих показників продуктивності. Меморі має великий набір агрономічних особливостей, включаючи стійкості до грибкових захворювань. Сорт середньої довжини з потовщеним стеблом, яке має гарну стійкість до вилягання. Додатковою перевагою, є більш ранній тип дозрівання, що важливо для посушливих регіонів.



ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Оригінатор	Secobra	Різнovid	Лютесценс (безостий)
Група якості	Цінна	Група стиглості	Середньоранній



АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Зимостійкість	 8	Стійкість до осипання	 8
Посухостійкість	 8	Розвиток восени	 7
Стійкість до вилягання	 8	Розвиток навесні	 8
Стійкість до ламкості стебла	 7	Інтенсивність кущення	 8



СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ

Борошниста роса	 8	Септоріоз	 8
Кореневі гнілі	 7	Фузаріоз колосу	 7



НОРДИКА



Середньоранній, безостий сорт озимої пшениці з дуже високою врожайністю, зимостійкістю та посухостійкістю.

Рослина міцна, стебло стійке до вилягання та осипання зерна. Головними перевагами сорту є також висока стійкість до ураження фузаріозом колосу, бурюю листовою іржею та борошнистою росою.



ПЕРЕВАГИ

- Високоврожайний;
- Стійкість до мінусових температур;
- Підходить до вирощування в зонах недостатнього зволоження;
- Висока стійкість до борошнистої роси, фузаріозу та септоріозу.

МОРФОЛОГІЯ РОСЛИНИ

Висота рослини, см

93

РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА ТА СТРОКИ ВИСІВУ, млн. шт. насінин на 1 га

Ранні 3,5

Оптимальні 4,0

Пізні 5,0

ДОДАТКОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рекомендовані зони вирощування

Полісся
Лісостеп



ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Оригінатор

Limagrains

Різновид

Лютесценс
(безостий)

Група якості

Цінна

Група стиглості

Середньоранній



АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Зимостійкість



Стійкість до осипання



Посухостійкість



Розвиток восени



Стійкість до вилягання



Розвиток навесні



Стійкість до ламкості стебла



Інтенсивність кущення



СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ

Борошниста роса



Септоріоз



Кореневі гнілі



Фузаріоз колосу





ПЕРЕВАГИ

- Середньоранній високоврожайний сорт;
- Безостий з міцним стеблом стійким до вилягання;
- Гарна зимостійкість;

МОРФОЛОГІЯ РОСЛИНИ

Висота рослини, см	90
--------------------	----

РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА ТА СТРОКИ ВИСІВУ, млн. шт. насінин на 1 га

Ранні	4,5
Оптимальні	5,0
Пізні	5,5

ДОДАТКОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рекомендовані зони вирощування	Лісостеп Степ
--------------------------------	------------------

ARTIST



Середньорослий сорт з високим потенціалом урожайності та зимостійкості.

Вирізняється високою адаптивністю до несприятливих умов вирощування. Ранній налив запобігає щуплості зерна в посушливих регіонах під час дозрівання. Артiст формує зерно з високою натурою та виходом борошна, забезпечуючи при цьому стабільне число падіння. Належить до компенсаційного типу, тому ідеально підходить для ранніх та оптимальних строків висіву.



ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Оригінатор	DSV	Різнovid	Лютесценс (безостий)
Група якості	Цінна	Група стиглості	Середньоранній



АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Зимостійкість		Стійкість до осипання	
Посухостійкість		Розвиток восени	
Стійкість до вилягання		Розвиток навесні	
Стійкість до ламкості стебла		Інтенсивність кущення	



СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ

Борошниста роса		Септоріоз	
Кореневі гнилі		Фузаріоз колосу	



САМУРАЙ



Самурай один із перших сортів DSV в Україні, який подолав позначку 10 тонн з гектара в товарному посіві.

Сорт колосового типу середньої висоти з високою озерненістю колоса і масою тисячі насінин. Завдяки стійкості до вилягання САМУРАЙ "пробачить" невчасне внесення регулятора росту та порадує агронома безпроблемним обмолотом.

ПЕРЕВАГИ

- Добра зимостійкість;
- Стійкий до вилягання;
- Стабільний за рівнем урожайності;
- Екологічно пластичний.

МОРФОЛОГІЯ РОСЛИНИ

Висота рослини,
см

80

РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА ТА СТРОКИ ВИСІВУ, млн. шт. насінин на 1 га

Ранні

3,0

Оптимальні

4,0

Пізні

4,5

ДОДАТКОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рекомендовані
зони вирощування

Полісся
Лісостеп



ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Оригінатор	DSV	Різновид	Лютесценс (безостий)
Група якості	Філер	Група стиглості	Середньо-стиглий



АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Зимостійкість	7	Стійкість до осипання	9
Посухостійкість	7	Розвиток восени	7
Стійкість до вилягання	8	Розвиток навесні	7
Стійкість до ламкості стебла	8	Інтенсивність кущення	7



СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ

Борошниста роса	6	Септоріоз	6
Кореневі гнилі	8	Фузаріоз колосу	6



ПЕРЕВАГИ

- Добра зимостійкість;
- Стабільний за рівнем урожайності;
- Екологічно пластичний;
- Генетично підвищена стійкість до фузаріозу колоса та борошнистої роси.

МОРФОЛОГІЯ РОСЛИНИ

Висота рослини, см 90

РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА ТА СТРОКИ ВИСІВУ, млн. шт. насінин на 1 га

Ранні	3,0
Оптимальні	4,0
Пізні	4,5

ДОДАТКОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рекомендовані зони вирощування Полісся Лісостеп

ПАТРАС



Патрас - середньостиглий, безостий з підвищеною зимостійкістю сорт, придатний для раннього посіву.

Сорт компенсаційного типу із раннім стартом навесні. Колосовий тип сорту реалізує врожайність за рахунок високої озерненості колоса та маси тисячі насінин. Селекційна робота спрямована на прискорений налив зерна, що впливає на стабільність сорту в умовах високих температур під час наливу.



ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Оригінатор	DSV	Різновид	Лютесценс (безостий)
Група якості	Цінна	Група стиглості	Середньо-стиглий



АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Зимостійкість	 8	Стійкість до осипання	 9
Посухостійкість	 7	Розвиток восени	 6
Стійкість до вилягання	 6	Розвиток навесні	 8
Стійкість до ламкості стебла	 7	Інтенсивність кущення	 6



СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ

Борошниста роса	 8	Септоріоз	 7
Кореневі гнилі	 8	Фузаріоз колосу	 7



ПРОДУЦЕНТ



Сорт Продуцент рекомендований для Західного та Центрального регіонів України.

Головною перевагою є придатність до вирощування по неоптимальних попередниках, а саме після кукурудзи та пшениці. Відрізняється високою стійкістю до хвороб листя та колосу, тому має один з найнижчих рівнів ураження жовтою іржею, борошнистою росою, фузаріозом та септоріозом. Сорт витримує високу густоту стояння за рахунок відмінної компенсаторної та регенераційної здатності.



ПЕРЕВАГИ

- **Сорт компенсаційного типу** з дуже високою врожайністю;
- **Гарна зимостійкість** та стійкість до вилягання;
- **Відмінна стійкість до хвороб** листового апарату;
- **Гнучкість** у термінах посіву.

МОРФОЛОГІЯ РОСЛИНИ

Висота рослини,
см

79

**РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА
ТА СТРОКИ ВИСІВУ,
млн. шт. насінин на 1 га**

Ранні 3,5

Оптимальні 4,0

Пізні 4,5

ДОДАТКОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рекомендовані
зони вирощування

Полісся
Лісостеп



ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Оригінатор	DSV	Різновид	Лютесценс (безостий)
Група якості	Цінна	Група стиглості	Середньо-стиглий



АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Зимостійкість	9	Стійкість до осипання	8
Посухостійкість	8	Розвиток восени	8
Стійкість до вилягання	8	Розвиток навесні	7
Стійкість до ламкості стебла	8	Інтенсивність кущення	8



СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ

Борошниста роса	8	Септоріоз	8
Кореневі гнилі	6	Фузаріоз колосу	8



ЯЧМІНЬ ОЗИМИЙ

СОРТ	ОРИГІНАТОР	РІЗНОВИД	ГРУПА СТИГЛОСТІ
Ізоцель	Secobra	Палідум (шестирядний колос)	Ранньостиглий
Карміна	SAATBAU	Палідум (шестирядний колос)	Ранньостиглий
Парадіс	DSV	Палідум (шестирядний колос)	Середньоранній
Делікатессе	Secobra	Нутанс (дворядний колос)	Середньоранній
Хайлайт	DSV	Палідум (шестирядний колос)	Середньостиглий



ПЕРЕВАГИ

- Відмінна стійкість до хвороб;
- Хороша зимо- та морозостійкість;
- Генетично сформована **висока врожайність**;
- Залежно від технології вирощування:** фуражного або пивоварного напрямку використання.

МОРФОЛОГІЯ ТА СТРУКТУРА ВРОЖАЙНОСТІ

Висота рослини, см	70
Вміст білку, %	11

РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА ТА СТРОКИ ВИСІВУ, млн. шт. насінин на 1 га

Норма висіву	3,0 - 3,5
--------------	-----------

ДОДАТКОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рекомендовані зони вирощування	Полісся Лісостеп Степ
--------------------------------	-----------------------------

ІЗОЦЕЛЬ



Ізоцель - ранній сорт озимого ячменю, із відмінною стійкістю до вилягання.

Сорт під час селекційної роботи, отримав відмінний баланс врожайних компонентів, тому ISOCEL має вищу врожайність порівняно з гібридами. Його агрономічні та технологічні якості зберігають увагу європейських фермерів. Значна перевага- це стійкість до хвороб, що мінімізує внесення фунгіцидів.



ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Оригінатор	Secobra	Різновид	Палідум (шестирядний колос)
Група стиглості	Ранньостиглий		



АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Зимостійкість	8	Стійкість до ламкості колоса	9
Посухостійкість	9	Розвиток восени	8
Стійкість до вилягання	9	Розвиток навесні	9
Стійкість до ламкості стебла	8	Інтенсивність кущення	7



СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ

Бура іржа	9	Ринхоспоріоз	8
Карликова іржа	8	Гельмінтоспоріоз	8
Борошниста роса	8	Сажка	9
Сітчаста плямистість	9	ВЖКЯ	8



ПЕРЕВАГИ

- Один з кращих для вирощування в складних умовах;
- Ранній сорт з високими показниками врожайності;
- Посухостійкий, перевершує всі сорти при вирощуванні на легких ґрунтах;
- Гарні показники зимостійкості;
- Висока стійкість до основних грибкових захворювань.

МОРФОЛОГІЯ ТА СТРУКТУРА ВРОЖАЙНОСТІ

Висота рослини, см	78
Вміст білку, %	13

РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА ТА СТРОКИ ВИСІВУ, млн. шт. насінин на 1 га

Норма висіву	2,8 - 3,6
--------------	-----------

ДОДАТКОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рекомендовані зони вирощування	Лісостеп Степ
--------------------------------	------------------

КАРМІНА



Сорт озимого ячменю Карміна пристосований до вирощування в складних природно-кліматичних умовах із доброю стійкістю до основних хвороб та несприятливих факторів навколишнього середовища.



ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Оригінатор	SAATBAU	Різновид	Палідум (шестирядний колос)
Група стиглості	Ранньостиглий		



АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Зимостійкість	 7	Стійкість до ламкості колоса	 8
Посухостійкість	 8	Розвиток восени	 6
Стійкість до вилягання	 7	Розвиток навесні	 7
Стійкість до ламкості стебла	 7	Інтенсивність кущення	 7



СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ

Бура іржа	 7	Ринхоспоріоз	 8
Карликова іржа	 6	Гельмінтоспоріоз	 7
Борошниста роса	 8	Сажка	 7
Сітчаста плямистість	 8	ВЖКЯ	 8



ПЕРЕВАГИ

- **Має виражену високу стійкість** до вилягання;
- **Стійкість до ламкості колоса** і стебла забезпечать легке комбайнування без втрат;
- Сорт характеризується **високою озерненістю колоса**, масою тисячі насінин та натурою зерна;
- **Характеризується високою зимостійкістю та посухостійкістю**, що значно розширює ареал поширення.

МОРФОЛОГІЯ ТА СТРУКТУРА ВРОЖАЙНОСТІ

Висота рослини, см 90 - 95

Вміст білку, % 12

РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА ТА СТРОКИ ВИСІВУ, млн. шт. насінин на 1 га

Норма висіву 3,0 - 3,5

ДОДАТКОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рекомендовані зони вирощування Полісся Лісостеп

ПАРАДІС



Абсолютно новий сорт озимого ячменю від ДСВ. Єдиний сорт на ринку України, в геномі якого селекціонери поєднали генетичну стійкість до Вірусу жовтої карликовості ячменю (BYDV) та Вірусу жовтої мозаїки ячменю (BaYMV). В умовах зміни клімату останніми роками різко збільшився ризик осіннього зараження вірусами. При сильному рівні інфікування, недобір урожаю може становити до 70%, а використання інсектицидів не дає стовідсоткової впевненості у ефективному захисті від комах-переносників, адже їх внесення часто проводиться невчасно. Парадіс вирішить Вам це питання.



ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Оригінатор	DSV	Різновид	Палідум (шестирядний колос)
Група стиглості	Середньо-ранній		



АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Зимостійкість	9	Стійкість до ламкості колоса	9
Посухостійкість	8	Розвиток восени	8
Стійкість до вилягання	8	Розвиток навесні	9
Стійкість до ламкості стебла	9	Інтенсивність кущення	6



СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ

Бура іржа	8	Ринхоспоріоз	8
Карликова іржа	7	Гельмінтоспоріоз	8
Борошниста роса	8	Сажка	8
Сітчаста плямистість	8	ВЖКЯ	9

-

МОРФОЛОГІЯ ТА СТРУКТУРА ВРОЖАЙНОСТІ

Висота рослини, см	80
--------------------	----

**РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА
ТА СТРОКИ ВИСІВУ,
млн. шт. насінин на 1 га**

Норма висіву	3,3 - 3,6
--------------	-----------

ДОДАТКОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Рекомендовані
зони вирощування**



ДЕЛІКАТЕССЕ



Делікатессе - середньоранній дворядний сорт озимого ячменю, який завдяки відмінній стійкості до грибкових захворювань та селекції направленої на підвищену врожайність, - формує крупну, вирівняну зернівку великої маси. Рослина зі швидким початковим ростом та високим коефіцієнтом кущення, середня висота та міцне стебло, яке стійке до вилягання, дасть можливість фермеру зберегти весь генетично закладений потенціал сорту.

Оригіатор	Secobra	Різновид	Нутанс (дворядний колос)
Група стиглості	Середньо-ранній		

Зимостійкість		8	Стійкість до ламкості колоса		8
Посуhostійкість		9	Розвиток восени		8
Стійкість до вилягання		8	Розвиток навесні		8
Стійкість до ламкості стебла		7	Інтенсивність куцання		7

Бура іржа		7	Ринхоспоріоз		8
Карликова іржа		7	Гельмінтоспоріоз		8
Борошниста роса		9	Сажка		9
Сітчаста плямистість		8	ВЖКЯ		8



ХАЙЛАЙТ



Хайлайт – сорт із дуже високою врожайністю, яка формується за рахунок високої озерненості колоса та дуже високої маси тисячі насінин.

Виповненість зерна, легке відокремлення остюків при збиранні дають змогу отримувати якісний врожай із високою натурою.



ПЕРЕВАГИ

- Зимостійкий;
- Добра посухостійкість;
- Стабільний за рівнем урожайності;
- Підвищена стійкість до ураження вірусом жовтої мозаїки ячменю (ВЖМЯ).

МОРФОЛОГІЯ ТА СТРУКТУРА ВРОЖАЙНОСТІ

Висота рослини, см 120 - 125

Вміст білку, % 13

РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА ТА СТРОКИ ВИСІВУ, млн. шт. насінин на 1 га

Норма висіву 3,0 - 3,5

ДОДАТКОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рекомендовані зони вирощування Полісся Лісостеп Степ



ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Оригінатор	DSV	Різновид	Палідум (шестирядний колос)
Група стиглості	Середньо-стиглий		




АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Зимостійкість	7	Стійкість до ламкості колоса	9
Посухостійкість	7	Розвиток восени	6
Стійкість до вилягання	6	Розвиток навесні	6
Стійкість до ламкості стебла	7	Інтенсивність кущення	7



СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ

Бура іржа	7	Ринхоспоріоз	7
Карликова іржа	5	Гельмінтоспоріоз	6
Борошниста роса	7	Сажка	6
Сітчаста плямистість	6	ВЖКЯ	8



ЖИТО ОЗИМЕ

СОРТ	ОРИГІНАТОР	РІЗНОВИД	ГРУПА СТИГЛОСТІ
Астранос New	Nordic Seed	Гібридне жито	Середньоранній
Хеллтоп	Nordic Seed	Гібридне жито	Середньостиглий



ПЕРЕВАГИ

- **Стабільна** урожайність;
- **Добре підходить для** вирощування на легких ґрунтах;
- **Високий** вміст протеїну;
- **Висока стійкість** до грибкових захворювань;
- **Відмінна стійкість** до вилягання.

МОРФОЛОГІЯ ТА СТРУКТУРА ВРОЖАЙНОСТІ

Висота рослини, см	130
Вміст білку, %	11

РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА ТА СТРОКИ ВИСІВУ, млн. шт. насінин на 1 га

Норма висіву	1,8 - 2,1
--------------	-----------

ДОДАТКОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рекомендовані зони вирощування	Полісся, Лісостеп
--------------------------------	-------------------

АСТРАНОС

New

Nordic Seed

Астранос - гібрид озимого жита, що поєднує в собі відмінну стійкість до основних хвороб та стійкість до вилягання. Високий вміст білку та маса 1000 насінин забезпечує високу стабільність і якість врожаю.

Придатний до використання як для випікання хліба, так і для фуражних цілей.



ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Оригінатор	Nordic Seed	Тип використання	Зерновий
		Група стиглості	Середньо-ранній



АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Зимостійкість	8	Стійкість до вилягання	8
Посухостійкість	8		



СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ

Бура іржа	7	Ринхоспоріоз	7
Борошниста роса	8		



ПЕРЕВАГИ

- Високий та стабільний потенціал врожайності;
- Добре підходить для вирощування на легких ґрунтах;
- Відмінна стійкість до вилягання за рахунок селекційно потовщених стінок стебла;
- Високий коефіцієнт кущення;
- Крупне зерно світлого кольору із високим вмістом білку.

МОРФОЛОГІЯ ТА СТРУКТУРА ВРОЖАЙНОСТІ

Висота рослини, см	120
Вміст білку, %	11

РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА ТА СТРОКИ ВИСІВУ, млн. шт. насінин на 1 га

Норма висіву	1,8 - 2,1
--------------	-----------

ДОДАТКОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рекомендовані зони вирощування	Полісся, Лісостеп
--------------------------------	-------------------

ХЕЛЛОП



Хеллтоп - гібрид озимого жита, що поєднує в собі відмінну стійкість до борошнистої роси, середню стійкість до ринхоспоріозу і високу стійкість до бурі іржі і ріжків.

Це забезпечує високу стабільність і якість врожаю. Вміст білка варіює від середнього до високого, що підвищує цінність до жита, як до кормової культури.



ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Оригінатор	Nordic Seed	Тип використання	Зерновий
		Група стиглості	Середньо-стиглий



АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Зимостійкість	8	Стійкість до ламкості стебла	9
Посухостійкість	8	Стійкість до ламкості колоса	9
Стійкість до вилягання	9		





СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ

Буря іржа	9	Ринхоспоріоз	7
Борошниста роса	9	Тверда сажка	9



РІПАК ОЗИМИЙ

ГІБРИД	ОРИГІНАТОР	ГРУПА СТИГЛОСТІ	СИСТЕМА ЗАХИСТУ
Дайнемік	DSV	Середньостиглий	
Далтон	DSV	Середньопізній	
Домінатор	DSV	Середньоранній	
Принц	DSV	Ранньостиглий	
Темптейшн	DSV	Середньостиглий	
Тігріс	DSV	Середньостиглий	
Дюк	DSV	Середньоранній	
Крокодил	DSV	Середньостиглий	
Верітас КЛ	DSV	Середньопізній	
Едімакс КЛ	DSV	Середньоранній	
Сімплекс КЛ	DSV	Середньопізній	
Дактарі New	DSV	Середньоранній	
Беатрікс КЛ New	DSV	Середньостиглий	
Матрікс КЛ New	DSV	Середньостиглий	
Абсолют	Limagrain	Середньостиглий	
Александр	Limagrain	Середньоранній	
Карлтон КЛ	Limagrain	Середньоранній	
ДК Експеншн	Dekalb	Середньопізній	
ДК Імплемент КЛ	Dekalb	Середньостиглий	
ДК Експат New	Dekalb	Середньостиглий	



ПЕРЕВАГИ

- **Стійкість** до жовтого вірусу турнепсу TuYV та стійкість до фомозу, на основі гену RLM-7;
- **Висока** польова толерантність до Вертицильозу;
- **Стійкість** до розтріскування стручків (PSR) та **висока** посухостійкість;
- **Потужна** коренева система;
- **Ефективне** використання азоту;
- Придатність до вирощування на **різних типах** ґрунтів.

МОРФОЛОГІЯ ТА СТРУКТУРА ВРОЖАЙНОСТІ

Висота рослини	вище середньої
Цвітіння	середньо-раннє

ДОДАТКОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рекомендовані зони вирощування	Полісся Лісостеп Степ
--------------------------------	-----------------------------

ДАЙНЕМІК



Гібрид ДАЙНЕМІК є флагманом унікального покоління гібридів від компанії ДСВ. Гібрид є мультирезистентним. В його основі лежить поєднання генетичної стійкості до жовтого вірусу турнепсу TuYV та стійкості до фомозу, на основі гену RLM-7. Таке поєднання забезпечує гібриду можливість безперешкодного транспортування асимілянтів від листя до квіток і стручків, протягом всього періоду вегетації, навіть за несприятливих умов.



ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Оригігатор	DSV	Група стиглості	Середньо-стиглий
------------	-----	-----------------	------------------



АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Олійність	9	Розвиток навесні	7
Зимостійкість	8	Стійкість до вилягання	9
Посухостійкість	9	Ранній посів	8
Розвиток восени	5	Пізній посів	8



ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ

Фомоз	9	Склеротиніоз/ Біла гниль	8
Вертицильоз	8		



ГЕНЕТИЧНА СТІЙКІСТЬ

Стійкість до розтріскування стручків	9	Стійкість до жовтого вірусу турнепсу(TuYV)	9
--------------------------------------	---	--	---



ПЕРЕВАГИ

- **Глибоко проникаюча** коренева система та надзвичайна посухостійкість;
- **Придатний** до пізніх термінів сівби;
- **Швидкий весняний розвиток** навіть в умовах холодної весни;
- **Стійкий** до фомозу RLM-7;
- **Стійкість** до розтріскування стручків PSR.

МОРФОЛОГІЯ ТА СТРУКТУРА ВРОЖАЙНОСТІ

Висота рослини

висока

Цвітіння

середньо-пізніє

ДОДАТКОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рекомендовані зони вирощування

Полісся
Лісостеп

ДАЛТОН



Створюючи модель потужного гібриду, селекціонерам вдалось зробити унікальне поєднання, генетично заклавши в ньому ознаку **контрольованого утворення біомаси**. ДАЛТОН має середній за розміром листовий апарат, який не затінює стебло під час дозрівання і забезпечує швидке його здерев'яніння, що є особливо важливим для пізньостиглої групи гібридів.



ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Оригігатор

DSV

Група стиглості

Середньо-пізній



АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Олійність



Розвиток навесні



Зимостійкість



Стійкість до вилягання



Посухостійкість



Ранній посів



Розвиток восени



Пізній посів



ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ

Фомоз



Вертицильоз



Склеротиніоз/
Біла гниль



ГЕНЕТИЧНА СТІЙКІСТЬ

Стійкість до розтріскування стручків



Стійкість до жовтого вірусу турнепсу (TuYV)





ПЕРЕВАГИ

- **Стійкість** до жовтого вірусу турнепсу TuYV;
- **Стійкість** до фомозу Rlm S;
- **Адаптивний** до зон вирощування;
- **Ефективне** використання азоту;
- **Активне** наростання листової маси та **швидке** закриття поверхні ґрунту.

МОРФОЛОГІЯ ТА СТРУКТУРА
ВРОЖАЙНОСТІ

Висота рослини	вище середньої
Цвітіння	середнє

ДОДАТКОВІ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рекомендовані зони вирощування	Полісся Лісостеп Степ
--------------------------------	-----------------------------

ДОМІНАТОР



В даному гібриді поєднана генетичну стійкість до фомозу, за рахунок гену APR 37 та стійкість до жовтого вірусу турнепсу (TuYV), що надає нам еталонний рівень польової стійкості. Завдяки такій мультирезистентності і, як наслідок, за рахунок повноцінної активної роботи фотосинтетичного апарату протягом всієї вегетації, ДОМІНАТОР повністю розкриває свій потенціал, мінімізуючи при цьому вплив стресових факторів на рослину.



ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Оригінатор	DSV	Група стиглості	Середньо-ранній
------------	-----	-----------------	-----------------



АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Олійність	 8	Розвиток навесні	 6
Зимостійкість	 8	Стійкість до вилягання	 9
Посухостійкість	 9	Ранній посів	 7
Розвиток восени	 7	Пізній посів	 7



ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ

Фомоз	 9	Склеротиніоз/ Біла гниль	 8
Вертицильоз	 8		



ГЕНЕТИЧНА СТІЙКІСТЬ

Стійкість до розтріскування стручків	 7	Стійкість до жовтого вірусу турнепсу(TuYV)	 9
--------------------------------------	---	--	---



ПРИНЦ



ПЕРЕВАГИ

- Гібрид генетики **нового** покоління;
- Стійкий** до вірусу пожовтіння турнепсу (TuYV);
- Компактного типу, **з високою ефективністю** засвоєння азотного живлення;
- Не схильний** до вилягання, архітектура рослин забезпечує рівномірність освітлення стручків всіх ярусів дозрівання;
- Характеризується **раннім** цвітінням та дозріванням.

МОРФОЛОГІЯ ТА СТРУКТУРА ВРОЖАЙНОСТІ

Висота рослини низька

Цвітіння раннє

ДОДАТКОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рекомендовані зони вирощування Полісся Лісостеп



ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Оригінатор	DSV	Група стиглості	Ранньо-стиглий
------------	-----	-----------------	----------------



АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Олійність		Розвиток навесні	
Зимостійкість		Стійкість до вилягання	
Посухостійкість		Ранній посів	
Розвиток восени		Пізній посів	



ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ

Фомоз		Склеротиніоз/ Біла гниль	
Вертицильоз			



ГЕНЕТИЧНА СТІЙКІСТЬ

Стійкість до розтріскування стручків		Стійкість до жовтого вірусу турнепсу (TuYV)	
--------------------------------------	--	---	--



ПЕРЕВАГИ

- **Гібрид нового покоління** зі стійкістю до вірусу пожовтіння турнепсу (TuYV);
- Має **високу** польову стійкість до основних хвороб (вертицильоз, циліндроспоріоз та фомоз);
- Характеризується **швидким** осіннім розвитком, але не виносить точки росту восени;
- Забезпечує **оптимальний** розвиток розетки листя в осінній період та високі показники морозостійкості;
- **Середні** темпи відновлення вегетації навесні;
- **Середньораннє** цвітіння, **швидкий** налив зерна в стручках та **синхронність** їх дозрівання.

МОРФОЛОГІЯ ТА СТРУКТУРА ВРОЖАЙНОСТІ

Висота рослини	висока
----------------	--------

Цвітіння	середньо-раннє
----------	----------------

ДОДАТКОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рекомендовані зони вирощування	Полісся Лісостеп Степ
--------------------------------	-----------------------------

ТЕМПТЕЙШН



Темптейшн як продукт нового покоління гібридів озимого ріпаку, поєднує у своєму генотипі ряд господарсько-цінних ознак з генетичною стійкістю до жовтого вірусу турнепсу (TuYV). Стійкість до вірусу TuYV дає можливість рослині забезпечити повноцінний осінній розвиток розетки листків, накопичити достатню кількість пластичних речовин для перезимівлі та закласти оптимальну кількість зародкових бруньок, які будуть визначати рівень майбутньої високої та стабільної урожайності в різних умовах.



ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Оригінатор

DSV

Група стиглості

Середньо-стиглий



АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Олійність



Розвиток навесні



Зимостійкість



Стійкість до вилягання



Посухостійкість



Ранній посів



Розвиток восени



Пізній посів



ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ

Фомоз



Вертицильоз

Склеротиніоз/
Біла гниль

ГЕНЕТИЧНА СТІЙКІСТЬ

Стійкість до розтріскування стручків



Стійкість до жовтого вірусу турнепсу (TuYV)





ПЕРЕВАГИ

- Висока зимостійкість;
- Стійкий до комплексу хвороб;
- Володіє морфологічними ознаками **стійкості** до шкідників;
- Надзвичайно **стійкий** до бактеріозу;
- Синхронізація** дозрівання стебла та стручків;
- Здатен розвивати **потужний** асиміляційний апарат.

МОРФОЛОГІЯ ТА СТРУКТУРА ВРОЖАЙНОСТІ

Висота рослини	висока
Цвітіння	середньо-раннє

ДОДАТКОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рекомендовані зони вирощування	Полісся Лісостеп Степ
--------------------------------	-----------------------------

ТІГРІС



Завдяки значній селекційній роботі в гібриді ТІГРІС поєднано ряд **ключових для умов України ознак**. На генетичному рівні закріплена стійкість до фомозу (RLM-7) та стійкість до розтріскування стручків (PSR). ТІГРІС має потужну кореневу систему, що є основою його доброї придатності до вирощування в посушливих умовах та адаптивності до різних типів ґрунтів. Окремо потрібно відзначити інтенсивний осінній розвиток, який унікально поєднано з невисокою схильністю до видовження точки росту.



ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Оригінатор	DSV	Група стиглості	Середньо-стиглий
------------	-----	-----------------	------------------



АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Олійність	8	Розвиток навесні	8
Зимостійкість	8	Стійкість до вилягання	8
Посуhostійкість	8	Ранній посів	8
Розвиток восени	9	Пізній посів	7



ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ

Фомоз	9	Склеротиніоз/ Біла гниль	8
Вертицильоз	7		



ГЕНЕТИЧНА СТІЙКІСТЬ

Стійкість до розтріскування стручків	9	Стійкість до жовтого вірусу турнепсу (TuYV)	6
--------------------------------------	---	---	---



ПЕРЕВАГИ

- **Стійкість** до жовтого вірусу турнепсу TuYV;
- **Стійкість** до фомозу RLM-7;
- **Стійкість** до розтріскування стручків PSR;
- **Ефективне** використання азоту;
- **Полева толерантність** до вертицильозу та циліндроспоріозу.

МОРФОЛОГІЯ ТА СТРУКТУРА ВРОЖАЙНОСТІ

Висота рослини	вище середньої
Цвітіння	раннє

ДОДАТКОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рекомендовані зони вирощування	Полісся Лісостеп Степ
--------------------------------	-----------------------------

ДЮК



Гібрид Дюк органічно доповнює лінійку озимих ріпаків ДСВ, демонструючи відмінні результати врожайності в різних ґрунтово-кліматичних зонах України та Європи. Гібриду характерний швидкий розвиток надземної та підземної частини рослин, завдяки цьому можна розширити вікно посіву ріпаку до більш пізніх термінів. В перші 45 днів вегетації закладається особливо потужна коренева система, відбувається активне наростання надземної маси, рослина формує масивну розетку листя з великою кількістю зародкових бруньок.



ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Оригінатор	DSV	Група стиглості	Середньо-ранній
------------	-----	-----------------	-----------------



АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Олійність		Розвиток навесні	
Зимостійкість		Стійкість до вилягання	
Посухостійкість		Ранній посів	
Розвиток восени		Пізній посів	



ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ

Фомоз		Склеротиніоз/ Біла гниль	
Вертицильоз			



ГЕНЕТИЧНА СТІЙКІСТЬ

Стійкість до розтріскування стручків		Стійкість до жовтого вірусу турнепсу(TuYV)	
--------------------------------------	--	--	--



ПЕРЕВАГИ

- Високий потенціал врожайності;
- Синхронне дозрівання стручків та стебел;
- Генетична стійкість до Кили Капусти;
- Висока стійкість до вилягання;
- Швидкий налив зерна;
- Раннє цвітіння та дозрівання.

МОРФОЛОГІЯ ТА СТРУКТУРА ВРОЖАЙНОСТІ

Висота рослини середня

Цвітіння раннє

ДОДАТКОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рекомендовані зони вирощування Полісся

КРОКОДИЛ



Гібрид Крокодил КР має генетичну стійкість до Кили Капусти (Clubroot) – хвороби, яка активно поширюється останніми роками. В Європі кила капусти поширена на загальній площі близько 4% і вона щороку зростає, адже активне переміщення техніки та ґрунтообробних знарядь між полями, насичення сівозміни хрестоцвітними культурами та наявність хрестоцвітних бурянів сприяє активному поширенню хвороби. Останніми роками кила капусти постійно завдає значної шкоди посівам і в умовах Західної України.



ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Оригінатор

DSV

Група стиглості

Середньо-стиглий



АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Олійність



Розвиток навесні



Зимостійкість



Стійкість до вилягання



Посухостійкість



Ранній посів



Розвиток восени



Пізній посів



ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ

Фомоз



Вертицильоз



Склеротиніоз/
Біла гниль



ГЕНЕТИЧНА СТІЙКІСТЬ

Стійкість до розтріскування стручків



Стійкість до жовтого вірусу турнепсу (TuYV)





ПЕРЕВАГИ

- Високий потенціал врожайності;
- Компенсаційний потенціал;
- Активний осінній розвиток та **потужна** коренева система;
- Стійкість до розтріскування стручків.

ВЕРІТАС КЛ



Clearfield
Вирощування соєвих культур



Потужна коренева система ВЕРІТАС КЛ забезпечує вражаючий старт та еталонний осінній розвиток. В поєднанні з хорошою зимостійкістю дає змогу значно розширити вікно посіву, що особливо важливо для реалії вирощування Південного Степу. Помірний ріст стебла на ранніх етапах весняного відновленні вегетації, що характерний даному гібриду, мінімізує ризики пошкодження приморозками і доповнює адаптованість гібриду до континентальних умов вирощування. Завдяки даним ознакам з моменту виходу на ринок України в 2014 р. і до сьогодні ВЕРІТАС КЛ займає лідируючі позиції в сегменті Clearfield®.



ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Оригіатор	DSV	Група стиглості	Середньо-пізній
-----------	-----	-----------------	-----------------



АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Олійність		Розвиток навесні	
Зимостійкість		Стійкість до вилягання	
Посухостійкість		Ранній посів	
Розвиток восени		Пізній посів	



ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ

Фомоз		Склеротиніоз/ Біла гниль	
Вертицильоз			



ГЕНЕТИЧНА СТІЙКІСТЬ

Стійкість до розтріскування стручків		Стійкість до жовтого вірусу турнепсу(TuYV)	
--------------------------------------	--	--	--

МОРФОЛОГІЯ ТА СТРУКТУРА ВРОЖАЙНОСТІ

Висота рослини	висока
Цвітіння	середньо-пізнє

ДОДАТКОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рекомендовані зони вирощування	Полісся Лісостеп Степ
--------------------------------	-----------------------------



ПЕРЕВАГИ

- **Пластичний** до природно-кліматичних умов вирощування;
- **Стабільні та високі** показники продуктивності;
- **Висока** зимостійкість;
- **Помірний** весняний розвиток;
- **Стійкий** до посушливих умов та розтріскування стручків;
- **Середньостійкий** до вилягання;
- **Толерантний** до фомозу.

МОРФОЛОГІЯ ТА СТРУКТУРА ВРОЖАЙНОСТІ

Висота рослини	вище середньої
Цвітіння	середнє

ДОДАТКОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рекомендовані зони вирощування	Полісся Лісостеп Степ
--------------------------------	-----------------------------

ЕДІМАКС КЛ



Едімакс КЛ гібрид середньораннього-середньостиглого дозрівання з раннім цвітінням і дозріванням. У сортовипробуваннях забезпечував високі і стабільні врожаї. Гібрид ніколи не показував значних коливань врожайності, що свідчить про високий рівень факторів, що стабілізують врожайність. У багатьох дослідках гібрид показав високу зимостійкість у безсніжні періоди з непоодинокими випадками, коли на дослідках залишалося 10% ділянок серед них був Едімакс КЛ. Швидкий осінній старт і високий рівень регенерації дозволяв відновлюватися навіть при сильних пошкодженнях.



ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Оригіатор	DSV	Група стиглості	Середньо-ранній
-----------	-----	-----------------	-----------------



АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Олійність	8	Розвиток навесні	9
Зимостійкість	8	Стійкість до вилягання	7
Посуhostійкість	9	Ранній посів	6
Розвиток восени	7	Пізній посів	9



ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ

Фомоз	8	Склеротиніоз/ Біла гниль	6
Вертицильоз	6		



ГЕНЕТИЧНА СТІЙКІСТЬ

Стійкість до розтріскування стручків	8	Стійкість до жовтого вірусу турнепсу (TuYV)	6
--------------------------------------	---	---	---



ПЕРЕВАГИ

- Висока польова толерантність до Вертицильозу та Циліндроспоріозу;
- Зберігає **максимальне** здоров'я протягом всього періоду вегетації та має виражений «стейгрін»-ефект;
- Придатність для виробничої системи Clearfield.

МОРФОЛОГІЯ ТА СТРУКТУРА ВРОЖАЙНОСТІ

Висота рослини	висока
Цвітіння	середньо-раннє

ДОДАТКОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рекомендовані зони вирощування	Полісся Лісостеп Степ
--------------------------------	-----------------------------

СІМПЛЕКС КЛ



Clearfield
Виробнича система для ріпаку



СІМПЛЕКС КЛ – це новий гібрид від ДСВ, придатний для виробничої системи **Clearfield**. З метою полегшення вирощування культури в короткоротаційних сівозмінах з високим насиченням ріпаку в структурі посіву, селекціонери ДСВ поєднали в СІМПЛЕКС КЛ генетичну стійкість до фомозу на основі гену RLM-7 та високу польову толерантність до основних хвороб насичених сівозмін - Вертицильозу та Циліндроспоріозу. Завдяки наявним стійкостям, гібрид зберігає максимальне здоров'я протягом всього періоду вегетації та має виражений «стейгрін»-ефект.



ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Оригінатор	DSV	Група стиглості	Середньо-пізній
------------	-----	-----------------	-----------------



АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Олійність	 8	Розвиток навесні	 7
Зимостійкість	 9	Стійкість до вилягання	 9
Посухостійкість	 8	Ранній посів	 6
Розвиток восени	 9	Пізній посів	 9



ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ

Фомоз	 9	Склеротиніоз/ Біла гниль	 8
Вертицильоз	 8		



ГЕНЕТИЧНА СТІЙКІСТЬ

Стійкість до розтріскування стручків	 9	Стійкість до жовтого вірусу турнепсу (TuYV)	 6
--------------------------------------	---	---	---



ПЕРЕВАГИ

- Високий потенціал врожайності та олійності;
- Генетична стійкість до жовтого вірусу турнепсу TuYV;
- Висока польова толерантність до склеротинії, вертицильозу і фомозу;
- Здатність насіння до **активного розвитку** при високій температурі ґрунту;
- Активний** осінній розвиток та потужна коренева система;
- Адаптивність** до всіх зон вирощування.

МОРФОЛОГІЯ ТА СТРУКТУРА ВРОЖАЙНОСТІ

Висота рослини	висока
Цвітіння	середньо-раннє

ДОДАТКОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рекомендовані зони вирощування	Полісся Лісостеп Степ
--------------------------------	-----------------------------

ДАКТАРІ

New



Лідер по врожайності та найвищому виходу олії за результатами дворічних даних після реєстраційних випробувань в Німеччині тепер і в Україні.

Еталонний осінній розвиток, активне відростання біомаси весною, збалансована архітектура рослини та ефективне використання азоту забезпечують надзвичайно високу стабільність гібриду. Унікальною особливістю гібриду є також здатність до проростання навіть за умови високих температур ґрунту. Дактарі є гібридом нового покоління і демонструє високі показники здоров'я рослин протягом усієї вегетації.



ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Оригінатор	DSV	Група стиглості	Середньо-ранній
------------	-----	-----------------	-----------------



АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Олійність		Розвиток навесні	
Зимостійкість		Стійкість до вилягання	
Посухостійкість		Ранній посів	
Розвиток восени		Пізній посів	



ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ

Фомоз		Склеротиніоз/ Біла гниль	
Вертицильоз			



ГЕНЕТИЧНА СТІЙКІСТЬ

Стійкість до розтріскування стручків		Стійкість до жовтого вірусу турнепсу(TuYV)	
--------------------------------------	--	--	--



ПЕРЕВАГИ

- **Стійкість** до жовтого вірусу турнепсу TuYV;
- **Швидкий** старт і розвиток на ранніх етапах, надземної та підземної частини рослини;
- **Відмінна** пристосованість для вирощування в усіх ґрунтово-кліматичних зонах;
- **Придатність** для виробничої системи Clearfield.

МОРФОЛОГІЯ ТА СТРУКТУРА ВРОЖАЙНОСТІ

Висота рослини	висока
Цвітіння	середнє

ДОДАТКОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рекомендовані зони вирощування	Полісся Лісостеп Степ
--------------------------------	-----------------------------

БЕАТРІКС КЛ

New



Clearfield
Виробнича система для урожаю



В гібриді Беатрікс КЛ компанія ДСВ однією з перших на ринку України пропонує аграріям унікальну комбінацію високої врожайності та набору генетичних стійкостей до жовтого вірусу турнепсу(TuYV), фомозу(RLM7) та стійкістю до розтріскування стручків (PSR). Беатрікс КЛ є одним з найбільш ранніх по дозріванню гібридів у виробничій системі Clearfield® серед гібридів ДСВ і в поєднання з активним осіннім розвитком, раннім цвітінням та високою посухостійкістю забезпечує високу адаптивність та придатність для посіву у різних ґрунтово-кліматичних зонах.



ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Оригінатор	DSV	Група стиглості	Середньо-стиглий
------------	-----	-----------------	------------------



АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Олійність	 8	Розвиток навесні	 6
Зимостійкість	 9	Стійкість до вилягання	 9
Посухостійкість	 8	Ранній посів	 7
Розвиток восени	 8	Пізній посів	 6



ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ

Фомоз	 9	Склеротиніоз/ Біла гниль	 8
Вертицильоз	 8		



ГЕНЕТИЧНА СТІЙКІСТЬ

Стійкість до розтріскування стручків	 9	Стійкість до жовтого вірусу турнепсу(TuYV)	 9
--------------------------------------	---	--	---



ПЕРЕВАГИ

- **Стійкість** до жовтого вірусу турнепсу TuYV;
- **Високостійкий** до фомозу, циліндроспориозу, вертицильозного в'янення;
- **Синхронізація** дозрівання стебла та стручків, оптимальний розвиток;
- **Добра** зимостійкість та посухостійкість.

МОРФОЛОГІЯ ТА СТРУКТУРА ВРОЖАЙНОСТІ

Висота рослини середня

Цвітіння раннє

ДОДАТКОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рекомендовані зони вирощування Полісся Лісостеп Степ

МАТРІКС КЛ

New



Вихід на ринок Матрікс КЛ - це значний прорив у селекційному процесі. Гібрид значно розширює можливості вирощування культури озимого ріпаку в сівозміні господарств. Генетична стійкість до жовтого вірусу турнепсу TuYV забезпечує безперешкодний транспорт асимілянтів у процесі фотосинтезу, RLM7 стійкість до фомозу дає можливість висіву у короткоротаційних сівозмінах, а PSR стійкість до розтріскування стручків зберігає врожай у період дозрівання. Матрікс КЛ характеризується потужним осіннім розвитком.



ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Оригінатор

DSV

Група стиглості

Середньо-стиглий



АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Олійність



Розвиток навесні



Зимостійкість



Стійкість до вилягання



Посухостійкість



Ранній посів



Розвиток восени



Пізній посів



ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ

Фомоз



Вертицильоз



Склеротиніоз/ Біла гниль



ГЕНЕТИЧНА СТІЙКІСТЬ

Стійкість до розтріскування стручків



Стійкість до жовтого вірусу турнепсу (TuYV)





ПЕРЕВАГИ

- **Вражаючі** показники адаптивності та врожайності;
- **Середньораннє** відновлення вегетації та цвітіння;
- **Стійкість** до TuYV (вірус жовтухи турнепсу);
- **Висока** зимостійкість;
- За рахунок потужного гілкування **швидко** затінює бур'яни, запобігає випаровуванню вологи;
- **Відмінно** підходить для широкорядних посівів.

МОРФОЛОГІЯ ТА СТРУКТУРА ВРОЖАЙНОСТІ

Висота рослини	висока
Цвітіння	середньо-раннє

ДОДАТКОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рекомендовані зони вирощування	Полісся Лісостеп Степ
--------------------------------	-----------------------------

АБСОЛЮТ



Середньостиглий гібрид нового покоління з високими показниками продуктивності. Має в своєму арсеналі поєднання таких характеристик як стійкість до ВЖТ (вірус жовтухи турнепсу), ген стійкості до фомозу RLM7, стійкість до розтріскування стручків, а також високу зимостійкість. За рахунок потужного гілкування швидко затінює бур'яни і запобігає випаровуванню вологи. Відмінно підходить для широкорядних посівів.



ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Оригінатор	Limagrain	Група стиглості	Середньо-стиглий
------------	-----------	-----------------	------------------



АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Олійність	8	Розвиток навесні	8
Зимостійкість	9	Стійкість до вилягання	8
Посухостійкість	8	Ранній посів	3
Розвиток восени	8	Пізній посів	8



ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ

Фомоз	9	Склеротиніоз/ Біла гниль	8
Вертицильоз	6		



ГЕНЕТИЧНА СТІЙКІСТЬ

Стійкість до розтріскування стручків	9	Стійкість до жовтого вірусу турнепсу (TuYV)	8
--------------------------------------	---	---	---



ПЕРЕВАГИ

- Дуже добра зимостійкість;
- Стійкість до розтріскування стручків;
- Толерантний до фомозу;
- Дуже добре гілкування;
- Толерантний до видовження кореневої шийки восени;
- Толерантний до посушливих умов, навесні пластичний до строків висіву.

МОРФОЛОГІЯ ТА СТРУКТУРА ВРОЖАЙНОСТІ

Висота рослини	середня
Цвітіння	середньо-раннє

ДОДАТКОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рекомендовані зони вирощування	Полісся Лісостеп
--------------------------------	---------------------

АЛЕКСАНДЕР



Александр - гібрид, що має відмінні показники стресостійкості. Александр володіє геном стійкості до фомозу RLM7. Середньоранній гібрид, характеризується придатністю, як для оптимальних так і для ранніх та надранніх строків посіву. Має середнє середньопізнє відновлення вегетації.



ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ



АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Олійність	9	Розвиток навесні	7
Зимостійкість	9	Стійкість до вилягання	8
Посухостійкість	8	Ранній посів	8
Розвиток восени	7	Пізній посів	6



ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ

Фомоз	9	Склеротиніоз/ Біла гниль	6
Вертицильоз	7		



ГЕНЕТИЧНА СТІЙКІСТЬ

Стійкість до розтріскування стручків	9
--------------------------------------	---



ПЕРЕВАГИ

- Високоврожайний гібрид інтенсивного типу;
- Підходить як для звичайних так і для широкорядних посівів;
- Висока стабільність в посушливих умовах;
- Висока толерантність до фомозу (RLM7);
- Висока толерантність до вертицильозу.

МОРФОЛОГІЯ ТА СТРУКТУРА ВРОЖАЙНОСТІ

Висота рослини	середня
Цвітіння	середньо-раннє

ДОДАТКОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рекомендовані зони вирощування	Полісся Лісостеп Степ
--------------------------------	-----------------------------

КАРЛТОН КЛ



Clearfield
Виробники сепараторів для рису



Карлтон КЛ - високоврожайний гібрид інтенсивного типу. Відмінне поєднання селекційних досягнень для виробничої системи Clearfield®. Гібрид чудово адаптувався по всій Європі, а також у континентальних умовах України. Відмінний гібрид для посушливих умов вирощування.



ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Оригінатор	Limagrain	Група стиглості	Середньо-ранній
------------	-----------	-----------------	-----------------



АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Олійність	 8	Розвиток навесні	 6
Зимостійкість	 9	Стійкість до вилягання	 8
Посухостійкість	 8	Ранній посів	 6
Розвиток восени	 9	Пізній посів	 8



ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ

Фомоз	 9	Склеротиніоз/ Біла гниль	 8
Вертицильоз	 7		



ГЕНЕТИЧНА СТІЙКІСТЬ

Стійкість до розтріскування стручків	 8
--------------------------------------	---



ПЕРЕВАГИ

- **Максимальна** реалізація потенціалу у всіх зонах вирощування;
- **Висока** стійкість до вилягання навіть при згущенні і на високих фонах азоту;
- **Відмінні** показники зимостійкості серед класичний гібридів;
Висока компенсаторна здатність рослин за рахунок інтенсивного гілкування;
- **Відмінна** стійкість до розтріскування стручків.

МОРФОЛОГІЯ ТА СТРУКТУРА ВРОЖАЙНОСТІ

Висота рослини	висока
Цвітіння	раннє

ДОДАТКОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рекомендовані зони вирощування	Полісся Лісостеп Степ
--------------------------------	-----------------------------

ДК ЕКСПЕНШН



Гібрид інтенсивного типу, який вдало поєднує високий потенціал продуктивності, високу зимостійкість та стабільність. Підвищена стійкість до осипання насіння та стійкість до хвороб створює ряд технологічних переваг при його вирощуванні. Характеризується високою стійкістю до вилягання навіть при загущенні і на високих фонах азоту.



ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Оригінатор	Dekalb	Група стиглості	Середньо-пізній
------------	--------	-----------------	-----------------



АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Олійність	8	Розвиток навесні	8
Зимостійкість	9	Стійкість до вилягання	9
Посухостійкість	7	Ранній посів	4
Розвиток восени	8	Пізній посів	8



ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ

Фомоз	9	Склеротиніоз/ Біла гниль	8
Вертицильоз	7		



ГЕНЕТИЧНА СТІЙКІСТЬ

Стійкість до розтріскування стручків	8
--------------------------------------	---



ПЕРЕВАГИ

- **Висока** пластичність та адаптивність;
- **Швидкий** розвиток після зими;
- **Висока** зимостійкість та посухостійкість;
- **Висока** стійкість до хвороб;
- **Стійкість** до розтріскування стручків.

МОРФОЛОГІЯ ТА СТРУКТУРА ВРОЖАЙНОСТІ

Висота рослини	висока
Цвітіння	середнє

ДОДАТКОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рекомендовані зони вирощування	Полісся Лісостеп Степ
--------------------------------	-----------------------------

ДК ІМПЛЕМЕНТ КЛ



Високопродуктивний гібрид який максимально реалізує свій потенціал врожайності при інтенсивній технології. Відзначається високою зимостійкістю в групі ІМІ-гібридів, швидким стартовим ростом навесні та високою посухостійкістю. Відмінною ознакою цього гібриду є раннє цвітіння та дозрівання, що дозволяє йому ефективно використовувати продуктивні запаси вологи з ґрунту та швидко звільняти поле для сівби наступної культури.



ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Оригінатор	Dekalb	Група стиглості	Середньо-стиглий
------------	--------	-----------------	------------------



АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Олійність	8	Розвиток навесні	8
Зимостійкість	8	Стійкість до вилягання	8
Посухостійкість	8	Ранній посів	2
Розвиток восени	8	Пізній посів	9



ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ

Фомоз	9	Склеротиніоз/ Біла гниль	8
Вертицильоз	7		



ГЕНЕТИЧНА СТІЙКІСТЬ

Стійкість до розтріскування стручків	8
--------------------------------------	---



ПЕРЕВАГИ

- Гібрид **добре адаптований** до різних типів ґрунтів;
- Має **високий** потенціал продуктивності, який найкраще реалізується в зонах достатнього та нестійкого зволоження;
- Висока** компенсаторна здатність, добре розвивається в широкорядних посівах;
- Широке** «посівне вікно», можливе зміщення строків сівби в сторону більш ранніх.

МОРФОЛОГІЯ ТА СТРУКТУРА ВРОЖАЙНОСТІ

Висота рослини	середня
Цвітіння	пізнь

ДОДАТКОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рекомендовані зони вирощування	Полісся Лісостеп Степ
--------------------------------	-----------------------------

ДК ЕКСПАТ

New



Середньостиглий гібрид, якому властива висока зимостійкість. Має помірні темпи осіннього розвитку. Рослини по висоті компактні, характеризується високим вмістом олії. ДК Експат притаманна висока стійкість до фомозу.



ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Оригінатор	Dekalb	Група стиглості	Середньо-стиглий
------------	--------	-----------------	------------------



АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Олійність	8	Розвиток навесні	7
Зимостійкість	9	Стійкість до вилягання	9
Посухостійкість	9	Ранній посів	8
Розвиток восени	8	Пізній посів	4



ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ

Фомоз	9	Склеротиніоз/ Біла гниль	8
Вертицильоз	8		



ГЕНЕТИЧНА СТІЙКІСТЬ

Стійкість до розтріскування стручків	8
--------------------------------------	---

КОНТАКТИ РЕГІОНАЛЬНИХ УПРАВЛІНЬ

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

м. Київ +380 (44) 536 92 02

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ

м. Вінниця +380 (432) 55 78 14
 м. Іллінці +380 (66) 222 45 53
 смт Вапнярка +380 (432) 50 62 01 (02)

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ

м. Луцьк +380 (332) 70 11 58 (59, 60)

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ

м. Новомосковськ +380 (5696) 9 64 81 (82)
 смт Радушне +380 (56) 409 40 21

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

м. Краматорськ +380 (6264) 7 21 42

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ

м. Житомир +380 (50) 411 21 90

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ

с. Ключарки +380 (3131) 3 18 20

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ

м. Запоріжжя +380 (612) 86 23 53
 м. Бердянськ +380 (66) 222-45-53
 м. Токмак +380 (6178) 4 27 72

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

м. Івано-Франківськ +380 (50) 301 51 64

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ

смт Добровеличівка +380 (5253) 5 23 02
 м. Кропивницький +380 (44) 354 35 69
 м. Олександрія +380 (50) 374 62 43

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ

м. Старобільськ +380 (6461) 2 20 47

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ

смт Запитів +380 (322) 36 21 10 (11, 15)

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

смт. Арбузинка +380 (89) 250 03 01
м. Миколаїв +380 (512) 48 92 00 (01, 02)

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

м. Одеса +380 (48) 790 07 10 (11,12, 13)
с. Чубівка +380 (4862) 97 5 86
м. Ізмаїл +380 (4841) 6 17 81
смт Сарата +380 (4848) 2 29 98

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ

м. Полтава +380 (50) 359 94 58
м. Лубни +380 (95) 275 29 16

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ

м. Рівне +380 (362) 67 17 00

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ

м. Суми +380 (542) 65 12 92
м. Конотоп +380 (95) 286 19 21

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ

с. Довжанка +380 (352) 43 43 46
+380 (352) 43 40 57
+380 (352) 43 80 87

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

м. Балаклія +380 (57) 492 22 23
с. Коротич +380 (57) 766 45 27
м. Лозова +380 (50) 356 49 10

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ

м. Херсон +380 (552) 41 06 90
м. Таврійськ +380 (50) 414 16 37

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ

с. Богданівці +380 (50) 486 71 30
м. Кам'янець-Подільський +380 (3849) 5 07 07

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ

м. Черкаси +380 (472) 64 72 75
м. Умань +380 (4744) 3 90 01 (05)

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

м. Чернівці +380 (372) 57 86 86

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ

м. Чернігів +380 (95) 281 73 74
м. Ічня +380 (4633) 2 52 34

