



ЕРІДОН®
СПІВПРАЦЯ, ЯКА ГАРАНТУЄ УСПІХ

www.eridon.ua

2024

**НАСІННЯ
ЯРИХ КУЛЬТУР**





ПШЕНИЦЯ ЯРА

СОРТ	ОРИГІНАТОР	РІЗНОВИД	ГРУПА СТИГЛОСТІ
Регістана NEW	Selgen	Лютесценс (безостий)	Середньоранній
Лікамеро	Secobra	Лютесценс (безостий)	Середньоранній
Трізо	DSV	Лютесценс (безостий)	Середньостиглий



NEW

РЕГІСТАНА

Стійкий до низьких температур сорт пшениці ярої, рекомендований для дуже ранньої сівби весною або пізньої осені. Компенсаційного типу, поєднує у собі стабільну якість і високу врожайність. Характеризується відмінною стійкістю до основних хвороб та вилягання.



ПЕРЕВАГИ

- високоврожайний сорт
- холодостійкість
- гарна стійкість до основних хвороб
- підвищена стійкість до вилягання та осипання зерна

МОРФОЛОГІЯ ТА СТРУКТУРА ВРОЖАЙНОСТІ

Висота рослини, см



85 - 90

РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА ТА СТРОКИ ВИСІВУ,
млн. шт. насінин на 1 га

Ранні	3,5
Оптимальні	4,0
Пізні	5,0

ДОДАТКОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рекомендовані зони вирощування	Полісся Лісостеп Степ
--------------------------------	-----------------------------



ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Форма



Яра

Тип використання



Хлібопекарський

Група якості

Сильна

Різновид

Лютесценс (безостий)

Група стиглості

Середньоранній



АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Посухостійкість

8

Стійкість до вилягання

8

Стійкість до ламкості стебла

8

Стійкість до осипання

9

Розвиток навесні

9

Інтенсивність кущення

7



СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ

Борошниста роса

8

Кореневі гнилі

8

Септоріоз

8

Фузаріоз колосу

8



ЛІКАМЕРО

Сорт пшениці ярої компенсаційного типу, що характеризується швидким розвитком на ранніх фазах, хорошою стійкістю до вилягання та фузаріозу колосу. Завдяки своїй генетично сформованій стійкості до хвороб показує високі результати урожайності навіть з мінімальним використанням фунгіцидів.



ПЕРЕВАГИ

- інтенсивний сорт з унікальним поєднанням ранньостиглості та високої врожайності
- параметри зерна класу Е (елітний із високим вмістом протеїну) / А (високої якості хліба)
- відмінна стійкість до хвороб, морозо- та зимостійкість роблять цей сорт придатним до посіву пізньої осені (листопад, грудень)

МОРФОЛОГІЯ ТА СТРУКТУРА ВРОЖАЙНОСТІ

Висота рослини, см



75

РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА ТА СТРОКИ ВИСІВУ,
млн. шт. насінин на 1 га

Ранні	4,3-4,5
Оптимальні	4,5-5,0
Пізні	5,0-5,2

ДОДАТКОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рекомендовані зони вирощування	Полісся Лісостеп Степ
--------------------------------	-----------------------------



ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Форма



Яра

Тип використання



Хлібопекарський

Група якості

Сильна

Різновид

Лютесценс (безостий)

Група стиглості

Середньоранній



АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Посуhostійкість

9

Стійкість до вилягання

8

Стійкість до ламкості стебла

8

Стійкість до осипання

8

Розвиток навесні

9

Інтенсивність куцання

8



СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ

Борошниста роса

9

Кореневі гнилі

8

Септоріоз

9

Фузаріоз колосу

9



ПЕРЕВАГИ

- високоврожайний
- стійкий до хвороб та вилягання
- висока натура зерна

МОРФОЛОГІЯ ТА СТРУКТУРА ВРОЖАЙНОСТІ

Висота рослини, см



95

РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА ТА СТРОКИ ВИСІВУ,
млн. шт. насінин на 1 га

Ранні	4,5
Оптимальні	4,6
Пізні	4,7

ДОДАТКОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рекомендовані зони вирощування	Полісся Лісостеп
-----------------------------------	---------------------

ТРІЗО

Сорт ярої м'якої пшениці, що поєднав у собі стабільну якість і високу врожайність, добру стійкість до основних хвороб листя та колосу. Прекрасно підходить для ультрараннього висіву, що дає можливість зменшити ризики посухи в традиційні посівні строки, і отримати набагато розвинутішу кореневу систему та листовий апарат. Через максимальне використання фотосинтезу, наближає врожайність до озимих сортів.



ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Форма



Яра

Тип використання



Хлібопекарський

Група якості

Сильна

Різновид

Лютесценс (безостий)

Група стиглості

Середньостиглий



АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Посухостійкість

7

Стійкість до вилягання

7

Стійкість до ламкості стебла

7

Стійкість до осипання

9

Розвиток навесні

9

Інтенсивність кущення

7



СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ

Борошниста роса

8

Кореневі гнилі

8

Септоріоз

7

Фузаріоз колосу

7



ЯЧМІНЬ ЯРИЙ

СОРТ	ОРИГІНАТОР	РІЗНОВИД	ГРУПА СТИГЛОСТІ
Гуллівер	Secobra	Нутанс (дворядний колос)	Середньоранній
Перспект NEW	Sejet	Нутанс (дворядний колос)	Середньостиглий



ПЕРЕВАГИ

- високий рівень урожайності
- дуже міцне стебло
- пластичність до умов вирощування
- надзвичайна стійкість до вилягання

МОРФОЛОГІЯ ТА СТРУКТУРА ВРОЖАЙНОСТІ

Висота рослини, см



60

Вміст білку, %

10

ДОДАТКОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рекомендована норма висіву, млн. шт. насінин на 1 га

3,5-4,5

Рекомендовані зони вирощування

Полісся, Лісостеп
Степ



СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ

Бура іржа

8

Карликова іржа

7

Борошниста роса

7

Сітчаста плямистість

8

ГУЛЛІВЕР

Новинка на ринку Європи та України. Сорт з генетично підвищеним рівнем урожайності з коротким та міцним стеблом. Характеризується високою стійкістю до вилягання та до ламкості стебла. Середньоранній із відмінною стійкістю до хвороб. Сорт Гуллівер містить генетику найкращих сортів ячменю європейської селекції Шанді та Ірина.



ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Форма



Ярий

Тип використання



Фуражний



Пивоварний

Різновид

Нутанс

(дворядний колос)

Група стиглості

Середньоранній



АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Посухостійкість

8

Стійкість до вилягання

9

Розвиток навесні

8

Стійкість до ламкості стебла

9

Стійкість до ламкості колоса

8

Інтенсивність кущення

7



СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ

Ринхоспоріоз

8

Гельмінтоспоріоз

7

Сажка

8

ВЖКЯ

8



Sejet®
plant breeding



ПРОСПЕКТ NEW

Новий сорт на ринку. Ярий ячмінь, який стабільно демонструє високу врожайність в усіх зонах вирощування. Має високу стійкість до ламкості стебла та вилягання, а також високу стійкість до хвороб. Сорт був створений на основі схрещування сортів KWS IRINA та OVERTURE.

ЯЧМІНЬ



ПЕРЕВАГИ

- міцне коротке стебло
- відмінна стійкість до хвороб
- пластичність до умов вирощування
- відмінна якість солоду при переробці

МОРФОЛОГІЯ ТА СТРУКТУРА ВРОЖАЙНОСТІ

Висота рослини, см



70

Вміст білку, %

9

ДОДАТКОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рекомендована норма висіву, 3,0 - 4,0
млн. шт. насінин на 1 га

Рекомендовані зони
вирощування

Полісся, Лісостеп
Степ



СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ

Бура іржа

8

Карликова іржа

7

Борошниста роса

7

Сітчаста плямистість

8



ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Форма



Ярий

Тип використання



Пивоварний

Різновид

Нутанс
(дворядний колос)

Група стиглості

Середньостиглий



АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Посухостійкість

8

Стійкість до вилягання

8

Розвиток навесні

8

Стійкість до ламкості стебла

9

Стійкість до ламкості колоса

8

Інтенсивність кущення

8



СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ

Ринхоспоріоз

8

Гельмінтоспоріоз

7

Сажка

8

ВЖКЯ

8



СОЯ



Індетермінантний



Напівдетермінантний

СОРТИ СОЇ

НАЗВА СОРТУ	ГРУПА СТИГЛОСТІ	ОРИГІНАТОР НАСІННЯ	ВИГЛЯД НАСІНИНИ	ВИД
МОЦАРТ	000, ДУЖЕ РАННІЙ	DSV		
ГАЛЛЕК	000, ДУЖЕ РАННІЙ	DSV		
АМАДЕА	000, ДУЖЕ РАННІЙ	Saatbau		
ЕС КОМАНДОР	000, ДУЖЕ РАННІЙ	Lidea		
ЕВЕРЕСТ NEW	00, РАННІЙ	DSV		
ВІНДЗОР NEW	00, РАННІЙ	DSV		
ЕС МЕНТОР	00, РАННІЙ	Lidea		



ПЕРЕВАГИ

- унікальне поєднання ранньостиглості та високої врожайності
- добра стійкість до розтріскування
- сорт здатний формувати зерно з високою масою тисячі насінин
- високе кріплення нижніх бобів від 10 до 13 см, синхронність дозрівання бобів на рослині, стійкість до розтріскування та вилягання

МОРФОЛОГІЯ ТА СТРУКТУРА ВРОЖАЙНОСТІ

Висота рослини, см  75

Висота кріплення
нижнього боба, см  13

Кількість теплових од. СНУ 2350

Вміст білку, % 42,5

Вміст олії, % 20

ДОДАТКОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рекомендована норма
висіву, тис. шт. насінин/га 550-650

Рекомендована густота рослин
на момент збирання, тис./га 500

Рекомендовані зони
вищущування Полісся
Лісостеп

МОЦАРТ

Ультраранній сорт сої створений схрещенням сортів Європейської та Канадської генетики, який поєднав в собі активний початковий ріст, високий показник врожайності та протеїну.



ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Група стиглості	000 (дуже ранній)
Тип росту	Напівдетермінантний
Веgetаційний період, дн.	90-95
Кількість днів сходи-цвітіння	44 080
Насіннева оболонка	Жовта
Інтенсивність пігментації	Без пігментації
Рубчик	Білий
Опушення бобів та стебла	Коричневе
Квітка	Фіолетова



АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Енергія початкового розвитку	8 010
Здатність до галузнення	7 010
Стійкість до вилягання	8 010
Стійкість до розтріскування	9 010



СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ

Склеротиніоз	9 010
Бактеріоз	6 010
Пероноспороз	8 010
Вірусні хвороби	8 010



ГАЛЛЕК

Найуспішніший сорт сої по рівню та стабільності врожаю у ранній групі, який рівняється по врожайності до середньостиглих сортів. Сорт Галлек завжди показував рівномірне досягання і високу стійкість до розтріскування навіть при пізнішому комбайнуванні.



ПЕРЕВАГИ

- насінина з білим рубчиком
- стабільна, висока врожайність
- стійкий до вилягання та комплексу хвороб
- відмінна стійкість до розтріскування

МОРФОЛОГІЯ ТА СТРУКТУРА ВРОЖАЙНОСТІ

Висота рослини, см		70
Висота кріплення нижнього боба, см		13
Кількість теплових од. СHU		2400
Вміст білку, %		43
Вміст олії, %		20

ДОДАТКОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рекомендована норма висіву, тис. шт. насінин/га	500-650
Рекомендована густина рослин на момент збирання, тис./га	500
Рекомендовані зони вирощування	Полісся Лісостеп



ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Група стиглості	000 (дуже ранній)
Тип росту	Індетермінантний
Веgetаційний період, дн.	90-95
Кількість днів сходи-цвітіння	45 080
Насіннева оболонка	Жовта
Інтенсивність пігментації	Без пігментації
Рубчик	Білий
Опушення бобів та стебла	Світло-коричневе
Квітка	Фіолетова
Біб	Світло-коричневий



АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Енергія початкового розвитку	8 010
Здатність до галузнення	7 010
Стійкість до вилягання	8 010
Стійкість до розтріскування	9 010



СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ

Склеротиніоз	8 010
Бактеріоз	7 010
Пероноспороз	6 010
Вірусні хвороби	7 010



ПЕРЕВАГИ

- генетично досконалий, високоврожайний сорт
- стійкий до вилягання та осипання
- стабільна продуктивність

МОРФОЛОГІЯ ТА СТРУКТУРА ВРОЖАЙНОСТІ

Висота рослини, см



75

Висота кріплення
нижнього боба, см



14

Кількість теплових од. СHU 2450

Вміст білку, % 43

Вміст олії, % 21

ДОДАТКОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рекомендована норма висіву, тис. шт. насінин/га 600

Рекомендована густина рослин на момент збирання, тис./га 550

Рекомендовані зони вирощування Лісостеп
Степ

АМАДЕА

Ультраранній сорт з ідеально збалансованими показниками врожайності та протеїну. Флагман серед сортів Saatbau.



ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Група стиглості	000 (дуже ранній)
Тип росту	Індетермінантний
Веgetаційний період, дн.	95
Кількість днів сходи-цвітіння	50
Насіннева оболонка	Жовта
Інтенсивність пігментації	Без пігментації
Рубчик	Білий
Опушення бобів та стебла	Світло-коричневе
Квітка	Фіолетова
Біб	Світло-коричневий



АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Енергія початкового розвитку	8
Здатність до галузнення	7
Стійкість до вилягання	9
Стійкість до розтріскування	8



СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ

Склеротиніоз	7
Бактеріоз	8
Пероноспороз	7
Вірусні хвороби	7



Lidea
NOVE SŁET DLA AGROBIZNESU



ЕС КОМАНДОР

Напівдeterminантний сорт сої лідер в своїй групі стиглості! Відмінна врожайність. Високий вміст білку. Велика натура зерна.



ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Група стиглості	000 (дуже ранній)
Тип росту	Напівдeterminантний
Вегетаційний період, дн.	90-95
Кількість днів сходи-цвітіння	45 080
Насіннева оболонка	Жовта
Інтенсивність пігментації	Без пігментації
Рубчик	Білий
Опушення бобів та стебла	Світло-коричневе
Квітка	Фіолетова
Біб	Світло-коричневий



ПЕРЕВАГИ

- стабільний рівень продуктивності
- високий вміст протеїну
- стійкість до вилягання

НЕ ВИКОРИСТОВУВАТИ

- Пендиметалін

МОРФОЛОГІЯ ТА СТРУКТУРА ВРОЖАЙНОСТІ

Висота рослини, см		74
Висота кріплення нижнього боба, см		13
Кількість теплових од. СHU		2400
Вміст білку, %		42
Вміст олії, %		20,7

ДОДАТКОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рекомендована норма висіву, тис. шт. насінин/га	500-550
Рекомендована густина рослин на момент збирання, тис./га	480-550
Рекомендовані зони вирощування	Лісостеп Степ



АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Енергія початкового розвитку	8 010
Здатність до галузнення	5 010
Стійкість до вилягання	9 010
Стійкість до розтріскування	9 010



СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ

Склеротиніоз	8 010
Бактеріоз	9 010
Пероноспороз	9 010
Вірусні хвороби	8 010

СОЯ



ПЕРЕВАГИ

- високий ступінь опушення листя та стебла
- рівномірність дозрівання бобів у різних ярусах
- високі показники стійкості до розтріскування

МОРФОЛОГІЯ ТА СТРУКТУРА ВРОЖАЙНОСТІ

Висота рослини, см  73

Висота кріплення
нижнього боба, см  13

Кількість теплових од. СHU 2550

Вміст білку, % 41

Вміст олії, % 24

ДОДАТКОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рекомендована норма
висіву, тис. шт. насінин/га 600-650

Рекомендована густота рослин
на момент збирання, тис./га 500-550

Рекомендовані зони
вирощування Полісся
Лісостеп

ЕВЕРЕСТ **NEW**

Швидкі темпи росту та розвитку на початкових етапах дають можливість швидко закривати поверхню ґрунту та максимально ефективно використовувати запаси вологи для формування майбутнього врожаю. Високі показники стійкості до розтріскування та рівномірності дозрівання бобів у різних ярусах сприяють комбайнуванню з мінімальними втратами врожаю. Добра стійкість до основних хвороб забезпечує гарний фітосанітарний стан посіву при стандартних схемах захисту.



ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Група стиглості	00 (ранній)
Тип росту	Напівдетермінантний
Веgetаційний період, дн.	110-115
Кількість днів сходи-цвітіння	50 080
Насіннева оболонка	Жовта
Інтенсивність пігментації	Без пігментації
Рубчик	Білий
Опушення бобів та стебла	Світло-коричневе
Квітка	Фіолетова
Біб	Світло-коричневий



АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Енергія початкового розвитку	8
Здатність до галуження	7
Стійкість до вилягання	8
Стійкість до розтріскування	8



СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ

Склеротиніоз	8
Бактеріоз	9
Пероноспороз	9
Вірусні хвороби	8



ПЕРЕВАГИ

- активний стартовий ріст
- висока толерантність до основних хвороб
- синхронність дозрівання бобів

МОРФОЛОГІЯ ТА СТРУКТУРА ВРОЖАЙНОСТІ

Висота рослини, см		75
Висота кріплення нижнього боба, см		13
Кількість теплових од. СHU		2650
Вміст білку, %		41
Вміст олії, %		24

ДОДАТКОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рекомендована норма висіву, тис. шт. насінин/га	600-650
Рекомендована густота рослин на момент збирання, тис./га	500-550
Рекомендовані зони вирощування	Полісся Лісостеп

ВІНДЗОР ^{NEW}

Активний стартовий ріст та ранній початок цвітіння дають можливість даному сорту знизити ризик впливу високих температур на початку цвітіння. Синхронність дозрівання бобів на рослині, добра стійкість до розтріскування та висока стійкість до вилягання роблять сорт максимально придатним для прямого комбайнування. Сорт характеризується високою толерантністю до основних хвороб.



ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Група стиглості	00 (ранній)
Тип росту	Напівдетермінантний
Веgetаційний період, дн.	115-120
Кількість днів сходи-цвітіння	50 080
Насіннева оболонка	Жовта
Інтенсивність пігментації	Без пігментації
Рубчик	Білий
Опушення бобів та стебла	Світло-коричневе
Квітка	Фіолетова
Біб	Світло-коричневий



АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Енергія початкового розвитку	8 010
Здатність до галуження	7 010
Стійкість до вилягання	9 010
Стійкість до розтріскування	8 010



СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ

Склеротиніоз	8 010
Бактеріоз	8 010
Пероноспороз	8 010
Вірусні хвороби	8 010



Lidea
NOVE SŁOŁO DLA AGROBIZNESU



ПЕРЕВАГИ

- стабільно високий врожай
- пластичний
- високопротеїновий

НЕ ВИКОРИСТОВУВАТИ

- Метрибузин

МОРФОЛОГІЯ ТА СТРУКТУРА ВРОЖАЙНОСТІ

Висота рослини, см		77
Висота кріплення нижнього боба, см		13
Кількість теплових од. СHU		2550
Вміст білку, %		43
Вміст олії, %		20,5

ДОДАТКОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рекомендована норма висіву, тис. шт. насінин/га	500-550
Рекомендована густота рослин на момент збирання, тис./га	450-520
Рекомендовані зони вирощування	Лісостеп Степ

ЕС МЕНТОР

Сорт сої, який є лідером по врожайності в ранній групі. Прекрасне поєднання високої стабільності, врожайності та вмісту протеїну.



ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Група стиглості	00 (ранній)
Тип росту	Напівдетермінантний
Веgetаційний період, дн.	105
Кількість днів сходи-цвітіння	50 080
Насіннева оболонка	Жовта
Інтенсивність пігментації	Без пігментації
Рубчик	Білий
Опушення бобів та стебла	Світло-коричневе
Квітка	Фіолетова
Біб	Світло-коричневий



АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Енергія початкового розвитку	8 010
Здатність до галузнення	7 010
Стійкість до вилягання	9 010
Стійкість до розтріскування	8 010



СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ

Склеротиніоз	8 010
Бактеріоз	7 010
Пероноспороз	6 010
Вірусні хвороби	8 010



ГОРОХ

СОРТ	ОРИГІНАТОР	РІЗНОВИД	ГРУПА СТИГЛОСТІ
Вельвет	Saatbau	Жовтозерний	Середньоранній
Стабіл	Saatbau	Жовтозерний	Середньостиглий
Аватар NEW	Selgen	Жовтозерний	Середньостиглий



ВЕЛЬВЕТ

Вельвет - середньоранній високоврожайний пластичний сорт із стабільною врожайністю. Характеризується відмінною стійкістю до аскохитозу, стеблової та кореневої гнилей, борошнистої роси, вірусних захворювань та іржі.



ПЕРЕВАГИ

- потужний стартовий ріст
- високий рівень продуктивності та стабільна якість зерна
- підвищена стійкість до посушливих умов
- відмінна стійкість до осипання та розтріскування

МОРФОЛОГІЯ ТА СТРУКТУРА ВРОЖАЙНОСТІ

Висота рослини, см



100-120

Вміст білку, %

29

ДОДАТКОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рекомендована норма висіву, тис. шт. насінин/га

1 200

Рекомендована густота рослин на момент збирання, тис./га

950-1000

Рекомендовані зони вирощування

Полісся
Лісостеп



ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Група стиглості

Середньоранній

Колір зерна

Жовтозерний

Однорідність насіння за кольором, %

100

Форма зерна

Кругла



АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Посуhostійкість

8

Стійкість до вилягання

8

Стійкість до осипання

8



СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ

Антракноз

8

Кореневі гнилі

9

Борошниста роса

8

Пероноспороз

8

Вірусні хвороби

8



СТАБІЛ

Сорт гороху з потужним початковим ростом. Дуже пластичний, завдяки чому має високу та стабільну врожайність. Генетично підвищена стійкість до осипання та вилягання.



ПЕРЕВАГИ

- швидкий початковий розвиток
- стабільна, висока врожайність
- стійкий до вилягання та комплексу хвороб



ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Група стиглості	Середньостиглий
Колір зерна	Жовтозерний
Однорідність насіння за кольором, %	100
Форма зерна	Кругла

ГОРОХ

МОРФОЛОГІЯ ТА СТРУКТУРА ВРОЖАЙНОСТІ

Висота рослини, см



110

Вміст білку, %

25

ДОДАТКОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рекомендована норма висіву, тис. шт. насінин/га 900-1 100

Рекомендовані зони вирощування

Полісся
Лісостеп
Степ



АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Енергія початкового розвитку	9
Посухостійкість	6
Стійкість до вилягання	9
Стійкість до осипання	6



СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ

Кореневі гнилі	8
Борошниста роса	8
Вірусні хвороби	8



АВАТАР ^{NEW}

Середньостиглий сорт гороху з потужним початковим ростом. Дуже пластичний, має високу та стабільну врожайність, характеризується стійкістю до посухи та осипання.



ПЕРЕВАГИ

- інтенсивний прямостоячий тип
- посухостійкий
- стійкий до осипання
- висока стійкість до корневих гнилей



ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Група стиглості	Середньостиглий
Колір зерна	Жовтозерний
Однорідність насіння за кольором, %	100
Форма зерна	Кругла

МОРФОЛОГІЯ ТА СТРУКТУРА ВРОЖАЙНОСТІ

Висота рослини, см		105-110
Вміст білку, %		24

ДОДАТКОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рекомендована норма висіву, тис. шт. насінин/га	1000
Рекомендована густина рослин на момент збирання, тис./га	900
Рекомендовані зони вирощування	Полісся Лісостеп Степ



АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Енергія початкового розвитку	9
Посухостійкість	8
Стійкість до вилягання	7
Стійкість до осипання	8



СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ

Антракноз	8
Кореневі гнилі	8
Борошниста роса	8
Пероноспороз	8
Вірусні хвороби	8



КОРМОВІ ТРАВИ ТА СУМІШІ

СОРТ	ОРИГІНАТОР	ВИД	ГРУПА СТИГЛОСТІ
Планет	DSV	Бобові	Багаторічні
Мадаліна	DSV	Бобові	Багаторічні



ПЛАНЕТ



Сорт люцерни Планет перш за все відрізняється високою продуктивністю сухої речовини. Він часто виступає основним компонентом травосумішей Country сінажного призначення. Рекомендований для вирощування у зоні Лісостепу і Степу. Хвороби у роки випробувань не спостерігалися. Планет стійкий до фомозу та бактеріального в'янення, що значно збільшує витривалість сорту



ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кормові трави	Люцерна
Упаковка, кг	25
Вид	Бобові
Тип використання	Сінажно-силосний, сіно
Назва компоненту	Люцерна посівна; Medicago sativa: 100%



ПЕРЕВАГИ

- швидкий розвиток навесні
- добра зимостійкість
- висока посухостійкість
- відмінна стійкість до вилягання



АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Початкова енергія росту	8
Тривалість використання	8
Зимостійкість	8
Посухостійкість	9
Стійкість до вилягання	9
Розвиток навесні	9
Кормова цінність	9

Рекомендована норма висіву, кг/га

20

Рекомендовані зони вирощування

Лісостеп, степ



МАДАЛІНА



Мадаліна належить до сортів з високим відсотком залистяності. Стійкий до вилягання та придатний до вирощування в посушливих умовах. Генетична основа Мадаліни це — сорти люцерни, які мають високу зимостійкість та демонструють відмінну стійкість до хвороб. Крім пристосованості до відповідних ґрунтово-кліматичних умов, сорт в результаті селекційної роботи отримав генетично високу врожайність у порівнянні з іншими сортами.



ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кормові трави	Люцерна
Упаковка, кг	25
Вид	Бобові
Тип використання	Сінажний
Назва компоненту	Люцерна посівна; Medicago sativa: 100%



ПЕРЕВАГИ

- швидкий розвиток навесні
- початок цвітіння середній
- добра зимостійкість
- добра посухостійкість
- стійкість до фузаріозного в'янення та бурії плямистості
- швидке відростання після укусу



АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Початкова енергія росту	7
Тривалість використання	9
Зимостійкість	9
Посухостійкість	8
Стійкість до вилягання	8
Стійкість до вимокання	8
Розвиток восени	7
Розвиток навесні	8
Кормова цінність	9
Інтенсивне використання	8

Рекомендована норма висіву, кг/га

20

Рекомендовані зони вирощування

Полісся, Лісостеп



ЛЬОН ОЛІЙНИЙ

СОРТ	ОРИГІНАТОР	РІЗНОВИД	ГРУПА СТИГЛОСТІ
Лірина	DSV	Олійний	Середньостиглий



ЛІРИНА

Сорт олійного льону, який залишається найкращим по показникам врожайності та вмісту олії в насінні. Підвищенна посухостійкість дала змогу розширити ареал вирощування сорту з Полісся та Лісостепу до Степової зони. Технологічність сорту надає високу придатність до механізованого збирання, стійкість до вилягання, осипання та рівномірного дозрівання.



ПЕРЕВАГИ

- рівномірне дозрівання
- стабільна, висока врожайність
- стійкий до вилягання, осипання, посухи та комплексу хвороб
- витримує загущення

МОРФОЛОГІЯ ТА СТРУКТУРА ВРОЖАЙНОСТІ

Висота рослини, см		70
Технічна довжина, см		48
Частка волокна, %		50
Вихід довгого волокна, %		0
Вихід короткого волокна, %		100
Вміст олії, %		45

ДОДАТКОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рекомендована норма висіву, тис. шт. насінин/га	4 500
Рекомендовані зони вирощування	Полісся, Лісостеп Степ



ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Група стиглості

Середньостиглий

Вегетаційний період, дн.



АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Енергія початкового розвитку	7
Посухостійкість	9
Стійкість до вилягання	9
Стійкість до осипання	9



СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ

Фузаріоз	5
Антракноз	5



ЦУКРОВИЙ БУРЯК

ГІБРИД	ОРИГІНАТОР	ТИП ГІБРИДУ	СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ	СТРОКИ ЗБИРАННЯ
Ксантус	Maribo	NZ	Ризоктоніоз (Кореневі гнилі), Церкоспороз, Ризоманія	Середні
Маріно	Maribo	NZ	Нематода, Церкоспороз, Ризоманія	Середні
Фронтера	Maribo	Z		Середні
Карлтон	Maribo	N	Церкоспороз, Ризоманія	Середні
Лімозіне	Maribo	Z		Середні, пізні
Аркадія NEW	Maribo	NZ		Середні
Сіланто NEW	Maribo	NZ	Ризоманія, Афаноміцетна гниль	Середні
Браво NEW	Maribo	NZ		Середні
Матрос NEW	Maribo	NZ		Середні
Аскета	Hilleshoğ	Z	Ризоктоніоз (Кореневі гнилі), Церкоспороз, Ризоманія	Середні, пізні
Протекта	Hilleshoğ	NZ		Ранні, середні
Зеніт	Hilleshoğ	N	Нематода, Церкоспороз, Ризоманія	Ранні
Армеса	Hilleshoğ	NZ	Церкоспороз, Ризоманія	Середні
Борута	Hilleshoğ	N		Середні, пізні
Монсан	Hilleshoğ	NZ		Середні, пізні
СИ Марвін	Hilleshoğ	Z	Ризоманія, Афаноміцетна гниль	Ранні, середні
Хеліта	Hilleshoğ	Z		Ранні, середні
Діамента NEW	Hilleshoğ	N		Середні



MARIBO®
your partner in sugar beet...



КСАНТУС Максимальна стійкість до кореневих гнилей та церкоспорозу

Єдиний в портфоліо компанії урожайно-цукристий гібрид (NZ), що характеризується найкращою стійкістю до основних хвороб листя та коренеплоду. У виробничих умовах показує найвищу цукристість.



ПЕРЕВАГИ

- відмінна стійкість до ризоманії
- гібрид стійкий до ризиктонії (кореневі гнилі)
- характеризується відмінною стійкістю до церкоспорозу
- відмінний баланс між урожайністю та цукристістю
- гарна стійкість до "цвітухи" та макрофоміни

МОРФОЛОГІЯ ТА СТРУКТУРА ВРОЖАЙНОСТІ

**Урожайність
коренеплодів, т/га**



78

Цукристість, %

18,4

Розташування в ґрунті, %

90

ДОДАТКОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Рекомендована густота
рослин на момент збирання,
тис./га**



**Рекомендована норма висіву,
п.о./га**

1,4

**Рекомендовані зони
вирощування**

Полісся
Лісостеп
Степ



ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип гібриду

NZ (урожайно-
цукристий)

Строки сібви

Середній

**Строки збирання
по декадам місяця**

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
серпень вересень жовтень листопад



СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ

Rz - (ризоманія)

9

Cr - (церкоспороз)

9

ER - (борошниста роса)

8

Aph - афаноміцетна гниль (коренеїд)

9

Кореневі гнилі

9



MARIBO®
your partner in sugar beet...



МАРІНО

Стійкий до нематоди

Нематодостійкий урожайно-цукристий (NZ) гібрид із підвищеною цукристістю, швидкими ранніми сходами та пластичністю до умов вирощування. Ідеальний вибір для регіонів з перенасиченням в сівозміні цукрових буряків та картоплі.



ПЕРЕВАГИ

- бестселлер на ринку Іспанії
- стійкість до Нематоди
- характеризується доброю стійкістю до цвітущості коренеплоду
- відмінна стійкість до ризоманії та церкоспорозу
- показує відмінні результати на заражених нематодою полях



ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип гібриду

NZ (урожайно-цукристий)

Строки сібви

Середній

Строки збирання по декадам місяця

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
серпень вересень жовтень листопад



СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ

Rz - (ризоманія)	9
Cr - (церкоспороз)	9
ER - (борошниста роса)	8
Arh - афаноміцетна гниль (коренеїд)	8
Nt - (нематоди)	9

МОРФОЛОГІЯ ТА СТРУКТУРА ВРОЖАЙНОСТІ

Урожайність коренеплодів, т/га	83
Цукристість, %	17,7
Розташування в ґрунті, %	90



ДОДАТКОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рекомендована густота рослин на момент збирання, тис./га	90 100 105 115
Рекомендована норма висіву, п.о./га	1,4
Рекомендовані зони вирощування	Полісся Лісостеп Степ



MARIBO®
your partner in sugar beet...



ФРОНТЕРА Стійкий до нематоди

Гібрид для насичених буряками сівозмін-полів заражених нематодою. Збалансований за рівнем урожайності, цукристості та якості соку. Добре конкурує за рівнем продуктивності зі звичайними гібридами на незаражених нематодою площах.



ПЕРЕВАГИ

- відмінний результат на заражених нематодою площах
- хороша технологічна якість сировини
- стійкість до церкоспорозу



ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип гібриду Z (цукристий)

Строки сівби Ранній

Строки збирання по декадам місяця
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
серпень вересень жовтень листопад

МОРФОЛОГІЯ ТА СТРУКТУРА ВРОЖАЙНОСТІ

Маса коренеплоду, г



950

Урожайність коренеплодів, т/га



101

Цукристість, %

18,5

Розташування в ґрунті, %

85



АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Придатність до умов зрошення 4



СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ

Rz - (ризоманія) 9

Cr - (церкоспороз) 6

ER - (борошниста роса) 5

Aph - афаноміцетна гниль (коренеїд) 7

Nt - (нематоди) 9

ДОДАТКОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рекомендована густота рослин на момент збирання, тис./га
90 110 115

Рекомендована норма висіву, п.о./га 1,3

Рекомендовані зони вирощування
Полісся
Лісостеп
Степ



MARIBO®
your partner in sugar beet...



КАРЛТОН

Максимальна урожайність

Високоврожайний гібрид. Високий вміст цукру поєднано з високою врожайністю коренеплодів. Добре реагує на інтенсифікацію технології вирощування. Характеризується доброю стійкістю до рамуляріозу та фузаріозу.



ПЕРЕВАГИ

- перевірений на полях України
- мінімальне налипання ґрунту на коренеплід
- екологічно пластичний



ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип гібриду N (урожайний)

Строки сібви Середній

**Строки збирання
по декадам місяця**

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
серпень вересень жовтень листопад

МОРФОЛОГІЯ ТА СТРУКТУРА ВРОЖАЙНОСТІ

Маса коренеплоду, г



950

**Урожайність
коренеплодів, т/га**



100

Цукристість, %

18

Розташування в ґрунті, %

85



АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Придатність до умов зрошення

4



СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ

Rz - (ризоманія)

8

Cr - (церкоспороз)

5

ER - (борошниста роса)

6

Arh - афаноміцетна гниль (коренейд)

7

ДОДАТКОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Рекомендована густота
рослин на момент збирання,
тис./га**

90

110

90

115

**Рекомендована норма висіву,
п.о./га**

1,3

**Рекомендовані зони
вирощування**

Полісся
Лісостеп
Степ

ЦУКРОВИЙ
БУРЯК



MARIBO®
your partner in sugar beet...



ЛІМОЗІНЕ

Найбільша врожайність

Високий вміст цукру поєднано з високою врожайністю коренеплодів. Хороша стійкість до хвороб листкового апарату дозволяє збір у середні та пізні терміни без втрати цукру. Стабільна продуктивність за різних погодних умов.



ПЕРЕВАГИ

- досконала форма коренеплоду
- мінімальне налипання ґрунту на коренеплід
- стійкий до макрофоміни
- висока технологічність сировини



ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Упаковка, тис. насінин	100
Тип гібриду	Z (цукристий)
Строки сівби	Середній

Строки збирання
по декадам місяця

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
серпень вересень жовтень листопад

МОРФОЛОГІЯ ТА СТРУКТУРА ВРОЖАЙНОСТІ

Маса коренеплоду, г



900

Урожайність
коренеплодів, т/га



110

Цукристість, %

18

Розташування в ґрунті, %

80

ДОДАТКОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рекомендована густота
рослин на момент збирання,
тис./га



Рекомендована норма висіву,
п.о./га

1,3

Рекомендовані зони
вищівування

Полісся
Лісостеп
Степ



АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Придатність до умов зрошення

5



СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ

Rz - (ризоманія)

9

Cr - (церкоспоров)

6

ER - (борошниста роса)

7

Aph - афаноміцетна гниль (коренеїд)

7



MARIBO®
your partner in sugar beet...



NEW

АРКАДІЯ

Максимальна врожайність та стійкість до церкоспорозу

N-NZ урожайно-цукристий гібрид з підвищеною цукристістю. Характеризується відмінною стійкістю до ризоманії, церкоспорозу, макросфоміні "гумовий коренеплід" та "цвітушності". Форма запобігає значному налипанню ґрунту на коренеплід. Гібрид АРКАДІЯ показував відмінні та стабільні результати протягом багатьох років у різних регіонах. Придатний для ранньої та середньопізньої копки.



ПЕРЕВАГИ

- N-NZ- тип з високим урожаєм коренеплодів
- відмінний вихід цукру за рахунок високої якості очищеного нормального соку
- дуже добра стійкість до основних хвороб
- мінімальне налипання ґрунту на коренеплід під час копки
- швидке змикання листя у міжряддях



ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Упаковка, тис. насінин	100
Тип гібриду	NZ (урожайно-цукристий)
Строки сібви	Середній
Строки збирання по декадам місяця	1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 серпень вересень жовтень листопад

МОРФОЛОГІЯ ТА СТРУКТУРА ВРОЖАЙНОСТІ

Маса коренеплоду, г	 850
Урожайність коренеплодів, т/га	 80
Цукристість, %	18,3
Розташування в ґрунті, %	90

ДОДАТКОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рекомендована густота рослин на момент збирання, тис./га	100 (105) 90 115
Рекомендована норма висіву, п.о./га	1,4
Рекомендовані зони вирощування	Полісся Лісостеп Степ



СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ

Rz - (ризоманія)	7
Cr - (церкоспороз)	7
ER - (борошниста роса)	5
Aph - афаноміцетна гниль (коренейд)	5

ЦУКРОВИЙ
БУРЯК



MARIBO®
your partner in sugar beet...



NEW

СІЛАНТО

Найбільша врожайність

NZ урожайно-цукристий гібрид із високою стійкістю до основних хвороб листя та коренеплоду, який показував високі та стабільні показники продуктивності протягом багатьох років у різних регіонах. СІЛАНТО - придатний для ранньої та середньопізньої копки.



ПЕРЕВАГИ

- NZ - тип з високою урожайністю коренеплодів
- високий вихід цукру з гектару
- відмінна стійкість до церкоспорозу, афаноміцетної кореневої гнилі та макрофомії "гумовий коренеплід"
- найвища стійкість до "цвітухи" та ризоманії



ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Упаковка, тис. насінин	100
Тип гібриду	NZ (урожайно-цукристий)
Строки сіви	Середній

Строки збирання по декадах місяця

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
серпень вересень жовтень листопад

МОРФОЛОГІЯ ТА СТРУКТУРА ВРОЖАЙНОСТІ

Маса коренеплоду, г



800

Урожайність коренеплодів, т/га



75

Цукристість, %

18,7

Розташування в ґрунті, %

95



СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ

Rz - (ризоманія)	8
Cr - (церкоспороз)	8
ER - (борошниста роса)	6
Aph - афаноміцетна гниль (коренеїд)	6

ДОДАТКОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рекомендована густота рослин на момент збирання, тис./га



Рекомендована норма висіву, п.о./га

1,4

Рекомендовані зони вирощування

Полісся
Лісостеп
Степ



MARIBO®
your partner in sugar beet...



NEW

БРАВО

Продуктивний за будь-яких умов

Бестселлер на ринку Польщі та Литви.
Ранній гібрид NZ-Z урожайно-цукристого напрямку із підвищеною цукристістю. БРАВО - характеризується високою стійкістю до ризоманії, афаноміцетної кореневої гнилі та "цвітушності".
Придатний для ранньої копки.



ПЕРЕВАГИ

- NZ-Z - тип із підвищеною цукристістю
- високий вихід цукру за рахунок відмінної якості очищеного нормального соку
- гарна стійкість до основних хвороб листя та коренеплоду
- дуже висока стійкість до "цвітушності"



ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Упаковка, тис. насінин	100
Тип гібриду	NZ (урожайно-цукристий)
Строки сібви	Середній
Строки збирання по декадам місяця	1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 серпень вересень жовтень листопад

МОРФОЛОГІЯ ТА СТРУКТУРА ВРОЖАЙНОСТІ

Маса коренеплоду, г	 750
Урожайність коренеплодів, т/га	 70
Цукристість, %	19,5
Розташування в ґрунті, %	90

ДОДАТКОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рекомендована густота рослин на момент збирання, тис./га	100(105) 90115
Рекомендована норма висіву, п.о./га	1,4
Рекомендовані зони вирощування	Полісся Лісостеп Степ



СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ

Rz - (ризоманія)	7
Cr - (церкоспороз)	5
ER - (борошниста роса)	5
Arh - афаноміцетна гниль (коренеїд)	6

ЦУКРОВИЙ
БУРЯК



MARIBO®
your partner in sugar beet...



NEW

МАТРОС

Найбільша врожайність

NZ урожайно-цукристий гібрид, який характеризується відмінною посухостійкістю та стійкістю до "цвітухи". Високий вихід цукру поєднано з відмінною якістю очищеного нормального соку. МАТРОС - стійкий до основних хвороб листя і коренеплоду та придатний для раннього та середньопізннього збирання.



ПЕРЕВАГИ

- NZ - тип з високою урожайністю коренеплодів
- відмінна стійкість до афаноміцетної кореневої гнилі та церкоспорозу
- продуктивний в умовах посухи
- висока стійкість до "цвітухи"



ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Упаковка, тис. насінин	100
Тип гібриду	NZ (урожайно-цукристий)
Строки сіви	Середній

**Строки збирання
по декадам місяця**

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
серпень вересень жовтень листопад

МОРФОЛОГІЯ ТА СТРУКТУРА ВРОЖАЙНОСТІ

Маса коренеплоду, г



800

**Урожайність
коренеплодів, т/га**



74

Цукристість, %

18

Розташування в ґрунті, %

95



СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ

Rz - (ризоманія)	8
Cr - (церкоспороз)	5
ER - (борошниста роса)	5
Aph - афаноміцетна гниль (коренеїд)	7

ДОДАТКОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Рекомендована густота
рослин на момент збирання,
тис./га**



**Рекомендована норма висіву,
п.о./га**

1,4

**Рекомендовані зони
вищівування**

Полісся
Лісостеп
Степ



АСКЕТА

Стійкий до корневих гнилей

Аскета — гібрид, стійкий до корневих гнилей, стресостійкий, із підвищеною цукристістю. Також високостійкий до ризоманії та церкоспорозу. Витримує посуху, але одночасно адаптований для зрошення. Добре витримує умови запливаючих ґрунтів із високою ймовірністю розвитку ґрунтових патогенів. Для господарств із довгим плечем поставки та ранніх і середніх термінів збирання. Добре зберігається в кагатах.



ПЕРЕВАГИ

- стресостійкий гібрид з потрійною стійкістю до хвороб і високою продуктивністю
- найкращий гібрид для умов зрошення
- висока технологічна якість сировини
- добре зберігається у кагатах
- витримує натиск корневих хвороб



ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип гібриду Z (цукристий)

Строки сібви Ранній

Строки збирання по декадам місяця **1 2 3 1 2 3 1 2 3**
серпень вересень жовтень листопад



АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Придатність до умов зрошення 9



СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ

Rz - (ризоманія) 9

Cr - (церкоспороз) 8

ER - (борошниста роса) 5

Arh - афаноміцетна гниль (коренеїд) 8

Кореневі гнилі 9

МОРФОЛОГІЯ ТА СТРУКТУРА ВРОЖАЙНОСТІ

Маса коренеплоду, г



900

Урожайність коренеплодів, т/га



90

Цукристість, %

19

Розташування в ґрунті, %

90

ДОДАТКОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рекомендована густота рослин на момент збирання, тис./га 90 110 115

Рекомендована норма висіву, п.о./га 1,3

Рекомендовані зони вирощування Полісся, Лісостеп
Степ



ПЕРЕВАГИ

- не терпить загущення у посушливих умовах
- найкращий гібрид для умов зрошення
- добре зберігається у кагатах
- витримує натиск корневих хвороб
- дуже доречний для господарств з високою насиченістю сівозміни буряками та ріпаком

МОРФОЛОГІЯ ТА СТРУКТУРА ВРОЖАЙНОСТІ

Маса коренеплоду, г



900

Урожайність
коренеплодів, т/га



90

Цукристість, %

19

Розташування в ґрунті, %

90

ДОДАТКОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рекомендована густота
рослин на момент збирання,
тис./га

90

110

90

115

Рекомендована норма висіву,
п.о./га

1,3

Рекомендовані зони
вищущування

Полісся, Лісостеп
Степ

ПРОТЕКТА

Стойкий до корневих
гнилей, врожайний в умовах
недостатнього зволоження

Гібрид класичного урожайного типу, стійкий до ризиктоніозу (корневих гнилей). Характеризується потрібною стійкістю до ризоманії, ризиктонії, церкоспорозу. Вирізняється дуже високим рівнем продуктивності. Менше скидає листову пластинку в екстремальних умовах посухи. Добре зберігається в кагатах.



ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип гібриду

NZ (урожайно-
цукристий)

Строки сібви

Ранній

Строки збирання
по декадам місяця

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
серпень вересень жовтень листопад



АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Придатність до умов зрошення

9



СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ

Rz - (ризоманія)

8

Cr - (церкоспороз)

8

ER - (борошниста роса)

5

Aph - афаноміцетна гниль (коренеїд)

8

Кореневі гнилі

9



ЗЕНИТ

Стійкий до нематоди та корневих гнилей

Нематодостійкий гібрид з високим виходом цукру з гектару. Зберігає потенціал продуктивності навіть в умовах посухи. Стійкий до корневих гнилей та листових хвороб.



ПЕРЕВАГИ

- висока продуктивність навіть за посушливих умов
- хороша лежкість у кагатах
- відмінні результати як % цукристості, так і виходу цукру з гектару
- стійкий до нематоди та середньостійкий до корневих гнилей
- показує гарні результати на сильно заражених церкоспорозом полях



ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип гібриду N (урожайний)

Строки сібви Середній

Строки збирання по декадам місяця



АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Придатність до умов зрошення 5



СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ



МОРФОЛОГІЯ ТА СТРУКТУРА ВРОЖАЙНОСТІ

Маса коренеплоду, г		850
Урожайність коренеплодів, т/га		95
Цукристість, %		19
Розташування в ґрунті, %		85

ДОДАТКОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рекомендована густота рослин на момент збирання, тис./га	90 110 115
Рекомендована норма висіву, п.о./га	1,3
Рекомендовані зони вирощування	Полісся, Лісостеп Степ

ЦУКРОВИЙ
БУРЯК



АРМЕСА

Максимальна врожайність



Бестселлер на ринку Європи (Німеччина, Польща, Данія, Франція). Диплоїдний гібрид урожайно-цукристого напрямку. Гібрид який може здивувати продуктивністю та стійкістю до основних хвороб.



ПЕРЕВАГИ

- відмінні показники у демонстраційних випробуваннях у різних країнах світу
- коренеплід з мілкою боріздкою
- стабільний гібрид за виходом цукру з гектару протягом кількох років в багатьох країнах
- швидке змикання листя у міжряддях



ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип гібриду

NZ (урожайно-цукристий)

Строки сібви

Середній

**Строки збирання
по декадам місяця**

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
серпень вересень жовтень листопад



СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ

Rz - (ризоманія)

9

Cr - (церкоспороз)

7

ER - (борошниста роса)

7

Aph - афаноміцетна гниль (коренеїд)

8

МОРФОЛОГІЯ ТА СТРУКТУРА ВРОЖАЙНОСТІ

**Урожайність
коренеплодів, т/га**



92

Цукристість, %

18,4

Розташування в ґрунті, %

90

ДОДАТКОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Рекомендована густота
рослин на момент збирання,
тис./га**

100 105

90

115

**Рекомендована норма висіву,
п.о./га**

1,4

**Рекомендовані зони
вищощування**

Полісся
Лісостеп
Степ



БОРУТА

Максимальна врожайність

Селекційно найвдаліший гібрид. Стабільно висока врожайність за різних погодних умов. Має інтенсивний стартовий ріст та високу технологічність при збиранні.



ПЕРЕВАГИ

- відрізняється дуже високим рівнем урожайності та інтенсивним стартовим ростом
- бестселер в портфоліо компанії

МОРФОЛОГІЯ ТА СТРУКТУРА ВРОЖАЙНОСТІ

Маса коренеплоду, г		900
Урожайність коренеплодів, т/га		100
Цукристість, %		18
Розташування в ґрунті, %		90

ДОДАТКОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рекомендована густота рослин на момент збирання, тис./га	90 110
Рекомендована норма висіву, п.о./га	1,3
Рекомендовані зони вирощування	Полісся Лісостеп Степ



ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип гібриду N (урожайний)

Строки сібви Середній

Строки збирання по декадам місяця

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
серпень вересень жовтень листопад



АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Придатність до умов зрошення

6



СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ

Rz - (ризоманія)	9
Cr - (церкоспороз)	9
ER - (борошниста роса)	4
Arh - афаноміцетна гниль (коренейд)	8

ЦУКРОВИЙ
БУРЯК



МОНСАН

Продуктивний за будь-яких умов

Урожайно-цукристий гібрид. Забезпечує високий рівень продуктивності як в умовах посухи, так і в умовах надмірного зволоження.



ПЕРЕВАГИ

- універсальний
- придатний до вирощування у будь-яких умовах
- високий рівень стійкості до цвітухи
- збалансована стійкість до хвороб листя та коренеплода



ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип гібриду

NZ (урожайно-цукристий)

Строки сібви

Середній

Строки збирання
по декадам місяця

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
серпень вересень жовтень листопад

МОРФОЛОГІЯ ТА СТРУКТУРА ВРОЖАЙНОСТІ

Маса коренеплоду, г



850

Урожайність
коренеплодів, т/га



90

Цукристість, %

19

Розташування в ґрунті, %

90

ДОДАТКОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рекомендована густота
рослин на момент збирання,
тис./га

90

110

90

115

Рекомендована норма висіву,
п.о./га

1,3

Рекомендовані зони
вирощування

Полісся
Лісостеп
Степ



АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Придатність до умов зрошення

5



СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ

Rz - (ризоманія)

8

Cr - (церкоспороз)

8

ER - (борошниста роса)

5

Aph - афаноміцетна гниль (коренеїд)

5



СИ МАРВІН

Рання копка

Цукристий гібрид для економії на транспортуванні коренеплодів. Для ранньої копки. Стійкий до афаноміцесу і церкоспорозу. Стійкий до цвітушності, отже, підходить для раннього посіву.



ПЕРЕВАГИ

- високоцукристий гібрид
- коренеплід гладенький без борізки
- високоякісний показник доброякісності очищеного нормального соку



ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип гібриду Z (цукристий)

Строки сібви Середній

Строки збирання по декадам місяця **1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3**
серпень вересень жовтень листопад

МОРФОЛОГІЯ ТА СТРУКТУРА ВРОЖАЙНОСТІ

Маса коренеплоду, г  750

Урожайність коренеплодів, т/га  85

Цукристість, % 22

Розташування в ґрунті, % 80

ДОДАТКОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рекомендована густота рослин на момент збирання, тис./га **90 110**
90 115

Рекомендована норма висіву, п.о./га 1,3

Рекомендовані зони вирощування Полісся
Лісостеп
Степ



АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Придатність до умов зрошення **6**



СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ

Rz - (ризоманія) **9**

Cr - (церкоспороз) **8**

ER - (борошниста роса) **8**

Aph - афаноміцетна гниль (коренеїд) **4**



ХЕЛІТА

Максимальний вихід цукру з гектара



Гібрид цукристого типу. Стабільний за рівнем продуктивності. Толерантний до комплексу хвороб коренеплоду та листового апарату. Перевірений часом.



ПЕРЕВАГИ

- поєднує в собі надзвичайно високу урожайність та цукристість
- стабільний за рівнем продуктивності
- перевірений часом



ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип гібриду

Z (цукристий)

Строки сібви

Ранній

Строки збирання
по декадам місяця

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
серпень вересень жовтень листопад

МОРФОЛОГІЯ ТА СТРУКТУРА ВРОЖАЙНОСТІ

Маса коренеплоду, г



800

Урожайність
коренеплодів, т/га



85

Цукристість, %

20

Розташування в ґрунті, %

90

ДОДАТКОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рекомендована густота
рослин на момент збирання,
тис./га

90

110

90

115

Рекомендована норма висіву,
п.о./га

1,3

Рекомендовані зони
вирощування

Полісся
Лісостеп
Степ



АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Придатність до умов зрошення

6



СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ

Rz - (ризоманія)

9

Cr - (церкоспоров)

8

ER - (борошниста роса)

9

Aph - афаноміцетна гниль (коренеїд)

4



HILLESHÖG



NEW

ДІАМЕНТА

Посухостійкість. Максимальна стійкість до церкоспорозу

N - урожайний гібрид з високою цукристістю. ДІАМЕНТА бестселлер на ринку Туреччини, Франції та Італії. Зберігає високий потенціал продуктивності в умовах посухи. Характеризується високою стійкістю до ризоманії, церкоспорозу, афаноміцетної кореневої гнилі, макрофоміни "гумовий коренеплід" та "цвітушності". Придатний для середньоранніх та пізніх термінів збирання.



ПЕРЕВАГИ

- продуктивний за посушливих умов
- високий вихід цукру за рахунок відмінної якості очищеного нормального соку
- показує гарні результати на сильно заражених церкоспорозом полях
- відмінна стійкість до макроформіни "гумовий коренеплід" та афаноміцетної кореневої гнилі



ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Упаковка, тис. насінин	100
Тип гібриду	N (урожайний)
Строки сібви	Середній

Строки збирання
по декадам місяця

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
серпень вересень жовтень листопад



СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ

Rz - (ризоманія)	7
Cr - (церкоспороз)	6
ER - (борошниста роса)	6
Arh - афаноміцетна гниль (коренеїд)	7

МОРФОЛОГІЯ ТА СТРУКТУРА ВРОЖАЙНОСТІ

Маса коренеплоду, г		800
Урожайність коренеплодів, т/га		83
Цукристість, %		18
Розташування в ґрунті, %		95

ДОДАТКОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рекомендована норма висіву, п.о./га	1,4
Рекомендовані зони вирощування	Полісся Лісостеп Степ

ЦУКРОВИЙ
БУРЯК

НАСІННЯ ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ



ФАО 200



ФАО 250



ФАО 290



ФАО 300



ФАО 340



ФАО 390



EXPRESS

НАСІННЯ ГІБРИДІВ СОНЯШНИКУ



КОНТАКТИ РЕГІОНАЛЬНИХ ПІДРОЗДІЛІВ

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ

смт Вапнярка +380 (432) 50 62 01 (02)
м. Вінниця +380 (66) 222-45-53
м. Іллінці +380 (4345) 2 12 94

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ

м. Луцьк +380 (332) 70 11 58 (59, 60)

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ

м. Новомосковськ
+380 (5696) 9 64 81 (82)
смт Радужне +380 (564) 09 40 21

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

м. Краматорськ +380 (6264) 7 21 42

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ

м. Житомир +380 (50) 411 21 90

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ

с. Ключарки +380 (3131) 3 18 20

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ

м. Запоріжжя +380 (6153) 2 37 00 (02)
м. Бердянськ +380 (66) 222-45-53
м. Токмак +380 (6178) 4 27 72

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

м. Івано-Франківськ +380 (50) 301 51 64

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

м. Київ +380 (44) 536 92 02

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ

м. Кропивницький +380 (44) 354 35 69
смт Добровеличівка +380 (5253) 5 23 02
м. Олександрія +38 050 374 62 43

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ

м. Старобільськ +380 (6461) 2 20 47

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ

смт Запитів +380 (322) 36 21 10 (11, 15)

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

м. Миколаїв +380 (512) 48 92 00 (01, 02)
смт Арбузинка +380 (89) 250 03 01



КОНТАКТИ РЕГІОНАЛЬНИХ УПРАВЛІНЬ

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

м. Одеса +380 (48) 790 07 10 (11, 12, 13)
м. Ізмаїл +380 (4841) 6 17 81;
+380 (66) 663 24 05
с. Чубівка +380 (4862) 97 5 86
смт Сарата +380 (4848) 2 29 98

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ

м. Полтава +380 (50) 359 94 58
м. Лубни +380 (95) 275 29 16

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ

м. Рівне +380 (362) 67 17 00

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ

м. Конотоп +380 (95) 286 19 21
м. Суми +380 (542) 65 12 92

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ

с. Довжанка +380 (352) 43 43 46;
+380 (352) 43 40 57;
+380 (352) 43 80 87

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

м. Балаклія +380 (57) 492 22 23
с.Коротич +380 (57) 766 45 27

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ

м. Херсон +380 (552) 41 06 90
м. Таврійськ +380 (50) 414 16 37

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ

с. Богданівці +380 (3849) 5 07 07
м. Хмельницький +380 (382) 62 57 74

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ

м. Умань +380 (4744) 3 90 01 (05)
м. Черкаси +380 (472) 64 72 75

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

м. Чернівці +380 (372) 57 86 86

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ

м. Чернігів +380 (95) 281 73 74
м. Ічня +380 (4633) 2 52 34

